

概率论和数理统计 (拔尖、匡院) (2025 春) 期末

Lecturer: 尹一通、刘景铨;

多选、填空:

(1) 以下哪一个是依概率收敛的定义?

A. $\Pr[\forall \epsilon > 0, |X_n - X| < \epsilon] \rightarrow 0$ 。

B. $\forall \epsilon > 0, \Pr[|X_n - X| < \epsilon] \rightarrow 0$ 。

(2) i, j u.a.r. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $k = i + j$, 问: $\mathbb{E}[i|k]$ 的值是?

A. $k/2$

B. 3.5

C. i

D. j

(3) F, G 是 σ -域, 以下哪些选项一定是 σ -域?

A. $F \cup G$

B. $F \cap G$

C. $F \cap G^c$

D. $F^c \cup G^c$

(4) S, T 是 w.r.t 随机过程 $\{Z_n : n \geq 0\}$ 的停时, 以下哪些选项也是 w.r.t $\{Z_n : n \geq 0\}$ 的停时?

A. $S + T$

B. $|S - T|$

C. $\ln(S + 1)$

D. S^2

(5) 进行 100 次参数为 p 的 Bernoulli 实验, 有 55 次实验结果是 1, p 的极大似然估计: ()。

(6) 一个盒子中有标有 $1 \sim 6$ 的小球各一个, 不断摸球, 摸到 1 号球停止。若摸球后放回, 则期望摸球的次数是: (), 若摸球后不放回, 则期望摸球的次数是: ()。

(7) 桌上有 $\{HH, HT, TT\}$ 三枚硬币, u.a.r 的选择一枚硬币抛掷, 已知结果是 H, 则抛的这枚硬币是 HT 的概率是: ()。

概率空间 (一) :

现有两枚硬币, 抛第一枚硬币得到正面的概率是 p , 抛第二枚硬币得到正面的概率是 q 。现在 u.a.r 的选择一枚硬币抛掷, 再抛另一枚硬币, 求:

(1) 第一次抛掷得到正面的概率。

(2) 第二次抛掷得到正面的概率。

(3) “第一次抛掷得到正面” 和 “第二次抛掷得到正面” 这两个事件是否独立？

概率空间（二）：

事件 A, B 满足 $\Pr(A) > 0, \Pr(B) > 0$ ，证明或证伪如下命题：

- (1) 若 $\Pr(A|B) > \Pr(A)$ ，则 $\Pr(B|A) > \Pr(B)$ 。
- (2) 若 $\Pr(A) = \Pr(B)$ ，则对任意事件 C 都有 $\Pr(A|C) = \Pr(B|C)$ 。
- (3) 若 $\Pr(A|B) = \Pr(B|A)$ ，则 $\Pr(A) = \Pr(B)$ 。

离散随机变量（一）：

n 个身高互不相同的人均匀随机的排成一列，记不会被前面的人挡住的人的数量为 X ，求 X 的期望。

离散随机变量（二）：

有 N 个人进入商场，每个人都独立地、以 p 的概率不买任何东西走出商场。记买了东西的人的数量为 X 、没买东西的人的数量为 Y （故 $X + Y = N$ ）。

- (1) 若 $N \sim \text{Pois}(\lambda)$ ，求 $\Pr(Y = k), \Pr(X = k)$ ，并说明 X, Y 亦服从 Poisson 分布。
- (2) 若 $N \sim \text{Pois}(\lambda)$ ，证明： X, Y 独立。
- (3) 选做题：若 X, Y 独立，证明 N 服从 Poisson 分布。[Hint: 记 $q_k = \Pr(N = k)$ ，用独立性导出 q_k 应该满足的条件。]

连续随机变量（一）：

考虑 Buffon 问题的变种：在某无限大的 1×1 网格上均匀随机的丢下长度为 1 的针：

- (1) 已知丢下的针和水平网格线的夹角是 θ ，求针不和网格线相交的概率。
- (2) 求丢下的针与网格线相交的概率。

连续随机变量（二）：

甲乙二人扔飞镖，甲扔出的飞镖落点在以靶心为圆心，半径为 r 的圆内均匀分布，乙扔出的飞镖落点在以靶心为圆心，半径为 $2r$ 的圆内均匀分布。

- (1) 求甲扔出的飞镖比乙扔出的飞镖离靶心近的概率。
- (2) 记甲扔出的飞镖离靶心的距离是 U ，乙扔出的飞镖离靶心的距离是 V ，求 $\min(U, V)$ 的 CDF。
- (3) 求 $\max(U, V)$ 的 CDF。
- (4) 求 $\mathbb{E}[|U - V|]$ 。

测度集中：

初始时，某箱子里有一黑、一白两个球。在往后的每一轮中，我们从该箱子中摸出一个球，并从箱外拿一个这个球的同色球，与这个球一起放回箱子中。记 W_k 为第 k 轮后，箱子中的白球数。则 $W_0 = 1$ 。

- (1) 计算 $\mathbb{E}[W_k | W_{k-1}]$ ，并据此计算 $\mathbb{E}[W_k]$ 。
- (2) 求 W_k 的概率分布。

(3) 记 $R_k = \frac{W_k}{k+2}$, 证明: $\{R_n : n \geq 0\}$ 是 w.r.t. 其自身 filtration 的一个鞅。

(4) 回忆 Azuma 不等式, 并证明存在常数 c 使得对任意正整数 $k_1 > k_2 > 1$, 有:

$$\Pr \left(|R_{k_1} - R_{k_2}| > c \cdot \sqrt{\frac{\ln(2/\epsilon)}{k_2}} \right) < \epsilon$$

这说明 $\{R_k\}$ 有怎样的收敛性质?