



Формирование пронефроса, мезонефроса и метанефроса



Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13th ed., 2015

Перемещение окончательной почки (метанефроса)

PEDIATRIC
UNIVERSITY




2

Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13th ed., 2015




Развитие нефрона окончательной почки (метанефроса)





Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13th ed., 2015

Схема строения почки




Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

Схема строения нефрона



В.Л. Быков, С.И. Юшканцева, Гистология, цитология и эмбриология: атлас, 2017

Корковое и мозговое вещество почки




В.Л. Быков, С.И. Юшканцева, Гистология, цитология и эмбриология: атлас, 2017



Схема взаимоотношения капсулы нефрона и клубочка капилляров в почечном тельце

PEDIATRIC
UNIVERSITY




7




This diagram illustrates the early stages of embryonic development. At the top, a cluster of cells is labeled 'muscle dermis cells'. Below this, a series of cells are shown forming a tube, labeled 'neural tube'. The tube is surrounded by a layer of cells, labeled 'ectoderm'. The tube itself is labeled 'neural tube' and 'somites'. The bottom part of the diagram shows the 'blastocoel' and 'blastoderm'.

Взаимоотношения мезангиальной клетки с капиллярами



Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

Взаимоотношения подоцита с фенестрированными капиллярами клубочка



Junqueira's Basic Histology, A.L. Mescher, 13th ed., 2013

Подоцит, окружающий фенестрированные капилляры клубочка



Podocyte


Pedicels

Glomerular
capillary
covered by
podocytes with
pedicels

(d) Podocytes


Junqueira's Basic Histology, A.L. Mescher, 13th ed., 2013

Схема фильтрационного барьера




Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

Схема устройства фильтрационной щели



Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011


Схема фильтрационного барьера



Junqueira's Basic Histology, A.L. Mescher, 13th ed., 2013

Взаимоотношения фенестрированного
эндотелия капилляра с подоцитами
(электронная микрофотография)


PEDIATRIC
UNIVERSITY



Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

Реабсорбция в различных отделах нефрона и в собирательной трубчатке

PEDIATRIC
UNIVERSITY




Ross M. et al. Pathology of the Kidney, 10th ed., 2015

16

Почечное тельце и канальцы нефрона


окраска: гематоксилин-эозин



Препарат кафедры гистологии и эмбриологии им.проф. А.Г. Кнорре

Собираательные трубочки


окраска: гематоксилин-эозин



Junqueira's Basic Histology, A.L. Mescher, 13th ed., 2013


Ренин-ангиотензин-альдостероновая система

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

Схема кровообращения в почке



В.Г. Елисеев, Ю.И. Афанасьев, Е.Ф. Котовский, Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток, тканей и органов, М., 1978