

ДЗ 1

по Теории Массового Обслуживания

от Татаринова Никиты Алексеевича, БПИ193

2022.09.07

Задание 1

Условие

В столовой посетители обслуживаются на двух кассах, время обслуживания каждого посетителя распределено по закону Эрланга второго порядка и составляет в среднем одну минуту. Покупатели подходят с интенсивностью два человека в минуту, время между покупателями распределено экспоненциально. Очередь к кассам может быть сколь угодно большой. Опишите систему нотацией Кендалла.

Решение

Нотация Кендалла имеет вид:

$$A/B/X/Y/Z$$

, где

- A – закон распределения времени между поступлением заявок, то есть $A=M$ (экспоненциальное);
- B – закон распределения времени обслуживания, то есть $B=E_2$ (Эрланга второго порядка);
- X – число каналов обслуживания, то есть $X=2$ (две кассы);
- Y – ёмкость системы (максимальное число заявок в системе одновременно), то есть $Y=\infty$ (очередь к кассам может быть сколь угодно большой);
- Z – дисциплина обслуживания, то есть $Z=GD$ (произвольная дисциплина, так как иное не оговорено условием).

Ответ

$$M/E_2/2/\infty/GD \sim M/E_2/2$$

Задание 2

Условие

Опираясь на геометрическую интерпретацию, найдите математическое ожидание случайной величины X , если

- эта величина имеет геометрическое распределение с параметром $p \in (0; 1)$, то есть принимает значения $0, 1, 2, \dots$ с вероятностями $\mathbf{P}\{X=x\} = (1-p)^x \cdot p$
- эта величина имеет функцию распределения

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - 0.8 \cdot e^{-x} & x \geq 0 \end{cases}$$

Решение

Дополнительная функция распределения:

$$G_X(x) = \mathbf{P}\{X > x\} = 1 - F_X(x)$$

Тогда для неотрицательных X :

$$E[X] = \int_0^{+\infty} G_X(x) \cdot dx$$

а)

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{i=1}^{+\infty} i \cdot p \cdot (1-p)^i = \sum_{i=1}^{+\infty} (i+1) \cdot p \cdot (1-p)^i - \sum_{i=1}^{+\infty} p \cdot (1-p)^i = p \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{dq^{i+1}}{dq} - (1-p) = \\ &= p \cdot \frac{d}{dq} \left(\sum_{i=1}^{+\infty} q^{i+1} \right) - (1-p) = p \cdot \frac{d}{dq} \left(\frac{q^2}{1-q} \right) - (1-p) = p \cdot \frac{2 \cdot q \cdot (1-q) - q^2 \cdot (-1)}{(1-q)^2} - (1-p) = \\ &= p \cdot \frac{(2-q) \cdot q}{(1-q)^2} - (1-p) = p \cdot \frac{(1+p)(1-p)}{p^2} - (1-p) = \frac{1-p^2}{p} + p - 1 = \frac{1}{p} - 1 \end{aligned}$$

б)

$$E[X] = \int_0^{+\infty} 0.8 \cdot e^{-x} \cdot dx = -0.8 \cdot e^{-x} \Big|_0^{+\infty} = 0 - (-0.8) = 0.8$$

Ответ

а) $E[X] = \frac{1}{p} - 1$

б) $E[X] = 0.8$

Задание 3

Условие

Consider a system with a single server at which customers arrive with interval times distributed uniformly from 0.7 to 1.2 minutes. Each customer needs exactly 1 min to be serviced. If a customer finds the server busy upon arrival, it leaves without being serviced (it is lost). Let $\mathbf{P}(k)$ denote the probability that k -th customer is lost. The server is initially unoccupied, so that $\mathbf{P}(1)=0$.

Calculate $\mathbf{P}(k)$ for $k=2, 3, 4$ and find $\mathbf{P}(k)$.

Решение

Из условия, 1-я заявка точно не будет потеряна. Поскольку каждая заявка обслуживается ровно 1 минуту, 2-я заявка будет потеряна, если придёт через $[0.7; 1]$ минуту после 1й, то есть:

$$\mathbf{P}(2) = \frac{1-0.7}{1.2-0.7} = 0.6$$

Далее рассмотрим произвольную k -ю заявку $\forall k \geq 3$. Если $(k-1)$ -я заявка потеряна, то k -я заявка точно не будет потеряна, так как она придёт минимум через 0.7 минут после $(k-1)$ -й, а $(k-1)$ -я заявка пришла минимум через 0.7 минут после $(k-2)$ -й, то есть k -я заявка придёт минимум через 1.4 минуты после $(k-2)$, в то время как обслуживание любой заявки занимает ровно минуту. Если же $(k-1)$ -я заявка не потеряна, то вероятность потери k й рассчитывается так же, как и для 2й. Таким образом, вероятность потери k -й заявки равна

$$\mathbf{P}(k) = (1 - \mathbf{P}(k-1)) \cdot \mathbf{P}(2)$$

Для 3-й заявки:

$$\mathbf{P}(3) = (1-0.6) \cdot 0.6 = 0.24$$

Для 2-й заявки:

$$\mathbf{P}(4) = (1-0.24) \cdot 0.6 = 0.456$$

Ответ

$$\begin{cases} \mathbf{P}(2)=0.6 \\ \mathbf{P}(3)=0.24 \\ \mathbf{P}(4)=0.456 \\ \mathbf{P}(k)=\left(1-\mathbf{P}(k-1)\right) \cdot \mathbf{P}(2) \quad \forall k \geqslant 3 \end{cases}$$