

# Теория и практика применения бутстрэпа

Москва  
2023

# Содержание

<b>1. Введение</b>	<b>3</b>
1.1. История метода бутстрэпа . . . . .	3
1.2. Классическая теория построения доверительных интервалов . . . . .	3
1.3. Построение псевдовыборок . . . . .	4
1.4. Суть метода бутстрэпа . . . . .	5
<b>2. Теория основных версий бутстрэпа</b>	<b>5</b>
2.1. Перцентильный бутстрэп . . . . .	5
2.2. Обратный перцентильный бутстрэп . . . . .	6
2.3. Стьюдентизированный бутстрэп (бутстрэп t-статистики) . . . . .	6

# 1. Введение

## 1.1. История метода бутстрэпа

Словом "бутстрэп" обозначают некоторое семейство или множество статистических методов или алгоритмов, предназначенных для нахождения оценок параметров распределения и доверительных интервалов. Эти методы основаны на генерации большого числа выборок из исходной, имеющейся в распоряжении исследователя выборки с возвращением с использованием датчика (псевдо-) случайных чисел. Таким образом, из-за объема вычислений реализация бутстрэпа предполагается на компьютере.

Одной из первых работ, в которой была изложена суть метода бутстрэпа, стала статья Брэдли Эфрона «Bootstrap methods: another look at the jackknife» (1979 г.), вдохновленная более ранней работой о методе Jackknife. Позже разрабатывалась теория для нахождения более точных оценок дисперсий параметров, повышения устойчивости метода на выборках небольших размеров, с включением байесовского подхода и т.д.

## 1.2. Классическая теория построения доверительных интервалов

Пусть имеется выборка  $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$  и известно, что она была сгенерирована из нормального распределения  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$  с неизвестным математическим ожиданием  $\mu$  и известной дисперсией  $\sigma^2$ . В таком случае известным результатом является построение следующего доверительного интервала:

$$\mathbb{P} \left( \bar{X} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) = 1 - \alpha,$$

где  $\mathbb{P}(\xi \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}) = \mathbb{P}(\xi \leq -z_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$ ,  $\xi \sim \mathcal{N}(0, 1)$ .

Кроме того, похожий результат может быть получен в случае неизвестного параметра  $\sigma^2$ . В таком случае используется несмещенная оценка дисперсии

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

и получается, что

$$n \cdot \frac{\bar{X} - \mu}{\hat{\sigma}} \sim t_{n-1}$$

Тогда точный доверительный интервал приобретает вид

$$\mathbb{P} \left( \bar{X} - t_{1-\frac{\alpha}{2}; n-1} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{1-\frac{\alpha}{2}; n-1} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \right) = 1 - \alpha$$

При большом числе наблюдений стандартизированная случайная величина  $n \cdot \frac{\bar{X} - \mu}{\hat{\sigma}}$ , согласно центральной предельной теореме, по распределению сходится к стандартному

нормальному распределению вне зависимости от вида закона распределения  $X$ , т. е.

$$n \cdot \frac{\bar{X} - \mu}{\hat{\sigma}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{dist} \mathcal{N}(0, 1)$$

Поэтому может быть получен следующий асимптотический доверительный интервал:

$$\mathbb{P} \left( \bar{X} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \right) \approx 1 - \alpha.$$

Итак, было показано, что в случае построения доверительного интервала для параметра среднего в случае известного закона распределения имеется хорошо разработанная теория и могут быть получены точные или асимптотические формулы. Кроме того, такие результаты широко известны в случае построения доверительных интервалов для разницы математических ожиданий, дисперсий и отношения дисперсий.

Однако возникает вопрос, какую схему действий предпринять в случае, если закон распределения, порождающий данные, неизвестен, а также если стоит задача построить доверительный интервал для такой не менее важной характеристики, как, например, медиана распределения, асимптотический закон распределения которой не является широко известным.

По-прежнему можно построить  $\hat{\theta}$  как точечную оценку неизвестного параметра  $\theta$ . Но теоретических знаний о распределении  $\hat{\theta}$  у нас может не быть, либо же эта теория недоступна исследователю. В таком случае можно использовать бутстрэп для построения доверительного интервала. Однако прежде стоит разобраться с тем, каким образом можно создавать новые выборки на основе исходной.

### 1.3. Построение псевдовыборок

Существует два распространенных метода построения случайной выборки (пример взят из [Конспекта](#)).

- Выборка без возвращения (without replacement, simple random sampling):

Предположим, мы поочередно берем 10 карт наугад из колоды из 52 карт, не возвращая ни одну из карт обратно в колоду между взятиями. Это называется выборкой без возвращения или простой случайной выборкой. При таком методе в нашей выборке из 10 карт не будет дубликатов карт. То есть, в данном подходе, если мы захотим создать выборку, размер которой совпадает с исходной, будет получена сама исходная выборка, что ограничивает возможности в исследовании распределения данных.

- Выборка с возвращением (with replacement):

Теперь предположим, что мы берем 10 карт наугад из колоды, но после каждого взятия мы кладем карту обратно в колоду и перемешиваем карты. Это называется выборкой с возвращением. При использовании этого метода выборка из 10 карт может иметь дубликаты. Возможно и такое, что была вытянута шестерка червей все 10 раз. Такая процедура позволяет создавать отличные от исходной новые выборки, размер

которых при этом совпадает с размером исходной выборки.

## 1.4. Суть метода бутстрэпа

На основе имеющейся выборки может быть рассчитана выборочная или эмпирическая функция распределения  $\hat{F}(x)$ , которая для каждого  $x$  показывает долю наблюдений в выборке, не превосходящих  $x$ :

$$\hat{F}(x) = \frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{I}\{X_i \leq x\}}{n}$$

Известно, что эта функция обладает рядом "хороших" свойств: состоятельность, эффективность, асимптотическая нормальность, поэтому является "хорошей" оценкой для истинной функции распределения  $F(x)$ , порождающей данные.

Итак, основной идеей бутстрэпа в данном случае будет генерация  $n_{boot}$  бутстрэпированных выборок  $\mathbf{X}_1^*, \dots, \mathbf{X}_{n_{boot}}^*$  с повторениями из исходной выборки  $\mathbf{X}$  и подсчет оценки неизвестного параметра распределения  $\hat{\theta}_j^*$  для  $j$ -ой бутстрэпированной выборки,  $j \in \{1, \dots, n_{boot}\}$ , для получения распределения  $\hat{\theta}$ .

## 2. Теория основных версий бутстрэпа

### 2.1. Перцентильный бутстрэп

Одной из основных и наиболее простых техник бутстрэпа является перцентильный бутстрэп (Percentile Bootstrap). Его алгоритм следующий:

1. Из исходной выборки  $\mathbf{X}$  генерируется  $n_{boot}$  бутстрэпированных выборок  $\mathbf{X}_1^*, \mathbf{X}_2^*, \dots, \mathbf{X}_{n_{boot}}^*$ ;
2. Для каждой бутстрэпированной выборки оценивается параметр  $\hat{\theta}_j^*$ ,  $1 \leq j \leq n_{boot}$ , затем оцененные параметры сортируются по возрастанию:  $\hat{\theta}_{(1)}^* \leq \hat{\theta}_{(2)}^* \leq \dots \leq \hat{\theta}_{(n_{boot})}^*$ , и собирается вектор  $\hat{\theta}^* = (\hat{\theta}_{(1)}^*, \hat{\theta}_{(2)}^*, \dots, \hat{\theta}_{(n_{boot})}^*)$ ;
3. Оцененным  $(1 - \alpha)$ -процентным доверительным интервалом истинного параметра  $\theta$  будет отрезок от  $\frac{\alpha}{2}$  квантиля до  $1 - \frac{\alpha}{2}$  квантиля вектора  $\hat{\theta}^*$ :  $\widehat{CI}_\theta = [\hat{\theta}_{\frac{\alpha}{2}}^*; \hat{\theta}_{1-\frac{\alpha}{2}}^*]$ .

Скорость сходимости:  $|CI_\theta - \widehat{CI}_\theta| = O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ .

Оцененный таким образом доверительный интервал будет занижать вероятность накрытия.

Кроме того, если выборочное распределение было асимметричным, то это также приведет к асимметрии доверительного интервала, полученного с помощью перцентильного бутстрэпа.

## 2.2. Обратный перцентильный бутстрэп

Модификацией первого метода можно считать обратный перцентильный бутстрэп (Reverse Percentile Bootstrap). Его алгоритм:

1. Из исходной выборки  $\mathbf{X}$  генерируется  $n_{boot}$  бутстрэпированных выборок  $\mathbf{X}_1^*$ ,  $\mathbf{X}_2^*$ , ...,  $\mathbf{X}_{n_{boot}}^*$ ;
2. Для каждой бутстрэпированной выборки оценивается параметр  $\hat{\theta}_j^*$ ,  $1 \leq j \leq n_{boot}$ , далее считается отклонение полученной оценки от выборочной оценки  $d_j^* = \hat{\theta}_j^* - \hat{\theta}$ , полученные разницы сортируются по возрастанию:  $d_{(1)}^* \leq d_{(2)}^* \leq \dots \leq d_{(n_{boot})}^*$ , и собирается вектор  $d^* = (d_{(1)}^*, d_{(2)}^*, \dots, d_{(n_{boot})}^*)$ ;
3. Оцененным  $(1 - \alpha)$ -процентным доверительным интервалом разницы  $d = \hat{\theta} - \theta$  будет отрезок от  $\frac{\alpha}{2}$  квантиля до  $1 - \frac{\alpha}{2}$  квантиля вектора  $d^*$ :  $\widehat{CI}_d = [d_{\frac{\alpha}{2}}^*; d_{1-\frac{\alpha}{2}}^*]$ . Тогда для получения оценки доверительного интервала  $\theta$  необходимо выполнить ряд преобразований:

$$d_{\frac{\alpha}{2}}^* \leq d \leq d_{1-\frac{\alpha}{2}}^* \Leftrightarrow d_{\frac{\alpha}{2}}^* \leq \hat{\theta} - \theta \leq d_{1-\frac{\alpha}{2}}^* \Leftrightarrow \hat{\theta} - d_{1-\frac{\alpha}{2}}^* \leq \theta \leq \hat{\theta} - d_{\frac{\alpha}{2}}^*$$

$$\text{Таким образом, } \widehat{CI}_\theta = [\hat{\theta} - d_{1-\frac{\alpha}{2}}^*; \hat{\theta} - d_{\frac{\alpha}{2}}^*].$$

Скорость сходимости обратного перцентильного бутстрэпа совпадает со скоростью сходимости обычного перцентильного бутстрэпа:  $|CI_\theta - \widehat{CI}_\theta| = O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ .

## 2.3. Стьюдентизированный бутстрэп (бутстрэп t-статистики)

Далее рассмотрим метод, который позволит рассчитывать стандартную ошибку оценки, и учитывать ее влияние на распределение. Алгоритм стьюдентизированного бутстрэпа:

1. Из исходной выборки  $\mathbf{X}$  генерируется  $n_{boot}$  бутстрэпированных выборок  $\mathbf{X}_1^*$ ,  $\mathbf{X}_2^*$ , ...,  $\mathbf{X}_{n_{boot}}^*$ ;
2. Для каждой бутстрэпированной выборки оценивается параметр  $\hat{\theta}_j^*$ ,  $1 \leq j \leq n_{boot}$ , далее считается стандартная ошибка полученной оценки. В случае построения доверительного интервала для математического ожидания можно воспользоваться формулой

$$\widehat{se}(\hat{\theta}_j^*) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i^* - \bar{X}^*)^2}{n \cdot (n - 1)}}$$

где  $\bar{X}^*$  – среднее по бутстрэпированной выборке. Однако точная формула стандартной ошибки, например, медианы либо других выборочных характеристик может быть неизвестна.