

Билеты по Алгебре и теории чисел 19-...
3 семестр. МОиАИС.

Никита Якунцев, Андрей Сотников, Никита Хатеев, to be continued...

12 января 2014 г.

Содержание

1	Функции многих переменных	2
1.1	Билет 19	2
1.2	Билет 20	3

1 Функции многих переменных

1.1 Билет 19

Евклидово пространство. Простейшие свойства.

E - вещественное линейное пространство называется евклидовым, если задана функция $E \times E \rightarrow \mathbb{R}$, называемая скалярным произведением (обозн. $\forall x, y \exists (x, y) \in \mathbb{R}$) и выполнено 4 аксиомы:

1. $\forall x, y \in E (x, y) = (y, x)$
2. $\forall x_1, x_2, y \in E (x_1 + x_2, y) = (x_1, y) + (x_2, y)$
3. $\forall \alpha \in \mathbb{R} \forall x, y \in E (\alpha x, y) = \alpha(x, y)$
4. $\forall x \in E (x, x) \geq 0, x = 0 \Leftrightarrow (x, x) = 0$

Свойства:

1. а) $(0, y) = 0 \forall y \in E$

б) $(x, 0) = 0 \forall x \in E$

Доказательство: а) $\xrightarrow{3 \text{ axiom}}$ при $\alpha = 0 (0x, y) = 0(x, y) = (0, y) = 0, \forall y \in E$

2. а) $\forall n \in \mathbb{N}, \forall \alpha_1 \dots \alpha_n \in \mathbb{R} \forall x_1 \dots x_n, y \in E$

$$\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i, y \right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i (x_i, y)$$

Доказательство:

б) $\forall m \in \mathbb{N}, \forall \beta_1 \dots \beta_m \in \mathbb{R}, \forall y_1 \dots y_m, x \in E$

$$\left(x, \sum_{i=1}^m \beta_i y_i \right) = \sum_{i=1}^m \beta_i (x, y_i)$$

Доказательство:

с) $\forall m, n \in \mathbb{N}, \forall \alpha_1 \dots \alpha_n, \beta_1 \dots \beta_m \in \mathbb{R}, \forall x_1 \dots x_n, y_1 \dots y_m \in E$

$$\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i, \sum_{j=1}^m \beta_j y_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \alpha_i \beta_j (x_i, y_j)$$

Доказательство:

3. Пусть

а) $(x, y) = 0, \forall y \in E \Rightarrow x = 0$

а) $(x, y) = 0, \forall x \in E \Rightarrow y = 0$

Доказательство: а) $(x, y) = 0, \forall y$ пусть $y = x \Rightarrow (x, x) = 0 \xrightarrow{4 \text{ axiom}} x = 0$

4. Тождество параллелограмма

$$((x + y), (x + y)) + ((x - y), (x - y)) = 2(x, x) + 2(y, y)$$

Доказательство:

$$(x + y, x + y) + (x - y, x - y) = (x, x) + (x, y) + (y, x) + (y, y) + (x, x) - (x, y) - (y, x) + (y, y) = 2(x, x) + 2(y, y)$$

1.2 Билет 20

Неравенство Коши-Буняковского.

Теорема 1 $\forall x, y \in E$ - евкл. пр-во; $|(x, y)|^2 \leq (x, x) * (y, y) \Leftrightarrow (x, y)^2 \leq (x, x) * (y, y)$

Доказательство