

Homework 1

1. Упростить формулу:

$$((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P$$

Решение:

$$((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P = \neg(\neg(\neg P \vee Q) \vee P) \vee P = ((\neg P \vee Q) \wedge P) \vee P = (P \wedge Q) \vee P$$

2.

1) Определить значение истинности высказывания, считая, что все переменные пробегает множество действительных чисел.

$$\exists a : \forall b \exists x : x^2 + ax + b = 0$$

Решение:

$$x = -\frac{a}{2} - \frac{\sqrt{a^2 - 4b}}{2}, x = -\frac{a}{2} + \frac{\sqrt{a^2 - 4b}}{2}$$

При $a^2 < 4b$ данное выражение ложно, так как появляются мнимые числа.

2) Построить отрицание к данному высказыванию.

Решение:

$$\neg(\exists a : \forall b \exists x : x^2 + ax + b = 0) \implies \forall a \exists b : \forall x x^2 + ax + b \neq 0$$

3. Доказать, что:

$$A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$$

Решение:

$$\begin{aligned} x \in (A \setminus B) \cup (A \cap C) &= x \in (A \setminus B) \vee x \in (A \cap C) = (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \in C) = \\ &= x \in A \wedge (x \notin B \vee x \in C) = x \in A \wedge \neg(x \in B \wedge x \notin C) = x \in A \wedge x \notin (B \setminus C) = \\ &= x \in A \setminus (B \setminus C) \end{aligned}$$

4.

Высказывание $\forall x(\neg P(x) \rightarrow (P(x) \vee \neg(\neg Q(x) \rightarrow P(x))))$ ложно. Докажите, что $\forall x, P(x)$ ложно, а $\exists x : Q(x)$ истинно.

Решение:

$$\neg P(x) \rightarrow (P(x) \vee \neg(\neg Q(x) \rightarrow P(x))) = 0 \implies$$