Equipment

Endotracheal tube (Cuff)

a-0.5 | a | a+0.5

$$a = \frac{\text{อายุ}}{4} + 3.5$$

ใส่ถอง

Endotracheal tube (Un-Cuff)

b-0.5 | b | b+0.5

$$b = \frac{\text{อายุ}}{4} + 4$$

ใส่ปาก

หากว่า $\left(\frac{age}{2}\right) + 12$

Depth (cm)

- < 2 Year (Size ET-Tube x3)
- > 2 Year $(age/2) + 12$

Stylet (F)

Suction Catheter (F)

No

8
10
12
14
16

หากว่า อายุ

Table 16.7 Endotracheal Tube, Suction Catheter, and Stylet Size Based on Age and Weight

Age (yr)	Weight (kg)	Endotracheal Tube ID (mm)	Suction Catheter (F)	Stylet (F)
Premature	<1.5	2.5	6	6
Premature	1.5-2.5	3.0	6	6
Newborn	3.5	3.5	8	6
1	10	4.0	8	6
2-3	15	4.5	10	6
4-6	20	5.0	10	10
7-9	30	5.5	12	10
10-12	40	6.0	14	10
13-15	50	6.5	14	14
>16	>60	7.0	18	14

ID, Internal diameter.

หากว่า อายุ

Table 16.7 Endotracheal Tube, Suction Catheter, and Stylet Size Based on Age and Weight

Age (yr)	Weight (kg)	Endotracheal Tube ID (mm)	Suction Catheter (F)	Stylet (F)
Premature	<1.5	2.5	6	6
Premature	1.5-2.5	3.0	6	6
Newborn	3.5	3.5	8	6
1	10	4.0	8	6
2-3	15	4.5	10	6
4-6	20	5.0	10	10
7-9	30	5.5	12	10
10-12	40	6.0	14	10
13-15	50	6.5	14	14
>16	>60	7.0	18	14

ID, Internal diameter.

Equipment

Laryngoscope

มาจากอายุ

Miller

Mac

Recommended Laryngoscopic Blade & LMA Sizes			
Age	Blade	Weight (kg)	LMA Size
Premature	Miller 0	<5	1
Neonate	Miller 0	5–10	1.5
1–4 yrs	Miller 1	10–20	2
4–10 yrs	Miller 2, Mac 2	20–30	2.5
Adolescent	Miller 2, Mac 3	>30	3
Normal/large adults	Miller 2, Mac 3–4	60–90	3–5
Large adults	Miller 2–3, Mac 3–4	>90	5

Self Inflating Bag

Anesthetics Face Mask

Appropriate size

LMA

No.

blow cuff

(ml)

จากน้ำหนัก

ตารางที่ 9 ขนาดของ laryngeal mask airway (LMA)

น้ำหนัก (กก.)	ขนาด	ปริมาตรของลมที่ใส่ cuff (มล.)
< 6	1	4
6 - 10	1.5	7
10 - 20	2	10
20 - 30	2.5	15
30 - 50	3	20
50 - 70	3.5	30
> 70	4	40

Medicine | Equipment | Vital Signs

Equipment

Oropharyngeal Airway

Appropriate size

Infusion Pump

1 เครื่อง

NIBP Cuff

Appropriate size

NSS 100 ml

1 ขวด

Medicine | Equipment | Vital signs