

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)
(r)
(s)
(t)
B5: h
B5: h_f
B6: K
B7: λ
$H = -\sum_{\triangle\uparrow} ZZZ - h\sum X$
from $|+x\rangle$
triangular 4×4, N=16
from gs(h = 1.5)
triangular 4×4, N=16
$H = -\sum_{\square} ZZ - K\sum_{\square} ZZZZ - 0.5\sum X$
from $|+x\rangle$
square 4×4, N=16
$H = -\sum_{\triangle} ZZZ - \lambda\sum ZZ - 0.5\sum X$
from $|+x\rangle$
triangular 4×4, N=16
$t/t_{\max}(g)$
time t [$1/J$]
$\mu_{\rm ph}$
$\log_{10} w_{hi}^{\rm ph}$
$\log_{10} R_4$
$\log_{10} \Phi_4$
$\chi_\epsilon/\chi_{\rm cap}$
t_μ^* (μ or $\mu_{\rm ph} = -10$)
t_w^* (w_{hi} or $w_{hi}^{\rm ph} = 1\%$)
t_S ($S = S_{\rm Page}/2$)
χ_ϵ at cap
special value