

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)
(r)
(s)
(t)
G4: h_f
R1: Ω/V_{nn}
S1: ϵ
I5: h_x
$H=-\sum r_{ij}^{6} Z_i Z_j - h_f \sum X$
from gs($h_f=4$)
square 4×3, $N=12$
$H=(\Omega/2)\sum X+\sum V_m r_{ij}^{6} n_i n_j$
from $|{+x}\rangle$
square 4×3, $N=12$
$H=-\sum A_s-\sum B_p+\epsilon\sum Z$
from $|\theta=\pi/4\rangle$
toric code 2×3, $N=12$
$H=\sum_{\triangle} ZZZ+h_x\sum X$
from $|{+x}\rangle$
triangular 4×3, $N=12$
time t $[1/J_{nn}]$
time t $[1/J]$
$t/t_{\max}(g)$
$\mu_{\rm ph}$
$\log_{10} w_{hi}^{\rm ph}$
$\log_{10} R_4$
$\log_{10}\Phi_4$
$\chi_\epsilon/\chi_{\rm cap}$
t_μ^* (μ or $\mu_{\rm ph}=-10$)
t_w^* (w_{hi} or $w_{hi}^{\rm ph}=1\%$)
t_S ($S=S_{\rm Page}/2$)
χ_ϵ at cap
special value