

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)
(r)
(s)
(t)
G4: $h_f$
R1: $\Omega/V_{nn}$
S1: $\epsilon$
I5: $h_x$
$H = -\sum r_{ij}^{-6} Z_i Z_j - h_f \sum X$
from gs($h_f = 4$)
square $4 \times 3$, $N = 12$
$H = (\Omega/2)\sum X + \sum V_m r_{ij}^{-6} n_i n_j$
from $|+x\rangle$
square $4 \times 3$, $N = 12$
$H = -\sum A_s - \sum B_p + \epsilon \sum Z$
from $|\theta = \pi/4\rangle$
toric code $2 \times 3$, $N = 12$
$H = \sum_{\triangle} ZZZ + h_x \sum X$
from $|+x\rangle$
triangular $4 \times 3$, $N = 12$
time $t$ $[1/J_{nn}]$
time $t$ $[1/J]$
$t/t_{\max}(g)$
$\log_{10} R_2$
$\log_{10} \Phi_2$
$\log_{10} w_{hi}$
$\mu$
$S$ [nats]
$t^*_\mu$ ($\mu$ or $\mu_{\rm ph} = -10$)
$t^*_w$ ($w_{hi}$ or $w^{\rm ph}_{hi} = 1\%$)
$t_S$ ($S = S_{\rm Page}/2$)
$\chi_\epsilon$ at cap
special value