experiment 11

```r
scores <- c(45, 60, 72, 85, 95)

minimum <- min(scores)
maximum <- max(scores)
mid_range <- (minimum + maximum) / 2

print(minimum)
print(maximum)
print(mid_range)
```

```
> scores <- c(45, 60, 72, 85, 95)
>
> minimum <- min(scores)
> maximum <- max(scores)
> mid_range <- (minimum + maximum) / 2
>
> print(minimum)
[1] 45
> print(maximum)
[1] 95
> print(mid_range)
[1] 70
>
```

experiment 12

```r
marks <- c(55, 65, 70, 80, 90, 95)

average <- mean(marks)
std_dev <- sd(marks)

z_scores <- (marks - average) / std_dev

print(z_scores)
```

```
> marks <- c(55, 65, 70, 80, 90, 95)
>
> average <- mean(marks)
> std_dev <- sd(marks)
>
> z_scores <- (marks - average) / std_dev
>
> print(z_scores)
[1] -1.3614329 -0.7079451 -0.3812012  0.2722866  0.9257743  1.2525182
>
```

13. experiment 13


```r
values <- c(10, 20, 30, 40, 50, 60)
average <- mean(values)
minimum <- min(values)
maximum <- max(values)

normalized <- (values - minimum) / (maximum - minimum)


print(average)
print(minimum)
print(maximum)
print(normalized)
```

```
> values <- c(10, 20, 30, 40, 50, 60)
> average <- mean(values)
> minimum <- min(values)
> maximum <- max(values)
>
> normalized <- (values - minimum) / (maximum - minimum)
>
> print(average)
[1] 35
> print(minimum)
[1] 10
> print(maximum)
[1] 60
> print(normalized)
[1] 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
```


14. experiment 14




15. experiment 15




16. experiment 16




17. experiment 17



18. experiment 18



19. experiment 19



20. experiment 20