Praktické cvičenie CanHip: Poruchy správania psov – Úvod, rôzne

Na zopakovanie:

Okrem kategórie normálneho správania rozlišujeme:

- Problémové nežiaduce správanie normálne, prirodzené, druhovo špecifické správanie
 (značkovanie, hryzenie,...), avšak v nevhodnom kontexte, nechcené majiteľom
- Abnormálne správanie (etopatie) patologické prejavy správania sa, charakterizované frekvenciou, trvaním a/alebo intenzitou, ktorá sa líši od normy pre daný druh (vek, pohlavie,...)
 - často sú tieto kategórie správania vzájomne zamieňané!
- vznikajú vo veľkej miere ako dôsledok neschopnosti jedinca vyrovnať sa s problémovou situáciu,
 nevhodným prostredím, a pod.

Etopatie delíme na:

- Primárne vznikajúce prvotne ako dôsledok emocionálneho (psychického) problému
- Sekundárne vznikajú sekundárne (t.j. druhotne) ako sprievodný príznak alebo dôsledok ochorenia/organickej poruchy jedinca

Najčastejšie vyskytujúce sa poruchy správania u psov:

- Separačná anxieta = úzkosť z odlúčenia (nadmerná naviazanosť na majiteľa)
- Neadekvátne strachové prejavy
- Generalizovaná úzkosť
- Agresivita
- Nadmerná reaktivita

- Abnormálne repetitívne prejavy (stereotypie)
- Nadmerná vokalizácia
- Eliminačné problémy
- Problémy starých psov (kognitívna dysfunkcia)
- Abnormálna hyperaktivita extrémny pohyb zvieraťa v porovnaní s jeho plemenným štandardom, môže viesť k agresívnym atakom na zviera príp. človeka
- 2. **Nadmerná submisivita** genetika: psy dedia submisívny temperament po rodičoch, voči dominantným psom sa správajú veľmi submisívne (pri pozdrave, vítaní členov rodiny, pri trestaní a pod.), exponujú brušnú oblasť, močia. Ide o konfliktné správanie (konflikt priblíženia/ústup), už ritualizovaný = signál oponentovi, aby obmedzil agresívne správanie. Tp.: výcvik, posilnenie sebadôvery, netrestať
- Extrémna vokalizácia mnoho dôvodov: zdedený prvok správania, nevhodne naučená odpoveď, obrana teritória, hra. Tp.: obmedziť odmeňovanie, ktoré nasleduje po štekaní (ignorovať), kontra-podmieňovanie (naučiť správanie nekompatibilné so štekaním, zámena odpovedí)
- 4. **Et-epimeletická anomália** ide o abnormálnu motiváciu psa komunikovať s majiteľom so širokým registrom prejavov, v extrémnych prípadoch (ojedinele) až suicidálny charakter, komplikovanosť stanovenia dg. Dôvod: silná fixácia psa na majiteľa a náhle prerušenie tohto vzťahu
- 5. **Migračné aktivity** je "túlavá" alebo úteková motivácia, má potravové alebo sexuálne pozadie

6. Abnormálne digestívne správanie

- a) Koprofágia: konzumácia trusu má rôzne príčiny, Tp.: zmena diéty, pravidelné kŕmenie a prechádzky, odstraňovanie exkrementov, spoľahlivá metóda však neexistuje
- b) Pica: je konzumácia nepožívateľných predmetov, Tp.: modifikácia správania ako u koprofágie, nácvik povelov k upusteniu predmetu

- c) Anorexia: v behaviorálnom kontexte je anorexia odmietanie potravy u ináč zdravého jedinca, ak je náhly nástup, potrebné vet. vyšetrenie!!!. Dôvody: naučené správanie, u adoptovaných psov, strach z podnetov spojených s konzumáciou potravy alebo z iných (dominantných) psov v domácnosti a podobne. Tp.: kŕmenie v pravidelných intervaloch, inak žiadne maškrty, zvýšiť aktivitu psa, venovať mu pozornosť počas kŕmenia
- d) Polydipsia: príznak mnohých ochorení, preto dôležité vyšetrenie u veterinára!, behaviorálne príčiny: hravosť, stresové správanie, kompulzívne správanie (kedy pitie nahradzuje iné aktivity, je náročné pozornosť psa odviesť iným smerom). Tp.: zmeny denného režimu, rôzne hry, zmena typu misky, prognóza opatrná
- 7. **Abnormálne eliminačné správanie** Nežiaduca urinácia: dôvodom je nedostatočný návyk, značkovanie teritória, separačná anxieta, strach, nadmerná submisivita, ochorenia (dif. dg.: diabetes mellitus, diabetes insipidus, nádory, pyometra, renálna alebo pečeňová insufuciencia = nedostatočnosť, hopokalémia,....), kognitívna dysfunkcia,...Tp.: kastrácia u samcov (redukcia značkovania o 50 %), odstrániť vyvolávajúcu príčinu, očistiť označkované povrchy, zámena odpovedí (behaviorálna terapia: systemická desenzitizácia), netrestať (neúčinné)
- 8. **Problémové materské správanie** patrí sem infanticita a infantofóbia, obe sú psychologickou alebo neurotickou reakciou matky na normálne správanie šteniat, príčina: traumatický zážitok v priebehu gravidity alebo pôrodu