## 1. ARHENIOVÁ TEÓRIA

**KYSELINA-** látka ktorá je schopná vo vodnom roztoku odštepovať katióny H<sup>+</sup>

ZÁSADA- látka ktorá je vo vodnom roztoku schopná odštepovať hydroxidové anióny OH-

**NEDOSTATKY:** viazaná iba na vodné prostredie

Zásady sú aj látky ktoré nemajú OH-skupinu

## 2. BRONSTEDOVÁ TEÓRIA

KYSELINA- látka schopná odovzdať protóny vodíka H<sup>+</sup> (darca) HCl- H<sup>+</sup>

CI

ZÁSADA- látka schopná protón vodíka prijímať (príjemca) NH₃+ H<sup>♣</sup> NH₄<sup>+</sup>

Kyselinami môžu byť: Zásadami môžu byť:

NEUTRÁLNE MOLEKULY: HNO<sub>3</sub>, HCl, H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> NEUTRÁLNE MOLEKULY: H<sub>2</sub>O, HN<sub>3</sub>

ANIÓNY: HCO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> ANIÓNY: CO<sub>2</sub>-2, HCO<sub>3</sub>-, OH

KATIÓNY:NH<sub>4</sub><sup>+</sup>- amónny katión, H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>- oxóniový katión

## **AMFOTÉRNE LÁTKY**

Reagujú aj ako kyseliny aj ako zásady (môžu odovzdávať aj prijímať H<sup>+</sup>) závisí to od reakčného partnera


## PRI PROTOLYTICKEJ REAKCIÍ

HNO<sub>2</sub>+ H<sub>2</sub>O **↓** H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>+ NO<sub>2</sub><sup>-</sup> môžeme rozdeliť na 2 čiastkové reakcie:

Z kyseliny odštiepením protónu vzniká KONJUGOVANÁ ZÁSADA HNO3- H<sup>+</sup>→ NO<sub>2</sub>-

Zo zásady prijatím protónu vzniká KONJUGOVANÁ KYSELINA H<sub>2</sub>O+ H<sup>+</sup> 

→ H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>



Sila kyselín- **silné kyseliny** odštepujú protóny **veľmi ľahko**(v roztoku sú takmer uplne disociované na ióny)

Kyselina chloristá, jodovodíková, bromovodíková, chlorovodíková, dusičná, sírová

-slabé kyseliny uvoľňujú protóny veľlmi ťažko, ich disociácia je len čiastková

Mieru sily kyselín a zásad- DISOCIAČNÁ KONŠTANTANTA

Disociačná konštanta kyseliny (ACIDUM) K<sub>A</sub> – všeobecne sa kyselina označuje HA

Disociačná konštanta zásady (BÁZA) K<sub>B</sub>

Disociačná konštanta kyseliny sa vyjadruje nasledovne: