

Average

Class : 1

"It is never too late to be what you might have been."

Q.1

What is the average of the first 15 whole numbers ?

पहली 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है?

- (a) 8
- (b) 7
- (c) 9
- (d) 10

Q.2

What is the ratio of the average of first eight prime numbers to the average of first ten even natural numbers ?

पहली 8 अभाज्य संख्याओं के औसत और पहली 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत का अनुपात क्या है?

- (a) 1:7
- (b) 7:80
- (c) 8:70
- (d) 7:8

Q.3

What is the average of the first 8 multiples of 6 among the natural numbers ?

प्राकृतिक संख्याओं में 6 के पहले 8 गुणजों का औसत क्या है?

- (a) 24
- (b) 26
- (c) 27
- (d) 28

Q.4

The average of odd numbers upto 200 is ?

200 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है?

- (a) 50
- (b) 100
- (c) 75
- (d) NONE

Q.5

The average of square of natural numbers from 1 to 77 ?

1 से 77 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है?

- (a) 2010
- (b) 2015
- (c) 2020
- (d) 2025

Q.6

The average of eleven consecutive positive integers in increasing order is 150. If the next four odd numbers are included, then what is the average of all the numbers ?

11 क्रमागत धनात्मक पूर्णाकों का औसत 150 है। यदि उनके बाद आने वाली अगली 4 विषम संख्याएँ भी शामिल कर ली जाएँ, तो सभी संख्याओं का नया औसत क्या होगा?

- (a) 152.33
- (b) 152.67
- (c) 152.50
- (d) 150

Q.7

The sum of eight consecutive even numbers of set-A is 296. What is the sum of different set of five consecutive whose lowest number is 15 more than the mean of set-A ?

समुच्चय-A की 8 क्रमागत सम संख्याओं का योग 296 है। दूसरी 5 क्रमागत संख्याओं के एक समुच्चय में सबसे छोटी संख्या, set-A के औसत से 15 अधिक है। उन 5 संख्याओं का योग क्या होगा?

- (a) 275
- (b) 270
- (c) 250
- (d) 286

Q.8

The average of 8 consecutive even numbers written in ascending order is 23. What is the average of the last 3 numbers, 36 and 40 ?

आरोही क्रम में लिखी 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है। अंतिम 3 संख्याएँ, 36 और 40 का औसत क्या होगा?

- (a) 31
- (b) 31.5
- (c) 32
- (d) 34

Q.9

If the average of N consecutive Numbers is 21, find the average of $N+7$ consecutive numbers ?

यदि N क्रमागत संख्याओं का औसत 21 है, तो $N+7$ क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा?

- (a) 28
- (b) 25
- (c) 26
- (d) 27

Q.10

The average of 15 consecutive positive integers is d . If the last two numbers are excluded, by how much will the average increase or decrease ?

15 क्रमागत धनात्मक पूर्णाकों का औसत d है। यदि अंतिम 2 संख्याएँ हटा दी जाएँ, तो औसत कितने से बढ़ेगा या घटेगा?

- (a) Will decrease by 1.
- (b) Will increase by 2.
- (c) Will decrease by 2.
- (d) Will increase by 1.

Q.11

If the sum of eighteen consecutive positive integers is a perfect square then find the smallest possible value of sum ?

यदि 18 क्रमागत धनात्मक पूर्णाकों का योग एक पूर्ण वर्ग हो, तो उस योग का सबसे छोटा संभव मान क्या होगा?

- (a) 225
- (b) 169
- (c) 289
- (d) 324

Q.12

The average of the squares of four consecutive odd natural numbers is 681. The average of 3 times of the largest number and 11 times of the smallest number is ?

4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 681 है। सबसे बड़ी संख्या के 3 गुने और सबसे छोटी संख्या के 11 गुने का औसत क्या होगा?

- (a) 176
- (b) 178
- (c) 170
- (d) 166

Q.13

The average of the squares of five consecutive even natural numbers is 264. The average of 5 times of smallest number and 3 times of largest number is ?

5 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 264 है। सबसे छोटी संख्या के 5 गुने और सबसे बड़ी संख्या के 3 गुने का औसत क्या होगा?

- (a) 52
- (b) 56
- (c) 60
- (d) 64

Q.14

There are N consecutive odd integers in ascending order. The First integer is N and the average of the first Five is 194 less than the last second number. Find the value of N ?

N क्रमागत विषम पूर्णांक आरोही क्रम में हैं। पहली संख्या N है और पहली 5 संख्याओं का औसत, अंत से दूसरी संख्या से 194 कम है। N का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 100
- (b) 101
- (c) 99
- (d) 102

Q.15

There are 2 consecutive even numbers and 3 consecutive odd numbers. The average of the even numbers is 3 more than the average of the odd numbers. If the sum of the even numbers is 2 more than the sum of the odd numbers, find the average of the odd numbers ?

2 क्रमागत सम संख्याएँ और 3 क्रमागत विषम संख्याएँ हैं। सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं के औसत से 3 अधिक है। यदि सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं के योग से 2 अधिक है, तो विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 3
- (b) 4
- (c) 5
- (d) 6

Q.16

The average of n number is 36. If each of 75% of the numbers is increased by 6 and each of the remaining numbers is decreased by 9, then the new average of the numbers is ?

n संख्याओं का औसत 36 है। यदि उनमें से 75% संख्याओं में 6 की वृद्धि कर दी जाए और शेष संख्याओं में 9 की कमी कर दी जाए, तो नया औसत क्या होगा?

- (a) 37.125
- (b) 33.75
- (c) 38.25
- (d) 36.25

Q.17

There are four consecutive odd numbers, denoted as a_1, a_2, a_3 , and a_4 , and three consecutive even numbers, represented by b_1, b_2 , and b_3 . The average of the four odd numbers is 4 less than the average of the three even numbers. Also, the sum of the three even numbers is 6 less than the sum of the four odd numbers. What is the average of a_1, a_2, a_3 , and a_4 ?

चार क्रमागत विषम संख्याएँ a_1, a_2, a_3, a_4 हैं और तीन क्रमागत सम संख्याएँ b_1, b_2, b_3 हैं। चारों विषम संख्याओं का औसत, तीनों सम संख्याओं के औसत से 4 कम है। साथ ही, तीनों सम संख्याओं का योग, चारों विषम संख्याओं के योग से 6 कम है। a_1, a_2, a_3 और a_4 का औसत क्या होगा?

- (a) 14
- (b) 18
- (c) 16
- (d) 12

Q.18

A is the average marks of a group of 10 students in a class and $A+8$ is the average of a group of 15 students which includes the group of 10 students as given. The total marks obtained by the group of 10 students is X and the total marks obtained by the group of 15 students is Y. If $X:Y = 3:5$, then the value of $A + X + Y$ is _.

A किसी कक्षा के 10 छात्रों के एक समूह के औसत अंक हैं और $A+8$ उन 15 छात्रों के समूह का औसत है जिसमें वही 10 छात्र शामिल हैं। 10 छात्रों के समूह के कुल अंक X हैं और 15 छात्रों के समूह के कुल अंक Y हैं। यदि $X:Y = 3:5$ हो, तो $A + X + Y$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1964
- (b) 1845
- (c) 2012
- (d) 1992

Q.19

Let a, b and c be natural numbers. If the average value of 20% of a and 30% of b is 270; that of 10% of b and 25% of c is 115 and the difference between b and c is 200, then what is the value of $(a + b + 2c)$?

मान लीजिए a, b और c प्राकृतिक संख्याएँ हैं। यदि a के 20% और b के 30% का औसत 270 है; b के 10% और c के 25% का औसत 115 है तथा b और c का अंतर 200 है, तो $(a + b + 2c)$ का मान क्या होगा?

- (a) 3680
- (b) 4152
- (c) 2750
- (d) 3500

Q.20

The average of 27 consecutive integers is N. Dropping the first 5 numbers and including the next 9, the average is changed to M. If the value of $M^2 - N^2 = 301$, Then Find the value of M and N.

27 क्रमागत पूर्णाकों का औसत N है। पहली 5 संख्याएँ हटाकर अगली 9 संख्याएँ शामिल करने पर नया औसत M हो जाता है। यदि $M^2 - N^2 = 301$ हो, तो M और N के मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 25,18
- (b) 15,25
- (c) 12,16
- (d) 18,20

Q.21

The average of 7 even consecutive natural number is N. Dropping the first 2 even Numbers and including the next 2 even numbers the average is changed to M. If the value of $M^2 - N^2 = 240$. Then Find M and N ?

7 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत N है। पहली 2 सम संख्याएँ हटाकर अगली 2 सम संख्याएँ जोड़ने पर नया औसत M हो जाता है। यदि $M^2 - N^2 = 240$ हो, तो M और N ज्ञात कीजिए।

- (a) 28,30
- (b) 34,28
- (c) 28,32
- (d) 26,32

Q.22

The average of 25 numbers is 42.5. The average of first 12 numbers is 38.5 and average of last 12 numbers is 48.5. Find the 13th number ?

25 संख्याओं का औसत 42.5 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 38.5 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 48.5 है। 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 18
- (b) 18.5
- (c) 20.5
- (d) 24

Q.23

The average of 15 numbers is 80. The average of the first six numbers is 70. The average of the next six numbers is 20% more than the average of the first six numbers. The 13th number is 4 less than the 15th number, and the 14th number is 4 greater than the 15th number. what is the Average of the 13th and 14th numbers ?

15 संख्याओं का औसत 80 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 70 है। अगली 6 संख्याओं का औसत, पहली 6 संख्याओं के औसत से 20% अधिक है। 13वीं संख्या, 15वीं संख्या से 4 कम है और 14वीं संख्या, 15वीं संख्या से 4 अधिक है। 13वीं और 14वीं संख्याओं का औसत क्या होगा?

- (a) 96
- (b) 100
- (c) 92
- (d) 94

Q.24

The average of 12 numbers is 58. The average of the first 5 numbers is 55, and the average of the next 4 numbers is 62. If the 10 number is 10 less than the 11 number and is 5 more than the 12 number, then the average of the 11 and 10 numbers is ?

12 संख्याओं का औसत 58 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 55 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 62 है। यदि 10वीं संख्या, 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है, तो 10वीं और 11वीं संख्याओं का औसत क्या होगा?

- (a) 5
- (b) 61
- (c) 60
- (d) 5

Q.25

The average of 27 numbers is 58. The average of the first 14 numbers is 66.6 and that of the last 14 numbers is 52.4. If the 14th number is excluded, then what is the average of the remaining numbers (correct to one decimal place) ?

27 संख्याओं का औसत 58 है। पहली 14 संख्याओं का औसत 66.6 है और अंतिम 14 संख्याओं का औसत 52.4 है। यदि 14वीं संख्या हटा दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत (एक दशमलव तक सही) क्या होगा?

- (a) 54.5
- (b) 56.4
- (c) 58.2
- (d) 60

Q.26

The average of 28 numbers is 52.5. The average of the first 12 numbers is 48.8 and that of the next 13 numbers is 45.8. If the other 3 numbers are excluded, then what is the average of the remaining numbers ?

28 संख्याओं का औसत 52.5 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 48.8 है और अगली 13 संख्याओं का औसत 45.8 है। यदि शेष 3 संख्याएँ हटा दी जाएँ, तो बची हुई संख्याओं का औसत क्या होगा?

- (a) 47
- (b) 47.24
- (c) 48
- (d) 48.50

Q.27

The average of 52 numbers is 48.5. The average of the first 22 numbers is 59.8 and that of the last 32 numbers is 41.7. If the 21st and 22nd numbers are excluded, then what is the average of the remaining numbers ?

52 संख्याओं का औसत 48.5 है। पहली 22 संख्याओं का औसत 59.8 है और अंतिम 32 संख्याओं का औसत 41.7 है। यदि 21वीं और 22वीं संख्याएँ हटा दी जाएँ, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा?

- (a) 40.20
- (b) 45.80
- (c) 47.88
- (d) 54.33

Q.28

The average of 41 numbers is 16. The average of the first 17 numbers is 27 and the average of the last 25 numbers is 26. If the 17th number from the beginning is excluded, then what is the average of the remaining numbers ?

41 संख्याओं का औसत 16 है। पहली 17 संख्याओं का औसत 27 है और अंतिम 25 संख्याओं का औसत 26 है। यदि शुरुआत से 17वीं संख्या हटा दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा?

- (a) 9.085
- (b) 5.5
- (c) 3.43
- (d) 5.075

Q.29

The average of 33 numbers is 74. The average of the first 17 numbers is 72.8 and that of the last 17 numbers is 77.2. If the 17th number is excluded, then what will be the average of the remaining numbers (correct to one decimal place)?

33 संख्याओं का औसत 74 है। पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 17वीं संख्या हटा दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत (एक दशमलव तक सही) क्या होगा?

- (a) 72.9
- (b) 73.4
- (c) 71.6
- (d) 70.8

Q.30

In a class, the number of girls is 60% more than the number of boys. Boys have an average weight of 4 kg more than twice the weight of girls. If the average weight of all boys and girls is 50 kg, then what is the average weight (in kg) of girls ?

एक कक्षा में लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से 60% अधिक है। लड़कों का औसत वजन, लड़कियों के औसत वजन के दोगुने से 4 kg अधिक है। यदि सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 50 kg है, तो लड़कियों का औसत वजन (kg में) क्या है?

- (a) 35
- (b) 40
- (c) 42
- (d) 38

Q.31

The average score of 84 students (boys and girls) in a test is 55. The ratio of the numbers of boys to that of girls is 4:3. The average score of the boys is 46.66% less than that of the girls. What is the average score of the boys in the test ?

एक परीक्षा में 84 छात्रों (लड़के और लड़कियाँ) का औसत अंक 55 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। लड़कों का औसत अंक, लड़कियों के औसत अंक से 46.66% कम है। लड़कों का औसत अंक क्या है?

- (a) 40
- (b) 45
- (c) 55
- (d) 64

Q.32

In a class of 80 students (boys and girls) there are 60% girls. The average weight of the boys is 64 kg and that of the girls is 48 kg. What is the average weight (in kg) of the whole class ?

80 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़कियाँ हैं। लड़कों का औसत वजन 64 kg और लड़कियों का औसत वजन 48 kg है। पूरी कक्षा का औसत वजन (kg में) क्या होगा?

- (a) 55
- (b) 54.4
- (c) 53.6
- (d) 56.2

Q.33

The average age of 125 students in a group is 64.8 years. 40% of the students are boys and the rest are girls. The average age of the boys is 20% more than the average age of the girls. What is the average age (in years) of the boys ?

125 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 64.8 वर्ष है। 40% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियाँ हैं। लड़कों की औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है। लड़कों की औसत आयु (वर्षों में) क्या है?

- (a) 68
- (b) 72
- (c) 75
- (d) 84

Average

Class : 2

"Almost everything will work again if you unplug it for a few minutes, including you."

Q.34

In an NCC camp, the average weight was 72 kg. If 5 cadets having average weight 76 kg leave and 11 cadets of average weight 79 kg join the group, the average weight of the cadets in the group increases by 0.6 kg. The number of cadets, initially in the group was ?

एक NCC कैम्प में औसत वजन 72 kg था। यदि 76 kg औसत वजन वाले 5 कैडेट समूह छोड़ देते हैं और 79 kg औसत वजन वाले 11 कैडेट समूह में शामिल होते हैं, तो समूह का औसत वजन 0.6 kg बढ़ जाता है। प्रारंभ में कैडेटों की संख्या कितनी थी?

- (a) 85
- (b) 81
- (c) 89
- (d) 91

Q.35

The average weight of a certain number of students in a group is 72 kg. If 10 students having an average weight of 78 kg leave and 4 students having an average weight of 80 kg join the group, the average weight of the students in the group decreases by 0.7 kg. The number of students initially in the group is ?

किसी समूह में कुछ छात्रों का औसत वजन 72 kg है। यदि 78 kg औसत वजन वाले 10 छात्र चले जाएँ और 80 kg औसत वजन वाले 4 छात्र समूह में आ जाएँ, तो समूह का औसत वजन 0.7 kg घट जाता है। प्रारंभ में छात्रों की संख्या कितनी थी?

- (a) 56
- (b) 46
- (c) 44
- (d) 54

Q.36

The average weight of a certain number of students in a class is 68.5 kg. If 4 new students having weights 72.2 kg, 70.8 kg, 70.3 kg and 66.7 kg join the class, then the average weight of all the students increases by 300 g. The number of students in the class initially is ?

एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन 68.5 kg है। यदि 72.2 kg, 70.8 kg, 70.3 kg और 66.7 kg वजन वाले 4 नए छात्र कक्षा में जुड़ते हैं, तो सभी छात्रों का औसत वजन 300 g बढ़ जाता है। प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी?

- (a) 21
- (b) 16
- (c) 11
- (d) 26

Q.37

The average weight of a certain number of students in a class is 55.5 kg. If 4 students with average weight 60 kg join the class, then the average weight of all students in the class increases by 360 g. The number of students in the class initially is ?

एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन 55.5 kg है। यदि 60 kg औसत वजन वाले 4 छात्र और जुड़ते हैं, तो पूरी कक्षा का औसत वजन 360 g बढ़ जाता है। प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी?

- (a) 41
- (b) 31
- (c) 36
- (d) 46

Q.38

The average height of a certain number of students in a group is 155.6 cm. If 12 students having an average height of 150.5 cm join the group and 7 students having an average height of 159 cm leave the group, the average height of the students in the group will decrease by 34 mm. What is the number of students initially in the group ?

एक समूह में कुछ छात्रों की औसत ऊँचाई 155.6 cm है। यदि 150.5 cm औसत ऊँचाई वाले 12 छात्र समूह में जुड़ें और 159 cm औसत ऊँचाई वाले 7 छात्र समूह छोड़ दें, तो समूह की औसत ऊँचाई 34 mm घट जाती है। प्रारंभ में समूह में छात्रों की संख्या कितनी थी?

- (a) 30
- (b) 25
- (c) 40
- (d) 20

Q.39

The average weight of some persons in a group is 76 kg. If 15 persons with average weight 72 kg join the group or 5 persons with average weight 84 kg leave the group, the average weight of the persons in the group in both cases is the same. How many persons were there in the group, initially ?

एक समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 76 kg है। यदि 72 kg औसत वजन वाले 15 व्यक्ति समूह में जुड़ जाएं या 84 kg औसत वजन वाले 5 व्यक्ति समूह छोड़ दें, तो दोनों ही स्थितियों में समूह का औसत वजन समान रहता है। प्रारंभ में समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी?

- (a) 42
- (b) 35
- (c) 45
- (d) 54

Q.40

The average weight of some boys in a group is 45 kg. If 10 boys with an average weight of 39 kg join the group or 10 boys with an average weight of 49 kg leave the group, then the average weight of boys in both cases is equal. How many boys were there in the group initially ?

एक समूह में कुछ लड़कों का औसत वजन 45 kg है। यदि 39 kg औसत वजन वाले 10 लड़के समूह में आ जाएं या 49 kg औसत वजन वाले 10 लड़के समूह छोड़ दें, तो दोनों ही स्थितियों में समूह का औसत वजन समान रहता है। प्रारंभ में समूह में लड़कों की संख्या कितनी थी?

- (a) 50
- (b) 52
- (c) 60
- (d) 65

Q.41

The average weight of some members of a club is 70 kg. If 15 members with an average weight of 60 kg join the club or 5 members with an average weight of 90 kg leave the club, then the average weight of members in both cases is equal. How many members were there in the club initially ?

एक क्लब में कुछ सदस्यों का औसत वजन 70 kg है। यदि 60 kg औसत वजन वाले 15 सदस्य क्लब में जुड़ जाएं या 90 kg औसत वजन वाले 5 सदस्य क्लब छोड़ दें, तो दोनों स्थितियों में सदस्यों का औसत वजन समान रहता है। प्रारंभ में क्लब में सदस्यों की संख्या कितनी थी?

- (a) 45
- (b) 48
- (c) 54
- (d) 64

Q.42

There are 45 students in a hostel. If the number of students increases by 5, the total expenses of the mess increase by ₹30 per day while the average daily expenditure per head diminishes by ₹2. Find the original total daily expenditure of the mess ?

एक हॉस्टल में 45 छात्र हैं। यदि छात्रों की संख्या 5 बढ़ जाती है, तो मेस का कुल दैनिक खर्च ₹30 बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र औसत दैनिक खर्च ₹2 कम हो जाता है। मेस का मूल कुल दैनिक खर्च ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹1,170
- (b) ₹1,710
- (c) ₹1,200
- (d) ₹1,250

Q.43

There were 46 students in a boys hostel. Due to the admission of eight new students the expenses of the hostel mess were increased by Rs. 42 per day while the average expenditure per head diminished by Rs 1. What was the original expenditure of the hostel mess ?

एक बालक हॉस्टल में 46 छात्र थे। 8 नए छात्रों के प्रवेश के कारण हॉस्टल मेस का खर्च ₹42 प्रतिदिन बढ़ गया, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च ₹1 कम हो गया। मेस का मूल खर्च क्या था?

- (a) Rs. 572
- (b) Rs. 544
- (c) Rs. 552
- (d) Rs. 652

Q.44

There are 35 students in a hostel. If the number of students increases by 7, then the expenses of the mess increased by Rs. 42 per day while the average expenditure per head diminishes by Re. 1. Find the original expenditure of the mess ?

एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं। यदि छात्रों की संख्या 7 बढ़ जाती है, तो मेस का खर्च ₹42 प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च ₹1 कम हो जाता है। मेस का मूल खर्च ज्ञात कीजिए।

- (a) 360
- (b) 350
- (c) 420
- (d) 200

Q.45

A librarian purchased 72 story books for his library. Later he found that by spending ₹432 more, he could get 6 extra books, and the overall average price per book would decrease by ₹1. Find the previous average price per book ?

एक पुस्तकालयाध्यक्ष ने अपनी लाइब्रेरी के लिए 72 कहानी की पुस्तकें खरीदीं। बाद में उसे पता चला कि ₹432 अधिक खर्च करने पर वह 6 पुस्तकें और खरीद सकता था और इस स्थिति में प्रति पुस्तक औसत मूल्य ₹1 कम हो जाता। पहले प्रति पुस्तक औसत मूल्य क्या था?

- (a) ₹85
- (b) ₹98
- (c) ₹99
- (d) ₹100

Q.46

Ten men went to a hotel. Nine of them spent Rs. 50 each on their meals, and the tenth spent Rs. 9 more than the average of all of them. How much did the tenth man spend ?

10 व्यक्ति एक होटल में गए। उनमें से 9 ने अपने भोजन पर ₹50-₹50 खर्च किए और दसवें व्यक्ति ने सभी का औसत खर्च से ₹9 अधिक खर्च किया। दसवें व्यक्ति ने कितना खर्च किया?

- (a) Rs. 59
- (b) Rs. 62
- (c) Rs. 90
- (d) Rs. 60

Q.47

Out of 10 persons, 9 persons spent ₹15 each on their breakfast. The tenth person spent ₹9 more than the average expenditure of all of them. The total amount spent by all of them is ?

10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर ₹15-₹15 खर्च किए। दसवें व्यक्ति ने सभी के औसत खर्च से ₹9 अधिक खर्च किया। सभी व्यक्तियों का कुल खर्च कितना है?

- (a) ₹144
- (b) ₹135
- (c) ₹10
- (d) ₹160

Q.48

Ram, Shyam, Rohan, Reeta and Mukesh are five members of a family who are weighed consecutively and their average weight is calculated after each member is weighed. If the average weight increases by 3 kg each time, how much heavier is Mukesh than Ram ?

राम, श्याम, रोहन, रीता और मुकेश परिवार के 5 सदस्य हैं। इनका वजन एक-एक करके लिया जाता है और हर बार नया औसत निकाला जाता है। यदि हर बार औसत वजन 3 kg बढ़ता है, तो मुकेश, राम से कितना भारी है?

- (a) 24 kg
- (b) 28 kg
- (c) 26 kg
- (d) 22 kg

Q.49

If the average height of 5 section for class with 20, 30, 50, 30 and 20 students are 102.5, 107.5, 112.5, 117.5 and 122.5, Find the average height of the students ?

यदि 5 वर्गों/सेक्शनों में क्रमशः 20, 30, 50, 30 और 20 छात्र हैं तथा उनकी औसत ऊँचाई क्रमशः 102.5, 107.5, 112.5, 117.5 और 122.5 है, तो सभी छात्रों की औसत ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 112.5
- (b) 113
- (c) 113.5
- (d) 111.5

Q.50

if the Average marks of the three batches of 50, 75 and 45 students are 40, 58 and 64 respectively, find the average marks of all the students (apprx) ?

यदि 50, 75 और 45 छात्रों के तीन बैचों के औसत अंक क्रमशः 40, 58 और 64 हैं, तो सभी छात्रों के औसत अंक (लगभग) ज्ञात कीजिए।

- (a) 54.2
- (b) 55.8
- (c) 54
- (d) 54.5

Q.51

The average of 8 numbers 127, 432, p, 89, q, 99, 842 and 76 is 221 and the numbers p and q are two-digit numbers. If the units digit of p is one less than that of q and tens digit of q is one less than that of p, then the sum of the digits of p is ?

8 संख्याओं 127, 432, p, 89, q, 99, 842 और 76 का औसत 221 है तथा p और q दो-अंकीय संख्याएँ हैं। यदि p के इकाई अंक, q के इकाई अंक से 1 कम हैं और q का दहाई अंक, p के दहाई अंक से 1 कम है, तो p के अंकों का योग क्या होगा?

- (a) 13
- (b) 14
- (c) 12
- (d) 11

Q.52

In an examination, the average score of a student was 71.9. If the student would have got 28 more marks in English, 22 more marks in Mathematics, 16 more marks in Computer Science, 14 more marks in History, 10 less marks in Hindi, and retained the same marks in other subjects, then the average score would have been 80.65. How many subjects were there in the examination ?

एक परीक्षा में एक छात्र के औसत अंक 71.9 थे। यदि उसे English में 28 अधिक, Mathematics में 22 अधिक, Computer Science में 16 अधिक, History में 14 अधिक, Hindi में 10 कम अंक मिलते और बाकी विषयों में समान अंक रहते, तो उसका औसत 80.65 हो जाता। परीक्षा में कुल कितने विषय थे?

- (a) 7
- (b) 9
- (c) 8
- (d) 6

Q.53

The average age of 25 persons is 40 years. 5 new persons with an average age of 30 years joined them. The average age of all the persons is ?

25 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है। 30 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति उनसे जुड़ते हैं। अब सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी?

- (a) $38\frac{2}{3}$ years
- (b) $38\frac{1}{3}$ years
- (c) $38\frac{2}{5}$ years
- (d) $38\frac{3}{4}$ years

Q.54

Average weight of luggage of 45 passengers in the flight is 12 kg and 15 new passengers with average weight of their luggage 18 kg boarded the flight, then by what amount the average weight of the luggage is increased in the flight ?

एक उड़ान में 45 यात्रियों के सामान का औसत वजन 12 kg है। यदि 15 नए यात्री, जिनके सामान का औसत वजन 18 kg है, विमान में चढ़ते हैं, तो सामान के औसत वजन में कितनी वृद्धि होगी?

- (a) 1.5 kg
- (b) 2.5 kg
- (c) 1 kg
- (d) 2 kg

Q.55

The average of runs of a cricket player of 10 innings was 32. How many runs must he make in his next inning so as to increase his average of runs by 4 ?

एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 innings का औसत स्कोर 32 है। अपने अगले innings में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए?

- (a) 76
- (b) 70
- (c) 4
- (d) 2

Q.56

A cricketer whose bowling average is 24.85 runs per wicket, takes 5 wickets for 52 runs and thereby decreases his average by 0.85. The number of wickets taken by him till the last match was ?

एक क्रिकेटर की गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। वह एक मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लेता है और इससे उसकी औसत 0.85 कम हो जाती है। अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे?

- (a) 64
- (b) 72
- (c) 80
- (d) 96

Q.57

The bowling average of a cricketer was 12.4. He improves his bowling average by 0.2 points when he takes 5 wickets for 26 runs in his last match. The number of wickets taken by him before the last match was

एक क्रिकेटर की गेंदबाजी औसत 12.4 थी। अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेने पर उसकी औसत 0.2 से बेहतर हो जाती है। अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे?

- (a) 125
- (b) 150
- (c) 175
- (d) 200

Q.58

A cricketer had a certain average of runs for his 64 innings. In his 65th innings, he is bowled out for no score on his part. This brings down his average by 2 runs. His new average of runs is ?

एक क्रिकेटर का 64 innings तक का औसत कुछ था। 65वें innings में वह बिना रन बनाए आउट हो जाता है। इससे उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। उसका नया औसत क्या है?

- (a) 130
- (b) 128
- (c) 70
- (d) 68

Q.59

A cricket batsman had a certain average of runs for his 11 innings. In the 12th innings, he made a score of 90 runs and thereby his average of runs was decreased by 5. His average of runs after 12th innings is ?

एक क्रिकेट बल्लेबाज का 11 innings तक का औसत कुछ था। 12वें innings में उसने 90 रन बनाए और इससे उसका औसत 5 रन घट गया। 12वें innings के बाद उसका औसत क्या है?

- (a) 155
- (b) 150
- (c) 145
- (d) 140

Q.60

After 12 innings, the average score per innings of a batsman was 55. After 14 innings his average score increased to 60. If the batsman had scored 20 runs more in the 14th innings than the previous innings, then how many runs did he score in the 13th innings ?

12 innings के बाद एक बल्लेबाज का औसत स्कोर 55 था। 14 innings के बाद उसका औसत बढ़कर 60 हो गया। यदि 14वें innings में उसने 13वें innings से 20 रन अधिक बनाए, तो 13वें innings में उसने कितने रन बनाए?

- (a) 90
- (b) 85
- (c) 80
- (d) 75

Q.61

The batting average for 40 innings of a cricket player is 50 runs. His highest score exceeds his lowest score by 172 runs. If these two innings are excluded, the average of the remaining 38 innings is 48 runs. The highest score of the player is ?

एक क्रिकेट खिलाड़ी का 40 innings का बल्लेबाजी औसत 50 रन है। उसका सर्वोच्च स्कोर, न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि ये दोनों innings हटा दिए जाएँ, तो शेष 38 innings का औसत 48 रन है। खिलाड़ी का सर्वोच्च स्कोर क्या है?

- (a) 165 runs
- (b) 170 runs
- (c) 172 runs
- (d) 174 runs

Q.62

The batting average for 30 inings of a cricket player is 40 runs. His highest score exceeds his lowest score by 100 runs. If these two innings are not included, the average of the remaining 28 innings is 38 runs. The lowest score of the player is ?

एक क्रिकेट खिलाड़ी का 30 innings का बल्लेबाजी औसत 40 रन है। उसका सर्वोच्च स्कोर, न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। यदि ये दोनों innings हटा दिए जाएँ, तो शेष 28 innings का औसत 38 रन है। खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है?

- (a) 15
- (b) 18
- (c) 20
- (d) 12

Q.63

The batting average of a cricket player for 64 innings is 62 runs. His highest score exceeds his lowest score by 180 runs. Excluding these two innings, the average of remaining innings becomes 60 runs. His highest score was ?

एक क्रिकेट खिलाड़ी का 64 innings का बल्लेबाजी औसत 62 रन है। उसका सर्वोच्च स्कोर, न्यूनतम स्कोर से 180 रन अधिक है। इन दोनों innings को छोड़ने पर शेष innings का औसत 60 रन हो जाता है। उसका सर्वोच्च स्कोर क्या था?

- (a) 180 runs
- (b) 209 runs
- (c) 212 runs
- (d) 214 runs

Q.64

In a 20 over match, the required run rate to win is 7.2. If the run rate is 6 at the end of the 15th over, the required run rate to win the match is ?

एक 20 ओवर के मैच में जीतने के लिए आवश्यक रन रेट 7.2 है। यदि 15वें ओवर के अंत तक रन रेट 6 है, तो मैच जीतने के लिए अब आवश्यक रन रेट क्या होगा?

- (a) 1.2
- (b) 13.2
- (c) 10.8
- (d) 12

Q.65

In the first 5 overs of a T-20 international cricket match, the run rate was only 5.6. What should be the run rate (approximately) in the remaining 15 overs to reach a target of 185 runs ?

एक T-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के पहले 5 ओवरों में रन रेट केवल 5.6 था। 185 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 15 ओवरों में लगभग कितना रन रेट चाहिए?

- (a) 10.46
- (b) 10.25
- (c) 9.55
- (d) 11.15

Q.66

A batsman's average score for a certain number of innings is 66. If he scores 144 runs in the next innings, his average becomes 72. How many innings did he play earlier ?

एक बल्लेबाज का कुछ innings तक का औसत 66 है। यदि अगले innings में वह 144 रन बनाता है, तो उसका औसत 72 हो जाता है। उसने पहले कितने innings खेले थे?

- (a) 11
- (b) 12
- (c) 23
- (d) 14

Q.67

The average number of runs scored by a cricketer in 42 innings is 30. The difference between his maximum and minimum scores in an inning is 100. If these two innings are not taken into consideration, then the average score of the remaining 40 innings is 28. What are the maximum runs scored by him in an inning ?

एक क्रिकेटर का 42 innings का औसत स्कोर 30 रन है। उसके अधिकतम और न्यूनतम स्कोर का अंतर 100 रन है। यदि इन दोनों innings को छोड़ दिया जाए, तो शेष 40 innings का औसत 28 रन हो जाता है। उसका अधिकतम स्कोर क्या था?

- (a) 120
- (b) 105
- (c) 115
- (d) 110

Q.68

The average weight of students of section A and B having 40 students each is 45.5 kg and 44.2 kg respectively. Two students of section A having average weight 48.75 kg were shifted to section B and two students of section B were shifted to section A, making the average weight of both the sections equal. What is the average weight (in kg) of the students who were shifted from section B to section A ?

सेक्शन A और B में प्रत्येक में 40-40 छात्र हैं। उनके औसत वजन क्रमशः 45.5 kg और 44.2 kg हैं। सेक्शन A के 2 छात्र, जिनका औसत वजन 48.75 kg है, सेक्शन B में भेजे गए और सेक्शन B के 2 छात्र सेक्शन A में भेजे गए। इसके बाद दोनों सेक्शनों का औसत वजन समान हो गया। सेक्शन B से A में भेजे गए छात्रों का औसत वजन (kg में) क्या है?

- (a) 35.75
- (b) 34.25
- (c) 34.5
- (d) 35

Q.69

The average weight of students of section A and B having 40 students each is 42.5 kg and 40.5 kg respectively. Two students of section A having average weight 47.5 kg were shifted to section B and two students of section B were shifted to section A, making the average weight of both the sections equal. What is the average weight (in kg) of the students who were shifted from section B to section A ?

सेक्शन A और B में प्रत्येक में 40-40 छात्र हैं। उनके औसत वजन क्रमशः 42.5 kg और 40.5 kg हैं। सेक्शन A के 2 छात्र, जिनका औसत वजन 47.5 kg है, सेक्शन B में भेजे गए और सेक्शन B के 2 छात्र सेक्शन A में भेजे गए। इसके बाद दोनों सेक्शनों का औसत वजन समान हो गया। सेक्शन B से A में भेजे गए छात्रों का औसत वजन (kg में) क्या है?

- (a) 27.5
- (b) 28
- (c) 28.5
- (d) 29

Q.70

The average weight of 30 students in a class is 45 kg. A student whose weight is 48.5 kg is replaced by another student and the average weight increase by 200 gm. Find the weight of the new student ?

एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 45 kg है। 48.5 kg वजन वाला एक छात्र किसी दूसरे छात्र से बदल दिया जाता है और औसत वजन 200 gm बढ़ जाता है। नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए।

- (a) 50kg
- (b) 51kg
- (c) 54.5 kg
- (d) 55kg

Q.71

The average weight of a group of eight people increased by 2.5 kg when a person weighting 80 kg joined in place of one of the members of the group. The weight of the member replaced was ?

8 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 2.5 kg बढ़ गया जब 80 kg वजन वाला एक व्यक्ति समूह के एक सदस्य की जगह शामिल हुआ। जिस सदस्य को बदला गया उसका वजन कितना था?

- (a) 60 kg
- (b) 77.5 kg
- (c) 70 kg
- (d) 62.5 kg

Q.72

The average weight of a group of 12 girls is 48 kg. If 2 girls R and S replace P and Q, the new average weight becomes 46 kg. The weight of P = the weight of Q. The weight of R = the weight of S. Another girl T, is included in the group and the new average weight becomes 46 kg. The weight of T = the weight of R. What is the weight of P (in kg) ?

12 लड़कियों के एक समूह का औसत वजन 48 kg है। यदि 2 लड़कियाँ R और S, P और Q की जगह लेती हैं, तो नया औसत 46 kg हो जाता है। P का वजन = Q का वजन तथा R का वजन = S का वजन है। एक और लड़की T समूह में शामिल की जाती है और नया औसत फिर 46 kg हो जाता है। T का वजन = R का वजन है। P का वजन (kg में) क्या है?

- (a) 56
- (b) 58
- (c) 54
- (d) 50

Q.73

There are 3 groups of persons – male, female and children. There are 20 males and the number of females and children taken together is 4 more than that of the males. The average weight of males is 54 kg, that of females is 49 kg and that of children is 30 kg. If the average weight of the whole group is 48.25 kg, then what is the difference between the number of females and the number of children ?

तीन समूह हैं: पुरुष, महिलाएँ और बच्चे। पुरुषों की संख्या 20 है और महिलाओं तथा बच्चों की कुल संख्या, पुरुषों की संख्या से 4 अधिक है। पुरुषों का औसत वजन 54 kg, महिलाओं का 49 kg और बच्चों का 30 kg है। यदि पूरे समूह का औसत वजन 48.25 kg है, तो महिलाओं और बच्चों की संख्या का अंतर क्या है?

- (a) 17
- (b) 10
- (c) 7
- (d) 14

Q.74

The average weight of 30 persons of group A is 3 kg more than the average weight of 25 persons of group B. The average weight of 25 persons of group B is 2.5 kg more than the average weight of 20 persons of group C. If the total weight of 30 persons of group A is 1725 kg, then what will be the average weight of the persons of group A and group C taken together (in kg) ?

समूह A के 30 व्यक्तियों का औसत वजन, समूह B के 25 व्यक्तियों के औसत वजन से 3 kg अधिक है। समूह B के 25 व्यक्तियों का औसत वजन, समूह C के 20 व्यक्तियों के औसत वजन से 2.5 kg अधिक है। यदि समूह A के 30 व्यक्तियों का कुल वजन 1725 kg है, तो समूह A और समूह C के व्यक्तियों को मिलाकर औसत वजन (kg में) क्या होगा?

- (a) 55.1
- (b) 55
- (c) 55.3
- (d) 55.4

Q.75

The average weight of 3 men A, B and C is 84 Kg. Another man D joins the group and the average now becomes 80 Kg. If another man E whose weight is 3 Kg more than that of D, replaces A then the average weight of B, C, D and E becomes 79 Kg. What is the weight of A ?

3 व्यक्तियों A, B और C का औसत वजन 84 kg है। एक और व्यक्ति D समूह में शामिल होता है और नया औसत 80 kg हो जाता है। यदि E नामक एक अन्य व्यक्ति, जिसका वजन D से 3 kg अधिक है, A की जगह लेता है, तो B, C, D और E का औसत वजन 79 kg हो जाता है। A का वजन क्या है?

- (a) 70 Kg
- (b) 75 Kg
- (c) 72 Kg
- (d) 80 Kg

Q.76

Average weight of 3 men A, B & C is 80 kg. Another man D join the group and the average becomes 75 kg. If another man E, whose weight 2 kg more than of D, replaces A then the average weight of B, C, D and E becomes 77 kg. The weight of A is what ?

3 व्यक्तियों A, B और C का औसत वजन 80 kg है। एक और व्यक्ति D समूह में शामिल होता है और औसत 75 kg हो जाता है। यदि E नामक एक अन्य व्यक्ति, जिसका वजन D से 2 kg अधिक है, A की जगह लेता है, तो B, C, D और E का औसत वजन 77 kg हो जाता है। A का वजन क्या है?

- (a) 54 kg
- (b) 75 kg
- (c) 70kg
- (d) 60 kg

Q.77

The average weight of a group of 3 people A, B and C is 70 kg. When D joins this group, the average becomes 60 kg, One man E, whose weight is 5 kg more than that of D, replaces A and the average weight of B, C, D, and E now becomes 59 kg. A's weight (in kg) is ?

3 व्यक्तियों A, B और C का औसत वजन 70 kg है। जब D समूह में शामिल होता है, तो औसत 60 kg हो जाता है। फिर E नामक एक व्यक्ति, जिसका वजन D से 5 kg अधिक है, A की जगह लेता है और B, C, D तथा E का औसत 59 kg हो जाता है। A का वजन (kg में) क्या है?

- (a) 40
- (b) 50
- (c) 59
- (d) 39

Q.78

The average of five numbers is 40. If one number is excluded, the average becomes 39. What is the excluded number ?

5 संख्याओं का औसत 40 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, तो औसत 39 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है?

- (a) 46
- (b) 44
- (c) 41
- (d) 40

Q.79

The average score of 40 students of section A is 92. Two students of the class having average score 95, moved to another section and 2 new students replaced them. Now the average score of section A is 90. What is the average score of the students who joined section A ?

सेक्शन A के 40 छात्रों का औसत अंक 92 है। 95 औसत अंक वाले 2 छात्र किसी दूसरे सेक्शन में चले गए और उनकी जगह 2 नए छात्र आए। अब सेक्शन A का औसत अंक 90 हो गया। सेक्शन A में शामिल हुए नए छात्रों का औसत अंक क्या है?

- (a) 89
- (b) 86
- (c) 91
- (d) 55

Average

Class : 3

“The best way to predict the future is to create it.

Q.79

The average score of 40 students of section A is 92. Two students of the class having average score 95, moved to another section and 2 new students replaced them. Now the average score of section A is 90. What is the average score of the students who joined section A ?

सेक्शन A के 40 छात्रों का औसत अंक 92 है। 95 औसत अंक वाले 2 छात्र किसी दूसरे सेक्शन में चले गए और उनकी जगह 2 नए छात्र आए। अब सेक्शन A का औसत अंक 90 हो गया। सेक्शन A में शामिल हुए नए छात्रों का औसत अंक क्या है?

- (a) 89
- (b) 86
- (c) 91
- (d) 55

Q.80

The average of marks of 17 students in an examination was calculated as 71. But it was later found that the mark of one student had been wrongly entered as 65 instead of 56 and another as 24 instead of 50. The correct average is ?

एक परीक्षा में 17 छात्रों के अंकों का औसत 71 निकाला गया। बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक 56 की जगह 65 लिख दिए गए थे और दूसरे के 50 की जगह 24 लिख दिए गए थे। सही औसत क्या होगा?

- (a) 70
- (b) 71
- (c) 72
- (d) 73

Q.81

The average of 20 numbers is calculated as 35. It is discovered later on that while calculating the average, one number, namely 85, was misread as 45. The correct average is ?

20 संख्याओं का औसत 35 निकाला गया। बाद में पता चला कि औसत निकालते समय 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया था। सही औसत क्या होगा?

- (a) 36
- (b) 36.5
- (c) 37
- (d) 37.5

Q.82

The average of a collection of 20 measurements was calculated to be 56 cm. But later it was found that a mistake had occurred in one of the measurements which was recorded as 64 cm., but should have been 61 cm. The correct average must be ?

20 मापों के एक समूह का औसत 56 cm निकाला गया। बाद में पता चला कि एक माप 64 cm दर्ज हो गया था जबकि वह 61 cm होना चाहिए था। सही औसत क्या होगा?

- (a) 53 cm
- (b) 54.5 cm
- (c) 55.85 cm
- (d) 56.15 cm

Q.83

There are three natural numbers. If the average of any two is added to the third the number, are 194, 188, and 202 obtained. What is the average of the given numbers ?

तीन प्राकृतिक संख्याएँ हैं। यदि किसी भी दो का औसत तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो क्रमशः 194, 188 और 202 प्राप्त होते हैं। दी गई संख्याओं का औसत क्या है?

- (a) $97\frac{1}{3}$
- (b) 86
- (c) 87
- (d) 88

Q.84

There are four natural numbers. The average of any three numbers is added in the fourth number and in this way, the numbers 30, 28, 26 and 24 are obtained. One of the numbers is ?

चार प्राकृतिक संख्याएँ हैं। किसी भी तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या में जोड़ने पर क्रमशः 30, 28, 26 और 24 प्राप्त होते हैं। उन मूल संख्याओं में से एक संख्या क्या है?

- (a) 11
- (b) 15
- (c) 17
- (d) 13

Q.85

The average age of 14 girls and their teacher's age is 15 years. If the teacher's age is excluded, the average reduces by 1. What is the teacher's age ?

14 लड़कियों और उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापिका की आयु हटा दी जाए, तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। अध्यापिका की आयु क्या है?

- (a) 35 years
- (b) 32 years
- (c) 30 years
- (d) 29 years

Q.86

The present average age of a family of four members is 36 years. If the present age of the youngest member of the family be 12 years, the average age of the family at the birth of the youngest member was ?

एक परिवार के 4 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, तो उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी?

- (a) 48 years
- (b) 32 years
- (c) 40 years
- (d) 24 years

Q87

The average age of a father and his two sons is 27 years, five years ago the average age of two sons was 12 years. The present age of the father is?

एक पिता और उसके दो बेटों की औसत आयु 27 साल है। पांच साल पहले दोबेटों की औसत आयु 12 साल थी। पिता की वर्तमान आयु क्या है?

Q 88

Average age of mother, father and son was 42 at the time of son's marriage. After one year, an infant was born and after 6 years of marriage the average age of family becomes 36. Find the age of bride at the time of marriage.

बेटे की शादी के समय माता, पिता और पुत्र की औसत आयु 42 साल थी। एक वर्ष के बाद, एक शिशु का जन्म हुआ और शादी के 6 साल के बाद, परिवार की औसत आयु 36 साल हो जाती है। शादी के समय दुल्हन की उम्र का पता लगाएं।

- A) 26 years
- B) 25 years
- C) 24 years
- D) 23 years

Q 89

The average age of 7 members of a family is 35 years. If the youngest members are twins and they are 15 years old, then what was the average age (in years) of the family members at the time of the birth of the twins?

एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य जुड़वां हैं और वे 15 वर्ष के हैं, तो जुड़वा बच्चों के जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु (वर्षों में) क्या थी?

- | | |
|-------|-------|
| A. 25 | B. 27 |
| C. 28 | D. 30 |

Q.90

Consider ten consecutive odd numbers starting from 5. Multiply each of them, except the first and the second, with three. What will be the average of the ten numbers so formed ?

5 से शुरू होने वाली 10 क्रमागत विषम संख्याएँ लें। पहली और दूसरी संख्या को छोड़कर शेष प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाता है। इस प्रकार बनी 10 संख्याओं का औसत क्या होगा?

- (a) 39.6
- (b) 39
- (c) 42
- (d) 38.4

Q.91

The average of three-digit numbers 421, 418, x 32, $5x$ 1 and $28x$ is 508, then find the average of x , $x - 2$, $x + 3$ and $x + 5$?

तीन अंकों की संख्याएँ 421, 418, x 32, $5x$ 1 और $28x$ का औसत 508 है। x , $x-2$, $x+3$ और $x+5$ का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 9.5
- (b) 8
- (c) 7
- (d) 9

Q.92

The average are 3-digit numbers such that $xx0$, $27x$, $x22$, $xx4$, $7x7$, $2x1$ is 428. Find average of $x+2$, $x+4$, $x+5$?

तीन अंकों की संख्याएँ $xx0$, $27x$, $x22$, $xx4$, $7x7$, $2x1$ का औसत 428 है। $x+2$, $x+4$ और $x+5$ का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) $22/3$
- (b) $23/3$
- (c) 8
- (d) 7

Q93(1). In a class with a certain number of students, if one student weighing 30 kg is added, then the average weight of the class increases by 1 kg. If one more student weighing 30 kg is added, then the average weight of the class increases by 1.5 kg over the original average. What is the original average weight (in kg) of the class ?

एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, अगर 30 kg वज़न वाला एक स्टूडेंट और जुड़ जाता है, तो क्लास का एवरेज वज़न 1 kg बढ़ जाता है। अगर 30 kg वज़न वाला एक और स्टूडेंट जुड़ जाता है, तो क्लास का एवरेज वज़न ओरिजिनल एवरेज से 1.5 kg बढ़ जाता है। क्लास का ओरिजिनल एवरेज वज़न (kg में) क्या है?

- (a) 27
- (b) 25.5
- (c) 26.5
- (d) 24

Q93(2). In a class with a certain number of students if a teacher weighing 78 kg is added, then the average weight of class is increased by 2 kg. If one more teacher weighing 66 kg is added, then the average weight of the class increases by 3.5 kg over the original average. What is the original average weight (in kg) of the class ?

एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, अगर 78 kg वज़न वाले एक टीचर को जोड़ा जाए, तो क्लास का एवरेज वज़न 2 kg बढ़ जाता है। अगर 66 kg वज़न वाले एक और टीचर को जोड़ा जाए, तो क्लास का एवरेज वज़न ओरिजिनल एवरेज से 3.5 kg बढ़ जाता है। क्लास का ओरिजिनल एवरेज वज़न (kg में) क्या है ?

- (a) 25 kg
- (b) 22 kg
- (c) 16 kg
- (d) 18 kg

Q93(3). In a class with a certain number of students if a teacher weighing 76 kg is added, then average weight of class is increased by 2 kg. If one more teacher weighing 50 kg is added, then the average weight of the class increases by 3 kg over the original average. What is the original average weight (in kg) of the class ?

एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, अगर 76 kg वज़न वाले एक टीचर को जोड़ा जाए, तो क्लास का एवरेज वज़न 2 kg बढ़ जाता है। अगर 50 kg वज़न वाले एक और टीचर को जोड़ा जाए, तो क्लास का एवरेज वज़न ओरिजिनल एवरेज से 3 kg बढ़ जाता है। क्लास का ओरिजिनल एवरेज वज़न (kg में) क्या है ?

- (a) 18 kg
- (b) 20 kg
- (c) 22 kg
- (d) 16 kg

Q.94

The numbers 2, 3, 4 and 5 occur $(2+5k)$, $(5k-7)$, $(2k-3)$ and $(k+2)$ times, respectively. The average of the number is 2.85. Later on, the number 2 was replaced by 6 in all the places. What is the average of the new numbers?

संख्या 2, 3, 4 और 5 क्रमशः $(2+5k)$, $(5k-7)$, $(2k-3)$ और $(k+2)$ बार आती हैं। इन संख्याओं का औसत 2.85 है। बाद में जहाँ-जहाँ 2 था, वहाँ 6 रख दिया गया। नई संख्याओं का औसत क्या होगा?

- (a) 2.4
- (b) 5.25
- (c) 3.85
- (d) 4.75

Q.95

The numbers 24, 45, a, 35, 59, 83, 46, b, 29, 74 are serially numbered as they appear in the sequence. When each number is added to its serial number, then the average of the new numbers formed is 55. The average of the missing numbers (a and b) is ?

संख्याएँ 24, 45, a, 35, 59, 83, 46, b, 29, 74 क्रम में लिखी गई हैं और इन्हें क्रम संख्या दी गई है। जब प्रत्येक संख्या में उसकी क्रम संख्या जोड़ दी जाती है, तो बनी नई संख्याओं का औसत 55 हो जाता है। लुप्त संख्याओं a और b का औसत क्या है?

- (a) 38
- (b) 58
- (c) 62
- (d) 50

Q.96

x , y and z are three positive numbers such that y is $\frac{4}{5}$ times of x and z is $\frac{5}{8}$ times of y . If the average of reciprocals of the numbers x , y and z is $\frac{17}{240}$, then the average of 3 times of x and 5 times of y will be ?

x , y और z तीन धनात्मक संख्याएँ हैं, जहाँ $y = x$ का $\frac{4}{5}$ भाग है और $z = y$ का $\frac{5}{8}$ भाग है। यदि x , y और z के व्युत्क्रमों का औसत $\frac{17}{240}$ है, तो $3x$ और $5y$ का औसत क्या होगा?

- (a) 60
- (b) 70
- (c) 45
- (d) 40

Q.97

A , B and C are three positive numbers such that the average of three-fifths of A and 30% of B is 13.5, and the average of $\frac{3}{8}$ times of B and 25% of C is 15. If A is equal to $\frac{5}{12}$ times of C , then the sum of all three numbers A , B and C is ?

A , B और C तीन धनात्मक संख्याएँ हैं। A के $\frac{3}{5}$ भाग और B के 30% का औसत 13.5 है तथा B के $\frac{3}{8}$ भाग और C के 25% का औसत 15 है। यदि $A = C$ का $\frac{5}{12}$ भाग हो, तो A , B और C का योग क्या होगा?

- (a) 135
- (b) 145
- (c) 120
- (d) 125

Q.98

Average of the numbers a , b , c and d is $2d+4$. Also, the average of the numbers a and b , b and c , c and d are 8, 5 and 4 respectively. If $e=a+d+1$, then what is the average of the numbers d and e ?

a , b , c और d का औसत $2d+4$ है। साथ ही, a और b का औसत 8, b और c का औसत 5 तथा c और d का औसत 4 है। यदि $e = a + d + 1$ हो, तो d और e का औसत क्या होगा?

- (a) 3
- (b) 8.5
- (c) 8
- (d) 7

Q.99

The average of x occurring 5 times and y occurring 7 times is 37. Also, the average of x occurring 7 times and y occurring 5 times is 35. The value of y is ?

x पाँच बार और y सात बार आने पर औसत 37 है। साथ ही, x सात बार और y पाँच बार आने पर औसत 35 है। y का मान क्या है?

- (a) 45
- (b) 30
- (c) 42
- (d) 27

Q.100

A is the average of 10 given numbers. B is the average after 2 of the numbers were replaced by 3 other different numbers. The average of the removed numbers is 48 and the average of the newly included numbers is 56. If $A + B = 438$, then the value of $A - B$ is ?

A, 10 दी गई संख्याओं का औसत है। 2 संख्याओं को हटाकर उनकी जगह 3 नई संख्याएँ रखी जाती हैं और नया औसत B हो जाता है। हटाई गई 2 संख्याओं का औसत 48 है और नई 3 संख्याओं का औसत 56 है। यदि $A + B = 438$ हो, तो $A - B$ का मान क्या है?

- (a) 21
- (b) 14
- (c) 12
- (d) 26

Q.101

The average of 7 consecutive odd numbers is A. If next 3 and previous 2 odd numbers to these 7 odd numbers are also included, then what is the new average of these 12 consecutive odd numbers ?

7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत A है। यदि इन 7 संख्याओं के बाद की अगली 3 और पहले की पिछली 2 विषम संख्याएँ भी शामिल कर ली जाएँ, तो कुल 12 क्रमागत विषम संख्याओं का नया औसत क्या होगा?

- (a) $A + 1$
- (b) $A + 2$
- (c) $A - 2$
- (d) $A + 3$

Q.102

Pranjal's average earning per month in the first three months of a year was ₹28744. In April, his earning was 50% more than the average earning in the first three months. If his average earning per month for the whole year is ₹94411, then what will be Pranjal's average earning (in ₹) per month from May to December ?

वर्ष के पहले 3 महीनों में Pranjal की औसत मासिक आय ₹28744 थी। अप्रैल में उसकी आय, पहले 3 महीनों की औसत आय से 50% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष की औसत मासिक आय ₹94411 है, तो मई से दिसंबर तक उसकी औसत मासिक आय (₹ में) क्या होगी?

- (a) 125453
- (b) 125448
- (c) 125446
- (d) 125447

Q.103

Manav's average earning per month in the first three months of a year was ₹7520. In April, his earning was 75% more than the average earning in the first three months. If his average earning per month for the whole year is ₹62334, then what will be Manav's average earning (in ₹) per month from May to December ?

वर्ष के पहले 3 महीनों में Manav की औसत मासिक आय ₹7520 थी। अप्रैल में उसकी आय, पहले 3 महीनों की औसत आय से 75% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष की औसत मासिक आय ₹62334 है, तो मई से दिसंबर तक उसकी औसत मासिक आय (₹ में) क्या होगी?

- (a) 89034
- (b) 89031
- (c) 89036
- (d) 89039

Q.104

Lalit's average earning per month in the first three months of a year was ₹4184. In April, his earning was 50% more than the average earning in the first three months. If his average earning per month for the whole year is ₹17553, then what will be Lalit's average earning (in ₹) per month from May to December ?

वर्ष के पहले 3 महीनों में Lalit की औसत मासिक आय ₹4184 थी। अप्रैल में उसकी आय, पहले 3 महीनों की औसत आय से 50% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष की औसत मासिक आय ₹17553 है, तो मई से दिसंबर तक उसकी औसत मासिक आय (₹ में) क्या होगी?

- (a) 23973
- (b) 23979
- (c) 23976
- (d) 23978

Q.105

A set of consecutive positive integers beginning with 1 is written on the blackboard. A student came and erased one number. The average of the remaining numbers is $35 \frac{7}{17}$. what was the erased number ?

1 से शुरू होने वाली क्रमागत धनात्मक पूर्ण संख्याएँ ब्लैकबोर्ड पर लिखी हैं। एक छात्र आकर उनमें से एक संख्या मिटा देता है। शेष संख्याओं का औसत $35 \frac{7}{17}$ है। मिटाई गई संख्या क्या थी?

- (a) 7
- (b) 5
- (c) 8
- (d) 10

Q.106

A book contains pages starting from Page number 1. A page is torn, the sum of remaining page numbers is 195, find the page number which tear away ?

एक पुस्तक में पृष्ठ संख्या 1 से शुरू होती है। एक पृष्ठ फट गया और शेष पृष्ठ संख्याओं का योग 195 है। फटे हुए पृष्ठ की पृष्ठ संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 5,6
- (b) 7,8
- (c) 9,10
- (d) 11,12

Q107.

The average temperature in the month of September is 22.5°C . The average temperature for the first 12 days is 21.3°C and for the last 15 days is 23.8°C . What is the average temperature (in $^{\circ}\text{C}$) for the remaining days of the month ?

सितंबर के महीने में औसत तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस है। पहले 12 दिनों के लिए औसत तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस है और अंतिम 15 दिनों के लिए 23.8 डिग्री सेल्सियस है। महीने के शेष दिनों के लिए औसत तापमान ($^{\circ}\text{C}$ में) क्या है?

- a) 20.5
- b) 21.4
- c) 20.8
- d) 21.2

Q107.

The average sale of cars per day by a dealer in the month of April is 28. The average sale of cars on Saturdays is 30 and the average sale of cars on Fridays is 37. What is the average sale of cars on the other days of the month, if the month starts on a Tuesday ?

अप्रैल के महीने में एक डीलर द्वारा प्रति दिन कारों की औसत बिक्री 28 है। शनिवार को कारों की औसत बिक्री 30 है और शुक्रवार को कारों की औसत बिक्री 37 है। यदि महीना मंगलवार से शुरू होता है, तो महीने के अन्य दिनों में कारों की औसत बिक्री क्या है ?

- a) 25
- b) 29
- c) 27
- d) 26

Q108.

In an exhibition, in the month of December starting with Thursday, the average number of visitors on Saturdays is 254, the average number of visitors on Sundays is 625 and an average number of visitors on other days of the month is x . If the average number of visitors, per day, for the whole month is 238, then what is the value of x ?

एक प्रदर्शनी में, गुरुवार से शुरू होने वाले दिसंबर के महीने में, शनिवार को आगंतुकों की औसत संख्या 254 है, रविवार को आगंतुकों की औसत संख्या 625 है और महीने के अन्य दिनों में आगंतुकों की औसत संख्या x है। यदि पूरे महीने के लिए प्रति दिन आगंतुकों की औसत संख्या 238 है, तो x का मान क्या है?

- a) 163
- b) 166
- c) 165
- d) 164

Q109. There are 6 consecutive integers and 5 consecutive integers. The average of the 6 integers is 2 less than the average of the 5 integers. The sum of the 5 integers is 4 more than the sum of the 6 integers. Find the average of the 6 integers ?

6 लगातार पूर्णांक और 5 लगातार पूर्णांक हैं। 6 पूर्णांकों का औसत 5 पूर्णांकों के औसत से 2 कम है। 5 पूर्णांकों का योग 6 पूर्णांकों के योग से 4 ज़्यादा है। 6 पूर्णांकों का औसत पता करें?

- (a) 3
- (b) 4
- (c) 5
- (d) 6

Q110. There are 5 consecutive even numbers X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 and 4 consecutive odd numbers Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 . The average of the even numbers is 5 more than the average of the odd numbers. If the sum of the even numbers is 30 more than the sum of the odd numbers, find the average of the odd numbers.

5 लगातार सम संख्याएँ X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 और 4 लगातार विषम संख्याएँ Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 हैं। सम संख्याओं का औसत विषम संख्याओं के औसत से 5 ज़्यादा है। अगर सम संख्याओं का जोड़ विषम संख्याओं के जोड़ से 30 ज़्यादा है, तो विषम संख्याओं का औसत निकालें।

- (a) 3
- (b) 4
- (c) 5
- (d) 6

Thankyou