Protocolo de Bioseguridad

Quiz · Para: Intermedio (semisénior) · Fidelidad a la fuente: 100%

Higiene de manos

Pregunta 1. En el desarrollo de un módulo de validación para higiene de manos, ¿cuál es la condición necesaria para que el uso de alcohol en gel sea considerado una alternativa válida al lavado con agua y jabón?

A) Que se utilice solo después de procedimientos quirúrgicos

B) Que las manos no presenten suciedad visible

C) Que se aplique únicamente en el dorso de las manos

D) Que el procedimiento dure menos de 10 segundos

Equipo de protección personal (EPP)

Pregunta 2. Si estuvieras implementando un algoritmo para el orden de retiro (doffing) del Equipo de Protección Personal (EPP), ¿cuál sería la secuencia lógica correcta para minimizar el riesgo de contaminación?

A) Protección ocular, guantes, mascarilla y bata

B) Bata, guantes, mascarilla y protección ocular

C) Mascarilla, bata, protección ocular y guantes

D) Guantes, protección ocular, bata y finalmente mascarilla

Manejo de residuos biocontaminados

Pregunta 3. Al diseñar un sistema de inventario y disposición de residuos, ¿cómo deben clasificarse y segregarse los materiales punzocortantes como agujas y hojas de bisturí?

A) En bolsas rojas tras reencapuchar las agujas para mayor seguridad

B) En bolsas de color común si no tienen sangre visible

C) En contenedores rígidos resistentes a punción, sin reencapuchar las agujas

D) En contenedores flexibles siempre que se llenen hasta el tope

Limpieza y desinfección de superficies

Pregunta 4. Desde una perspectiva de procesos secuenciales, ¿cuál es la relación correcta entre la limpieza y la desinfección de superficies de alto contacto en un hospital?

A) La superficie debe limpiarse físicamente antes de aplicar el desinfectante

B) Ambos procesos deben ejecutarse simultáneamente para ahorrar tiempo

C) La limpieza es opcional si el desinfectante es de alta potencia

D) La desinfección debe realizarse antes de la limpieza física

Notificación de incidentes y exposiciones

Pregunta 5. En caso de un incidente de exposición a fluidos (como un pinchazo accidental), ¿cuál es el flujo de trabajo inmediato que debe seguir el personal según el protocolo?

A) Reiniciar el sistema de bioseguridad antes de atender a otro paciente

B) Realizar una limpieza profunda y no notificar si la herida es pequeña

C) Esperar a finalizar el turno para reportar el incidente

D) Notificar de inmediato al personal de salud ocupacional

Respuestas

1. B) Que las manos no presenten suciedad visible

Según el documento, el alcohol en gel es una alternativa aceptable siempre y cuando las manos no estén visiblemente sucias, debiendo mantenerse la fricción hasta que el producto se seque por completo.

2. D) Guantes, protección ocular, bata y finalmente mascarilla

El documento establece que para retirar el EPP el orden se invierte para evitar contacto con superficies contaminadas: primero guantes, luego protección ocular, bata y finalmente la mascarilla.

3. C) En contenedores rígidos resistentes a punción, sin reencapuchar las agujas

El protocolo indica que los punzocortantes deben descartarse de inmediato en contenedores rígidos resistentes a punción, prohibiendo explícitamente reencapuchar las agujas.

4. A) La superficie debe limpiarse físicamente antes de aplicar el desinfectante

El documento aclara que son procesos distintos y secuenciales: una superficie debe limpiarse antes de desinfectarse, ya que la materia orgánica puede inactivar los desinfectantes.

5. D) Notificar de inmediato al personal de salud ocupacional

Todo incidente de exposición debe notificarse de inmediato al responsable de salud ocupacional para iniciar la evaluación de riesgo dentro de las ventanas de tiempo recomendadas.