

# Notes for GRE Physics

汪巍<sup>\*</sup>

2019-11

---

<sup>\*</sup>Copyright © Wei Wang 2019. All rights reserved.

## Preface

For test takers of GRE Physics, there are few materials to prepare. I took the test on Oct. 26, 2019 in Shanghai and got a full mark 990 (95%). Therefore, I plan to organize my notes based on Jeff's version...



Wei Wang

Nov. 2019 at Tongji University

## 目录

<b>1</b>	<b>Classic Mechanics</b>	<b>1</b>
1.1	General Knowledge . . . . .	1
1.2	Mechanical Wave . . . . .	1
1.3	Analytical Mechanics . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Electrodynamics</b>	<b>3</b>
2.1	Maxwell Equations . . . . .	3
2.2	Electromagnetic Wave . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Electronics</b>	<b>6</b>
3.1	General Knowledge . . . . .	6
<b>4</b>	<b>Thermodynamics and Statistical Physics</b>	<b>7</b>
4.1	General Knowledge . . . . .	7
4.2	Carnot Cycle . . . . .	8
4.3	Electronic Density of States . . . . .	9
<b>5</b>	<b>Optics</b>	<b>10</b>
5.1	General Knowledge . . . . .	10
5.2	Interference and Diffraction . . . . .	10
5.3	Crystal Optics . . . . .	12
<b>6</b>	<b>Astrophysics and Relativity</b>	<b>13</b>
6.1	Astrophysics . . . . .	13
6.2	Relativity . . . . .	13
6.3	Cherenkov Radiation . . . . .	14
<b>7</b>	<b>Quantum Mechanics</b>	<b>15</b>
7.1	General Knowledge . . . . .	15
7.2	Stationary Schrödinger Equation . . . . .	15
7.3	Angular Momentum . . . . .	16
7.4	Other Knowledge . . . . .	17
<b>8</b>	<b>Solid State Physics</b>	<b>18</b>
8.1	General Knowledge . . . . .	18

<b>9 Particle Physics</b>	<b>19</b>
9.1 General Knowledge . . . . .	19
<b>10 Atomic Physics and Nuclear Physics</b>	<b>20</b>
10.1 Atomic Physics . . . . .	20
10.2 Nuclear Physics . . . . .	20
<b>11 Mathematics and Others</b>	<b>22</b>
11.1 Mathematics Knowledge . . . . .	22
11.2 Other Knowledge . . . . .	22

# 1 Classic Mechanics

1. 保守力:  $\nabla \times \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{F} = -\nabla U$ .

2. 抛体: Projectile.

3. 弹簧串联:  $\frac{1}{k_t} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$ ; 并联:  $k_t = k_1 + k_2$ ;

$$\lambda = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} \begin{cases} > 1 : \text{overdamped 过阻尼;} \\ = 1 : \text{critically damped 临界阻尼;} \\ < 1 : \text{underdamped 欠阻尼} \Rightarrow \text{频率: } \omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{b}{4mk}} : b \text{ 阻尼系数.} \end{cases}$$

4. 冲量: impulse.

5. 转动惯量: the moment of inertia; 支点: fulcrum; 单摆: pendulum  $\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$ .

6. centripetal: 向心的;

centrifugal: 离心.

7. 科里奥利力:  $\vec{F}_c = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}$

8. 天体:  $E = \frac{1}{2}mv^2 + V(r) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 + V(r)$ , 而  $L = mr^2\dot{\theta}$ ,

$$\text{故 } E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} + V(r) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V_{eff}$$

9. 伯努利方程:  $\frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh + P = C$ ;

不可压缩流体:  $v_i A_i = C$ ;

斯托克斯定律 (球体):  $F_{drag} = -6\pi\mu R v_s$ ,  $\mu$  为黏度系数,  $v_s$  为下落最终速度.

10. 波在弦中传播速度:  $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ ,  $T$  为弦中张力,  
 $\mu$  为弦线密度;

11. 球面波强度:  $I = \frac{P_s}{4\pi r^2} \propto \frac{1}{r^2}$ ;

声强级:  $\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$  (dB),  $I_0$  为  $10^{-12}$ ;

理想气体中声波传播速度:  $v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \propto \sqrt{T}$ ,

如图1所示.





图 1: 理想气体中声波传播速度.

12. 允许的频率数 = 系统的自由度

13. 两端开口管:  $L = n\frac{\lambda}{2}$ ;  
 一端开口管:  $L = \frac{2n+1}{4}\lambda$

harmonics:  $n = \text{Round}\left(\frac{f_2}{f_1}\right)$ ; beats =  $n \times f_1 - f_2$ .



14. 火箭运动:  $m\frac{dv}{dt} + u\frac{dm}{dt} = 0$ ,  $u$  为相对速度。

15. 分析力学:

拉格朗日函数:  $L(q, \dot{q}, t) = T - U$ .

action 作用函数:  $S = \int L dt$ .

哈密顿原理: actual path 满足  $\delta \int L dt = 0$ , 即 actual 作用函数  $S$  是极值。

拉格朗日方程:

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0, \text{ 广义动量: } p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}},$$

类似于牛顿第二定律:  $ma = \frac{dp}{dt} = F$ .

哈密顿量:  $H(q, p, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$ .

正则方程:

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}, \quad \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t},$$

其中第二个式子应用了拉格朗日方程和广义动量的定义:

$$\frac{\partial H}{\partial q} = -\frac{\partial L}{\partial q} = -\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) = -\dot{p}.$$

## 2 Electrodynamics

1. 毕奥·萨伐尔定律:  $B = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I \times \hat{r}}{r^2} dl = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{J \times \hat{r}}{r^2} dV.$

2. Maxwell 方程组:

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}; \\ \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}; \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0; \\ \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \Rightarrow \text{位移电流: } \vec{J}_D = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}. \end{array} \right.$$

3. 极化强度:  $\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V},$

电位移矢量:

$$\left. \begin{array}{l} \vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \\ \vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E} \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{D} = (1 + \chi_e) \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E}.$$

4. 磁化强度:  $\vec{M} = \frac{\sum \vec{m}_i}{\Delta V},$

磁场强度和磁感应强度的关系:  $\vec{B} = \mu \vec{H} = (1 + \chi_M) \mu_0 \vec{H} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M}.$

5. 在介质中:

束缚电荷:  $\rho_P = -\nabla \cdot \vec{P} \Rightarrow \sigma_P = -(P_2 - P_1);$

净电荷:  $\rho_P + \rho_f = \varepsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} \Rightarrow \sigma_P + \sigma_f = \varepsilon_0 (E_2 - E_1);$

自由电荷:  $\rho_f = \nabla \cdot \vec{D} \Rightarrow \sigma_f = D_2 - D_1.$

6. 在介质中:

$$\text{诱导电流} \left\{ \begin{array}{l} \text{磁化电流: } \vec{J}_M = \nabla \times \vec{M}; \\ \text{极化电流: } \vec{J}_P = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}, \end{array} \right.$$

故: 总电流 = 自由电流 + 诱导电流 + 位移电流, 即  $\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{B} = \vec{J}_f + \vec{J}_M + \vec{J}_P + \vec{J}_D.$

7. 介质中的 Maxwell 方程组:

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}; \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f; \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0; \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{J}_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}. \end{array} \right.$$

表 1: 几种磁性之间的区别

diamagnetic 抗磁性	$\mu < \mu_0$ $\chi_M < 0$	没有不成对电子, 磁场减弱 (Lenz's Law)
paramagnetic	$\mu > \mu_0$ $\chi_M > 0$	不成对电子有相同的自旋, 增强磁场
ferromagnetic	$\mu \gg \mu_0$ $\chi_M \gg 0$	

8. 坡印廷矢量:  $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ .

欧姆定律微观形式:  $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ .

9. 电磁场的变值关系:

$$\begin{cases} \vec{e}_n \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0; \\ \vec{e}_n \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{\alpha}; \\ \vec{e}_n \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f; \\ \vec{e}_n \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0. \end{cases}$$

10. 电磁场能量密度:  $\frac{d\omega}{dt} = \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ ,

故在真空中:  $\omega = \frac{1}{2}(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2)$ ,

在介质中:  $\omega = \frac{1}{2}(\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{H} \cdot \vec{B})$ , 注意光速  $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$ .

11. 矢势: 由麦克斯韦方程组中  $\nabla \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ ,

则  $\nabla \times \vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{E} = -\nabla U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$ .

12. 电磁波压力:

全吸收:  $P_r = \frac{I}{c}$ ;

全反射:  $P_r = \frac{2I}{c}$ .

13. 电磁波中  $\vec{B} = \frac{1}{c} \vec{k} \times \vec{E} \Rightarrow B = \frac{E}{c}$ .

14. 电容器:  $C = \frac{Q}{U}$ ,  $E = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2$ .

15. 偶极子电场:  $E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{p}{z^3}$ ,



电偶极子在电场中的能量和磁矩在磁场中的能量:  $U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$ ,  $U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$ .

16. 螺线管 (solenoid) 内磁场:  $B = \mu_0 n I$  (安培环路定理), 理想螺线管外无磁场。


17. valence band 价带;  
conduction band 导带.

18. 超导: BCS theory: 库珀对  $\rightarrow$  bosonic state.  
迈斯纳 Meissner effect: 超导态时 expel any magnetic field.


19. 电磁波的趋肤效应:  $\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \sigma}}$ .

### 3 Electronics

1. Metal:



Semiconductor:



2. Capacitor:  $q = c\varepsilon(1 - e^{-\frac{t}{\tau_c}})$ , 其中  $\tau_C = RC$ , 容抗  $X_C = \frac{1}{\omega C} \propto \frac{1}{\omega}$ .

3. Inductor: 由  $\Phi = LI$  定义,  $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -L\frac{di}{dt}$ , 感抗  $X_L = \omega L \propto \omega$ ,  
能量  $U = \frac{1}{2}LI^2$ ,  $\tau_L = R/L$ .

5. LC 回路频率:  $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ;





RLC 回路频率:  $\omega' = \sqrt{\omega^2 - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$ ;

总阻抗:  $Z = R + i\omega L + \frac{1}{i\omega C}$ , 故  $|Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$ ;

则共振频率:  $\omega_{resonant} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ .

6. Thevenin 戴维南.

7. 门电路:



异或: 输入端 A 和 B 相同为 0, A 和 B 不同则为 1.

## 4 Thermodynamics and Statistical Physics

1. 能均分定理: 平均动能  $E = \frac{\nu}{2} N k_B T$ ,  $\nu$  为自由度.

2. 理想气体:  $pV = nRT = Nk_B T$ . (注意  $nR = Nk_B$ )

麦克斯韦速率分布:  $n(v) = A v^2 e^{-mv^2/2k_B T}$ , 推出:

$$\text{最可几速度: } v_{mode} = \sqrt{\frac{2RT}{M}};$$

$$\text{均方根速度: } v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}};$$

$$\text{平均速度: } v_{avg} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}};$$

$$\text{其中: } v_{mode} < v_{avg} < v_{rms}.$$

$$\text{平均自由程: } \lambda = \frac{1}{\sigma n} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}, (\sigma \text{ 为碰撞截面积})$$

$$\text{则弛豫时间 } \tau = \frac{\lambda}{v}, \text{ 利用能均分定理 } \frac{1}{2} m v^2 = \frac{\nu}{2} k_B T, \text{ 故 } \tau = \frac{\sqrt{m} \lambda}{\sqrt{\nu k_B T}}.$$

3.  $C_P - C_V = nR$ ;

Isothermal: 等温; Isobaric: 等压;

Isochoric: 等容; adiabatic: 绝热  $\Rightarrow pV^\gamma = C$ , ( $\gamma = \frac{C_P}{C_V} > 1$ , 故绝热线比等温线更陡).

4. Partition Function 配分函数:  $Z = \sum_s g_s e^{-\beta \epsilon_s}$  ( $\beta = \frac{1}{k_B T}$ ), 其中  $g_s$  为简并度;

多系统:  $Z = \prod_{i=1}^N \zeta_i$ ; ( $\zeta_i$  为每个子系统的配分函数)

$$\text{故能量期望值为 } \langle E \rangle = \frac{1}{Z} \sum_s \epsilon_s e^{-\beta \epsilon_s} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}.$$

每个态的概率  $P(s) = \frac{e^{-\beta \epsilon_s}}{Z}$ , 注意近似: 当  $X \gg 1$ ,  $\ln X! \approx X(\ln X - 1)$ .

三种分布:

$$\text{玻尔兹曼分布: } n(\epsilon_s) = \frac{g_s}{e^{(\epsilon_s - \mu)\beta}} \Rightarrow a_l = \frac{\omega_l}{e^{(\epsilon_l - \mu)\beta}};$$

$$\text{费米分布: } n(\epsilon_s) = \frac{g_s}{e^{(\epsilon_s - \mu)\beta} + 1} \Rightarrow a_l = \frac{\omega_l}{e^{(\epsilon_l - \mu)\beta} + 1};$$

$$\text{波色分布: } n(\epsilon_s) = \frac{g_s}{e^{(\epsilon_s - \mu)\beta} - 1} \Rightarrow a_l = \frac{\omega_l}{e^{(\epsilon_l - \mu)\beta} - 1};$$

在经典极限条件  $\frac{a_l}{\omega_l} \ll 1$  下, 费米分布和波色分布都近似为玻尔兹曼分布.

5. Entropy:  $S = k_B \ln \Omega$ ,  $\partial S = \frac{\partial Q}{T}$ , 故  $\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{dQ}{T}$ ;


$dS \geq \frac{dQ}{T}$ , 故  $dU \leq TdS - pdV$ , 且绝热过程  $ds \geq 0$ .

由热力学基本方程:  $dU = dQ - pdV = TdS - pdV + \mu dN$ , 故  $\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N}$ ;

除此之外, 熵和配分函数之间的关系:  $S = \frac{\partial}{\partial T}(k_B T \ln Z)$ .


6. 活塞: piston.

7. 卡诺循环:



正卡诺循环:

$$\text{对外做功} \Rightarrow \eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1};$$



逆卡诺循环:

$$\text{制冷} \Rightarrow \eta = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2};$$

8. 焓 Enthalpy:  $H = E + pV$ ,  $dH = TdS + Vdp$ ;

自由能 Helmholtz Free Energy:  $F = E - TS$ ,  $dF = -SdT - pdV$ ;

吉布斯自由能 Gibbs Free Energy:  $G = E - TS + pV$ ,  $dG = -SdT + Vdp$ .

配分函数:  $Z = e^{-\beta F}$ ;

由  $dU \leq TdS - pdV$  可知: 等温等容:  $dF \leq 0$ ; 等温等压:  $dG \leq 0$ .

9. 黑体辐射:  $P = \sigma T^4$ ;


维恩位移定律:  $\lambda_{max} \cdot T = \text{Constant}$ ;

$$\text{普朗克分布: } I(\nu, T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}.$$

10. 相图:

Critical 临界点: 气液之间无区别点;

Triple 三相电: 气液固三相并存.



11. 相变:  $dU = TdS - pdV$ ;

相变潜热:  $L = T(S^{(2)} - S^{(1)})$ ; 体积突变:  $\Delta V = V^{(2)} - V^{(1)}$ .

一级相变: 存在  $L$  和  $\Delta V$ ; 二级相变 (连续相变): 无相变潜热和体积突变.

12. 三维电子态密度

电子能量:  $\varepsilon = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ , 每个量子态在  $k$  空间占据体积为  $\frac{(2\pi)^3}{V}$ ,

故态密度  $N(E) = \frac{4\pi k^2 \cdot dk}{(2\pi)^3/V \cdot d\varepsilon}$ ;

若考虑电子自旋  $\times 2$ , 则  $N(E) = \frac{2V}{(2\pi)^3} \frac{4\pi km}{\hbar^2} \propto \sqrt{E}$ .

## 5 Optics

- 光速:  $v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$ .
- 不确定度原理:  $\Delta E \Delta \tau \approx \hbar \Rightarrow \Delta \tau \Delta \nu \approx 1$ ,  
相速度:  $v_p = \frac{\omega}{k}$ , 群速度:  $v_g = \frac{d\omega}{dk}$ ,  
折射率:  $n = \frac{c}{v} = \sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{\mu_0\varepsilon_0}} \approx \sqrt{\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}}$ .
- 球面反射:  $\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} = \frac{2}{r}$ , 放大率 magnification:  $m = -\frac{s'}{s}$ .  
球面折射:  $\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{r}$ .  
薄透镜有:  $\frac{1}{f'} = (n_0 - 1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$ , ( $n_0$  为透镜折射率),  
 $\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n_0 - n}{r_1} + \frac{n' - n_0}{r_2}$ ,  
 $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$ .
- 瑞利 Rayleigh 判据 (中央最大与第一极小重叠) 像可分辨:  $\theta_R = 1.22 \frac{\lambda}{d} = 0.61 \frac{\lambda}{r}$ ,  
故艾里斑半径:  $r = \theta_R f = (1.22 \frac{\lambda}{D}) f$ .
- 多普勒效应:  $\frac{1}{\lambda_s}(v \pm v_s) = \frac{1}{\lambda_D}(v \pm v_D)$ .
- 杨氏双缝干涉 (interference):  
最大:  $d \sin \theta = m\lambda$ , ( $d$  为双缝间距);  
最小:  $d \sin \theta = (m + \frac{1}{2})\lambda$ .  
 $y_m = \frac{m\lambda L}{d}$ , ( $L$  为缝屏间距).
- 单缝衍射 (diffraction):  
最大:  $a \sin \theta = (m + \frac{1}{2})\lambda$ , ( $a$  为缝宽).  
最小:  $a \sin \theta = m\lambda$ .
- 求成像最 sharp 时照相机的小孔半径:  
即只有第一主极大在缝宽内  $y \approx a = D \cdot \theta$ ,  
而  $a \cdot \sin \theta \approx a \cdot \theta = \lambda$ , 故  $a = \sqrt{\lambda D}$ .
- 光栅 (gratting) 衍射: 最大值  $d \sin \theta = k\lambda$ , 光栅常数  $d = a + b$ .

10. 布拉格衍射:  $2d \sin \theta = k\lambda$ .

11. 空气中薄膜 (第一次反射有半波损失):  $2nd = (m + \frac{1}{2})\lambda$ .

12. 迈克尔逊干涉仪:

插入折射率为  $n$  厚度为  $L$  的板:  $N = \frac{2L}{\lambda}$ ,  $N' = \frac{2Ln}{\lambda}$ ,


故:  $N' - N = \frac{2L}{\lambda}(n - 1)$ ;

单纯移动镜面:  $\Delta N = \frac{2L}{\lambda}$ .

13. 牛顿环:

$$2d = (m + \frac{1}{2})\lambda, d = R - \sqrt{R^2 - r^2} \approx \frac{r^2}{2R},$$

$$\text{故 } r = \sqrt{R(m + \frac{1}{2})\lambda}.$$




14. 通过偏振片:  $I = \frac{I_0}{2}$ ;

马吕斯定律:  $I = I_0 \cos^2 \theta$ .

15. 斯涅耳定律:  $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ ;

布鲁斯特角:  $\theta = \arctan \left( \frac{n_2}{n_1} \right)$ ,

布鲁斯特角时反射光和折射光的偏振方向如右图所示.



16. 干涉光强  $I = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \delta$ .

17. 光栅性能参数: <1> 角色散本领:  $D_\theta = \frac{\delta \theta}{\delta \lambda} = \frac{K}{d \cos \theta} \Leftarrow (d \sin \theta = K\lambda \text{ 求导})$ .

<2> 线色散本领:  $D_l = \frac{\delta l}{\delta \lambda} = D_\theta \cdot f = \frac{Kf}{d \cos \theta}$ .

<3> 色分辨本领:  $R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda}$ ,

由  $d \sin \theta = K(\lambda + \Delta \lambda)$  和第一极小  $d \sin \theta = (K + \frac{1}{N})\lambda$ ,

得到  $R = KN = \frac{Nd \sin \theta}{\lambda}$ ,

其中  $Nd$  为光栅宽度, 所以使用光栅时最好全照亮.

<4> 色散范围 (自由光谱范围):

$$K(\lambda + \Delta\lambda) = (K + 1)\lambda \Rightarrow \Delta\lambda = \frac{\lambda}{K} = \frac{\lambda^2}{d \sin \theta}.$$

## 18. 晶体光学:

光轴: 不发生双折射.

主平面: 光线和光轴确定的平面.


$o$  光垂直于主平面,  $e$  光平行于主平面.

正晶体:  $v_o > v_e$ ,  $n_o < n_e$ . (石英)

负晶体:  $v_o < v_e$ ,  $n_o > n_e$ . (方解石)

较快光的光矢量振动的方向  $\rightarrow$  快轴.

较慢光的光矢量振动的方向  $\rightarrow$  慢轴.

19. 正常色散柯西公式:  $n = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4}$ .

色散率:  $\nu = \frac{dn}{d\lambda} = -\frac{2B}{\lambda^3} < 0$ ;

而反常色散:  $\nu > 0$ .

20. 散射强度:  $I_\theta \propto \frac{1}{\lambda^4}$ .

分子小: 瑞利散射 (分子散射); 分子大: 米氏散射 (延德尔散射).



## 6 Astrophysics and Relativity

18. 晶体光学: 1. Parsec: 秒差距 = 3.26 光年.

$1^\circ = 60' \text{ arcminute}$  角分 =  $3600'' \text{ arcsecond}$  角秒.

宇宙背景辐射:  $\lambda T = C \Rightarrow T = \frac{C}{\lambda} \propto \frac{1}{r} (\lambda \propto r, r \text{ 为宇宙半径})$

2. 红移量:  $z = \frac{\lambda_{ob} - \lambda_{em}}{\lambda_{em}}$ , 当  $v \ll c$  时, 有  $z \approx \frac{v}{c} = \beta$ .

3. 哈勃定律:  $v = H_0 D \Rightarrow \frac{1}{H_0}$  给出宇宙年龄.

4. 黑洞: Schwarzschild 半径  $\frac{1}{2}mc^2 - \frac{GMm}{r} = 0 \Rightarrow r = \frac{2GM}{c^2}$ .

5. 洛伦兹变换:  $\beta = \frac{v}{c}, \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \Rightarrow \frac{1}{\gamma} = 1 - \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}$ .

四维坐标  $(x_1, x_2, x_3, ict)$ .

坐标变换:

$$\begin{cases} x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \\ y' = y, \quad z' = z, \\ t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \end{cases}$$

速度变换:

$$\begin{cases} u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{vu'_x}{c^2}}, \quad u_y = \frac{u'_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{vu'_x}{c^2}}, \quad u_z = \frac{u'_z \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{vu'_x}{c^2}}; \\ u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{vu_x}{c^2}}, \quad u'_y = \frac{u_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vu_x}{c^2}}, \quad u'_z = \frac{u_z \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vu_x}{c^2}}; \end{cases}$$

6. 间隔:  $s^2 = c^2 \Delta t^2 - (\Delta x)^2$ .


<1>  $s^2 = 0$ , 类光;

<2>  $s^2 > 0$ , 类时, 可用低于光速的作用来连接;

<3>  $s^2 < 0$ , 类空, 无因果关系, 绝对异地;

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{p^2 c^2}{E^2}}}$$

$$\Rightarrow E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4.$$



对于光子有  $p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h\nu}{c} = \frac{E}{c}$ .

7. 相对论多普勒效应:  $f' = \sqrt{\frac{1 \pm \beta}{1 \mp \beta}} f$  (注意是  $\beta$ , 不是  $\beta^2$ )

横向多普勒效应:  $f' = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} f$  (红移).

8. 电磁场:

$$\begin{aligned} E'_x &= E_x, \quad E'_y = \gamma(E_y - vB_z), \quad E'_z = \gamma(E_z + vB_y); \\ B'_x &= B_x, \quad B'_y = \gamma(B_y + \frac{v}{c^2}E_z), \quad B'_z = \gamma(B_z - \frac{v}{c^2}E_y). \end{aligned}$$

9. 切连科夫辐射:

当介质中光速小于带电粒子速度  $v$  时即  $\frac{c}{n} < v$ , 就会产生光子震波, 如下图所示,

辐射角度满足  $\cos \theta = \frac{c}{nv} = \frac{1}{n\beta}$ , 其中  $\beta = \frac{v}{c}$ .




图 2: 切连科夫辐射

## 7 Quantum Mechanics

1. 对易:  $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$ ; 标准差:  $\sigma = \sqrt{\langle j^2 \rangle - \langle j \rangle^2}$ .

泡利矩阵:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{S} = \frac{\hbar}{2} \vec{\sigma}.$$

2. 含时薛定谔方程  $i\hbar \frac{\partial H}{\partial t} = \hat{H}\Psi$ ,  $\Psi(t) = \Psi(0)e^{-\frac{iHt}{\hbar}}$ .

$$\text{定态薛定谔方程 } \hat{H}\Psi = E\Psi \Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Psi + V\Psi = E\Psi.$$

$$\text{可观测量 } Q \text{ 的期望值 } \langle \hat{Q} \rangle = \langle \Psi | \hat{Q} | \Psi \rangle = \int \Psi^* \hat{Q} \Psi dx.$$

3. 动量对应算符  $p \rightarrow \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}$  或者  $p \rightarrow -i\hbar \nabla$ .

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar.$$

$$\text{球谐函数 } Y_l^m = \Theta(\theta)e^{im\phi}, \quad Y_0^0 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{\pi}}.$$

$$\text{若波函数为 } \cos m\phi = \frac{e^{im\phi} + e^{-im\phi}}{2} \Rightarrow \text{本征值为 } m\hbar \text{ 和 } -m\hbar.$$

4. 标准边界条件:

$$\begin{cases} \Psi(x) \text{ 连续;} \\ \frac{d\Psi}{dx} \text{ 在势能不无穷大处连续;} \end{cases}$$

$$\text{普朗克长度 } l_p = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \approx 10^{-35} m.$$

$$\text{概率流: } \vec{J} = \frac{\hbar}{2mi} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*).$$

5. 单态:  $|0\ 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \uparrow\downarrow - \frac{1}{\sqrt{2}} \downarrow\uparrow$ .

三重态:

$$\begin{cases} |1\ 1\rangle = \uparrow\uparrow \\ |1\ 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \uparrow\downarrow + \frac{1}{\sqrt{2}} \downarrow\uparrow \\ |1\ -1\rangle = \downarrow\downarrow \end{cases}$$

6. 无穷深势阱:

$$\text{在 } 0 \leq x \leq a, \text{ 波函数 } \Psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots, \text{ 有 } n-1 \text{ 个节点,}$$

$$\text{能量 } E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}.$$

7. 谐振子:

$$\text{能量 } E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2}),$$

$$\text{波函数 } \Psi_0 = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} e^{-\xi^2/2}, \xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x, \Psi_n \text{ 的奇偶性同 } n.$$

8.  $\delta$  函数势  $V = -\alpha\delta(x)$ .

考虑束缚态  $E < 0 \Rightarrow x < 0, -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Psi = E\Psi$ , 即  $\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Psi = \kappa^2\Psi, \kappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}$ ,  
故  $\Psi(x) = Ae^{-\kappa x} + Be^{\kappa x}$ . ( $x \rightarrow -\infty$  需收敛, 故  $A = 0$ )

同理  $\Psi(x) = Fe^{-\kappa x}$  ( $x > 0$ ).

边界条件  $x = 0$  时有  $B = F$ ,

且  $-\frac{\hbar^2}{2m}\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}dx + \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}V(x)\Psi dx = \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}E\Psi(x)dx$ , (积分薛定谔方程)

$$\Delta\left(\frac{\partial\Psi}{\partial x}\right) = \frac{2m}{\hbar^2}\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}V(x)\Psi(x)dx = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\Psi(0).$$

$$\text{故 } \Delta\left(\frac{\partial\Psi}{\partial x}\right) = 2B\kappa = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}B \Rightarrow \kappa = \frac{m\alpha}{\hbar^2},$$

$$\text{故 } \Psi(x) = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar}e^{-m\alpha|x|/\hbar^2}, E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2},$$

可见只有一个束缚态解.

有限深势阱至少有 1 个束缚态解.

共振透射  $T = 1 \Rightarrow k'b = n\pi$ .




图 3: 边界反射与透射

9. 一阶微扰  $E_n^{(1)} = \langle \Psi_n^{(0)} | H' | \Psi_n^{(0)} \rangle$ .

$$\text{一阶波函数 } \Psi_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \Psi_m^{(0)} | H' | \Psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \Psi_m^{(0)}.$$

$$\text{二阶微扰 } E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \Psi_m^{(0)} | H' | \Psi_n^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} = \langle \Psi_n^{(1)} | H' | \Psi_n^{(1)} \rangle.$$

变分法:  $\langle \Psi | H | \Psi \rangle \leq E_g$ ,

试探函数一般可取  $\Psi(x) = Ae^{-bx^2}$  或氢原子基态波函数  $\Psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}}e^{-r/a}$ .

10. 不确定原理:

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \leq \left(\frac{1}{2i} \langle [A, B] \rangle\right)^2.$$

$$\text{如 } \sigma_x \sigma_p \leq \frac{\hbar}{2}, \sigma_E \sigma_t \leq \frac{\hbar}{2}.$$

气体密度  $\rho \uparrow, \sigma_t \downarrow, \sigma_E \uparrow$ , 故谱线越宽.

11. 角动量:  $L^2\Psi = l(l+1)\hbar^2\Psi$ ,  $L_z\Psi = m\hbar\Psi$ .

对易:  $[r_i, r_j] = [p_i, r_j] = 0$ ,  $[r_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}$ ,

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z, [L^2, L_i] = 0 \Rightarrow [L^2, \vec{L}] = 0.$$

令  $L_{\pm} = L_x \pm iL_y$ , 则  $[L_z, L_{\pm}] = \hbar L_{\pm}$ ,  $[L^2, L_{\pm}] = 0$ .

且  $L_{\pm}f_l^m = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m\pm 1)}f_l^{m\pm 1}$ .

12. 氢原子:  $E_n = -E_1(\frac{Z^2}{n^2}\frac{\mu}{\mu_e})$ ,  $E_1 = \frac{q^4}{8\hbar^2\epsilon_0^2} = 12.6\text{eV}$ .

一般情况  $\mu \approx \mu_e \approx m_e$ , 对于 positronium,  $\mu = \frac{m_e^2}{m_e + m_e} = \frac{1}{2}m_e$ .

轨道电子速度  $v_n = \frac{\alpha c}{n}$ , 其中  $\alpha$  为精细结构常数  $\frac{1}{137}$ .

轨道半径  $r_n \approx a_0(\frac{m_e}{\mu}\frac{n^2}{Z})$ , 其中  $a_0 \approx 0.53\text{\AA}$ .

基态波函数  $\Psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}}e^{-r/a}$ , 第一激发态  $\propto (1 - \frac{r}{2a})e^{-r/2a}$ .

13. 磁矩  $\mu = -\frac{e}{2m}L$ , 自旋  $\mu_s = -\frac{ge}{2m}S$ , 朗德因子  $g = 2$ , 旋磁比  $\gamma = \frac{\mu_s}{S} = -\frac{ge}{2m}$ .

14. Stern-Gerlach 实验: Ag 原子  $5s^1$  电子  $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\uparrow\downarrow - \frac{1}{\sqrt{2}}\downarrow\uparrow$  经过磁场分裂为两束.

15. 弗兰克-赫兹实验: 非弹性碰撞才会吸收电子能量.

16. 康普顿散射:  $\Delta\lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\phi)$ . (务必记住此公式)

17. 精细结构 split with  $j$ : <1> 相对论修正; <2> 自旋-轨道耦合.

18. 横截面微分  $D(\theta) = \frac{d\sigma}{d\Omega}$ , 其中  $d\Omega = \sin\theta d\theta d\phi$ .

19. 更多请参看量子力学笔记部分...

## 8 Solid State Physics

1.  $V = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3).$

倒格子:  $\vec{b}_1 = 2\pi \frac{\vec{a}_2 \times \vec{a}_3}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}, \vec{b}_2 = 2\pi \frac{\vec{a}_3 \times \vec{a}_1}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}, \vec{b}_3 = 2\pi \frac{\vec{a}_1 \times \vec{a}_2}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}.$

2. 自由电子气:  $E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}, k_F = (3\rho\pi^2)^{\frac{1}{3}}, \rho$  为电子数密度.

推导: 在  $T = 0$  时, 费米分布  $f_0(E) = \begin{cases} 1, E \leq E_F \\ 0, E > E_F \end{cases},$

态密度  $N(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left( \frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} E^{\frac{1}{2}}$

$$N = \int_0^\infty f_0(E) \cdot N(E) dE = \frac{V}{2\pi^2} \left( \frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \times \int_0^{E_F} E^{\frac{1}{2}} dE.$$

可得  $E_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{3\pi^2 N}{V} \right)^{\frac{2}{3}},$  故  $k_F = \left( \frac{3\pi^2 N}{V} \right)^{\frac{1}{3}}.$

3. 有效质量:  $\frac{d^2 E}{dk^2} = \frac{\hbar^2}{m},$  故  $m^* = \frac{\hbar^2}{\left( \frac{d^2 E}{dk^2} \right)}.$

## 9 Particle Physics

1.  $J/\Psi$  meson 介子: 由一个 charm quark 和一个 anti charm quark 组成.

Deuteron: 氘核.

自旋: 光子 photon=1, 电子  $=\frac{1}{2}$ , 质子 proton= $\frac{1}{2}$ .

2.

hadron 强子  $\left\{ \begin{array}{l} \text{meson 介子 (boson): a quark and an antiquark.} \\ \text{baryon 重子 (fermion): 3 quarks}(\frac{1}{3}). \end{array} \right.$   
baryon number  $B(\pm 1)$ .

lepton 轻子  $\left\{ \begin{array}{l} \text{电子 electron}(e^-) \text{ 和电子中微子 electron neutrino}(\nu_e), \\ \mu \text{子 muon}(\mu^-) \text{ 和} \mu \text{子中微子 muon neutrino}(\nu_\mu), \\ \tau \text{子 tau}(\tau) \text{ 和} \tau \text{子中微子 tau neutrino}(\nu_\tau). \end{array} \right.$

轻子数守恒: lepton number  $L$  conservation.

3. 汤川秀树预言的介子是  $\pi$  介子, 不是  $\mu$  子.

4.  $\mu$  子衰变:  $\mu^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$ ,  $\mu^+ \rightarrow e^+ + \nu_e + \bar{\nu}_\mu$ .

$\alpha$  衰变:  ${}^A N \rightarrow {}^{A-4} L + {}^4 He$ .

$\beta^-$  衰变:  $\beta^- : N \rightarrow O + e^- + \bar{\nu}_e$  ( $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$ ),

$\beta^+$  :  $N \rightarrow O + e^+ + \nu_e$  ( $p \rightarrow n + e^+ + \nu_e$ ).

$\beta^-$  衰变更普遍, 因为中子数量更多.

## 10 Atomic Physics and Nuclear Physics

1.  $^{2S+1}L_J$ , 锂 Lithium, 钠 Sodium.

2. 选择定则:  $\Delta m_l = \pm 1, 0$ ;  $\Delta l = \pm 1$ ;  $\Delta j = 0, \pm 1$ ;  $\Delta m_s = 0$ .

洪特法则:  $\langle 1 \rangle S \uparrow, E \downarrow$ ;

$\langle 2 \rangle L \uparrow, E \downarrow$ ;

$\langle 3 \rangle$  如果壳层少于半满,  $J = |L - S|, E \downarrow$ ,

如果壳层多于半满,  $J = L + S, E \downarrow$ ,

3. 塞曼效应:  $U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\frac{ge}{2m} \vec{J} \cdot \vec{B}$ .

玻尔磁子:  $\mu_B = \gamma \hbar = \frac{e\hbar}{2m}$ .

$h\nu' = h\nu + (m_2 g_2 - m_1 g_1) \mu_B B$ , 正常塞曼效应  $S = 0, g_1 = g_2 = 1, \Delta m = 0, \pm 1$ ,

故:  $h\nu' = h\nu + \begin{pmatrix} \mu_B B \\ 0 \\ -\mu_B B \end{pmatrix} \begin{matrix} \sigma^+ \text{左旋} \\ \pi \text{线偏振} \\ \sigma^- \text{右旋} \end{matrix}$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{平行于 } B \text{ 方向只能看到 } \sigma^\pm \text{ 2条} \\ \text{垂直 } B \text{ 方向可以看到 3条} \end{array} \right.$

3. 斯塔克效应 ( $E$ ):  $U = \vec{p} \cdot \vec{E} = -qEr \cos \theta$ .

4. X 射线 (excite inner electrons of element near the nuclear)  $\rightarrow$  Auger transition 俄歇跃迁.

考虑 shielding 作用:  $E = 13.6\text{eV} \left(\frac{3}{4}\right) (Z-1)^2$ .


5. 激光 (受激发射): 发射光子与入射光子有相同的  $\omega$ 、 $\phi$  和偏振方向...

条件: 1. 相干 coherent.

2. 单色 monochromatic.

3. minimal divergence.

4. high intensity.



6. 几种常用激光:

Diod Laser: active medium is semiconducting. (p-n 结)

Gas Laser: active medium is free gas. (电流  $\xrightarrow{\text{激发}}$  atoms)



7. Nucleus is most likely to emit electrons in the direction opposite to the magnetic field.

8.  $r \approx r_0 A^{\frac{1}{3}}$ ,  $r_0 \approx 1.2 fm$ , 结合能:  $E_B = \sum_i m_i c^2 - M c^2$ , 核子 nucleon.

9. 半衰期:  $N = N_0 e^{-\lambda t}$ ,  $R = -\frac{dN}{dt} = \lambda N$ ,  $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$ ,

平均寿命 mean life:  $\tau = \frac{1}{\lambda}$ .

若  $\frac{dN}{dt} = -(\lambda_A + \lambda_B)N \Rightarrow N = N_0 e^{-(\lambda_A + \lambda_B)t}$ , 则  $\frac{1}{t_{1/2}} = \frac{1}{t_{1/2}^A} + \frac{1}{t_{1/2}^B}$ .

10. 单位  $Gray = \frac{Energy}{Unit\ mass}$ , 即  $1Gy = \frac{1J}{1kg}$ .

韧致辐射 Bremsstrahlung: 对电荷  $P = \frac{q^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \propto q^2 \propto a^2$ ; 对电偶极子  $P = \frac{\omega^4}{12\pi\epsilon_0 c^3} p^2$ .

11. 卢瑟福散射:  $\frac{1}{2}mv^2 = k\frac{2e^2}{r}$ .

12.  $\frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n'^2})$ :

$n = 1$ , 莱曼系;

$n = 2$ , 巴耳末系  $\left\{ \begin{array}{l} H - \alpha \text{ 线, } 3 \rightarrow 2 \\ H - \beta \text{ 线, } 4 \rightarrow 2 \\ H - \gamma \text{ 线, } 5 \rightarrow 2 \end{array} \right.$

$n = 3$ , 帕邢系.

## 11 Mathematics and Ohters

$$1. \sum n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

$$2. \text{Fourier Series: } f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$


$$\text{其中 } a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt, \quad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt.$$

$$\text{傅里叶变换: } f(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt.$$

3. 误差分析:

Accuracy } 区别  
Precision }

RV(Real Value) 代表实际值.



$$4. \text{泊松分布: } P_{\mu}(\nu) = e^{-\mu} \frac{\mu^{\nu}}{\nu!},$$

即  $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ , 如下图所示.

标准差  $\sigma = \sqrt{\mu}$ , 若重复  $N$  次, 则  $\sigma_N = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$ .

$3 - \sigma$  原则对应概率: 0.6826, 0.9544, 0.9974.




图 4: Poisson Distribution.

5. 不确定度:

$$<1> x = a + b + \dots \Rightarrow dx = da + db + \dots \Rightarrow (\delta x)^2 = (\delta a)^2 + (\delta b)^2 + \dots;$$

$$<2> x = a \cdot b \dots \Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{da}{a} + \frac{db}{b} + \dots \Rightarrow \left(\frac{\delta x}{x}\right)^2 = \left(\frac{\delta a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\delta b}{b}\right)^2 + \dots$$

$N$  次测量得到的值和不确定度分别为  $x_i$  和  $\sigma_i$ , 则每次的权重  $\omega_i = \frac{1}{\sigma_i^2}$ ,

$$\text{则 } x_{avg} = \frac{\sum \omega_i x_i}{\sum \omega_i}, \sigma_{avg} = \frac{1}{\sqrt{\sum \omega_i}}.$$

$$\text{若多次测量均有 } \omega_i = \omega, \text{ 则 } x_{avg} = \frac{\sum x_i}{N}, \sigma_{avg} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}.$$

6. 原子核横截面积  $\pi(10^{-14})^2 m^2 = 10^{-28} m^2$ ;

空气分子碰撞横截面积  $\sigma = 10^{-18} m^2$ ;

空气粒子数密度  $n = 10^{25} m^{-3}$ ;

空气分子平均自由程  $l_p = \frac{1}{\sigma n} = 10^{-7} m$ .