

dist start (mm) — QQ residuals (p=0.096)
QQ per group (Shapiro)
A p=0.239
B p=0.148
C p=0.024
D p=0.727
E p=0.687
F p=0.763
G p=0.972
residuals vs mean (Levene p<0.001)
duration (s) — QQ residuals (p<0.001)
QQ per group (Shapiro)
A p<0.001
B p<0.001
C p=0.070
D p<0.001
E p=0.048
F p=0.001
G p=0.817
residuals vs mean (Levene p<0.001)
path (mm) — QQ residuals (p<0.001)
QQ per group (Shapiro)
A p=0.014
B p<0.001
C p=0.003
D p<0.001
E p<0.001
F p=0.111
G p=0.141
residuals vs mean (Levene p<0.001)
speed (mm/s) — QQ residuals (p<0.001)
QQ per group (Shapiro)
A p<0.001
B p=0.003
C p=0.037
D p=0.474
E p=0.103
F p=0.058
G p=0.002
residuals vs mean (Levene p=0.001)
% still — QQ residuals (p<0.001)
QQ per group (Shapiro)
A p=0.006
B p<0.001
C p<0.001
D p=0.002
E p=0.050
F p=0.013
G p<0.001
residuals vs mean (Levene p<0.001)
dist strike (mm) — QQ residuals (p<0.001)
QQ per group (Shapiro)
A p=0.261
B p=0.389
C p=0.318
D p=0.363
E p=0.406
F p<0.001
G p=0.985
residuals vs mean (Levene p=0.056)
dist mean (mm) — QQ residuals (p<0.001)
QQ per group (Shapiro)
A p=0.359
B p=0.044
C p=0.002
D p<0.001
E p=0.081
F p=0.072
G p=0.454
residuals vs mean (Levene p<0.001)
approach (mm/s) — QQ residuals (p<0.001)
QQ per group (Shapiro)
A p<0.001
B p=0.001
C p=0.024
D p=0.934
E p<0.001
F p=0.136
G p=0.024
residuals vs mean (Levene p=0.003)
orbit (°/s) — QQ residuals (p<0.001)
QQ per group (Shapiro)
A p<0.001
B p=0.094
C p=0.217
D p=0.027
E p=0.002
F p=0.065
G p<0.001
residuals vs mean (Levene p<0.001)