dist start (mm) — QQ residuals (p=0.004)
QQ per group (Shapiro)
A p=0.042
B p<0.001
C p=0.009
D p=0.007
E p=0.754
F p=0.291
residuals vs mean (Levene p<0.001)
duration (s) — QQ residuals (p<0.001)
QQ per group (Shapiro)
A p<0.001
B p=0.566
C p<0.001
D p<0.001
E p=0.003
F p=0.002
residuals vs mean (Levene p=0.002)
path (mm) — QQ residuals (p<0.001)
QQ per group (Shapiro)
A p<0.001
B p=0.004
C p<0.001
D p<0.001
E p=0.315
F p=0.537
residuals vs mean (Levene p<0.001)
speed (mm/s) — QQ residuals (p<0.001)
QQ per group (Shapiro)
A p<0.001
B p=0.049
C p<0.001
D p=0.149
E p=0.032
F p<0.001
residuals vs mean (Levene p=0.005)
% still — QQ residuals (p<0.001)
QQ per group (Shapiro)
A p<0.001
B p<0.001
C p=0.088
D p=0.002
E p=0.015
F p=0.053
residuals vs mean (Levene p<0.001)
dist strike (mm) — QQ residuals (p<0.001)
QQ per group (Shapiro)
A p=0.369
B p=0.742
C p=0.643
D p=0.415
E p<0.001
F p=0.745
residuals vs mean (Levene p=0.153)
dist mean (mm) — QQ residuals (p<0.001)
QQ per group (Shapiro)
A p<0.001
B p=0.001
C p=0.005
D p<0.001
E p=0.036
F p=0.228
residuals vs mean (Levene p<0.001)
approach (mm/s) — QQ residuals (p<0.001)
QQ per group (Shapiro)
A p<0.001
B p=0.021
C p<0.001
D p=0.560
E p=0.002
F p<0.001
residuals vs mean (Levene p<0.001)
orbit (°/s) — QQ residuals (p<0.001)
QQ per group (Shapiro)
A p=0.012
B p=0.137
C p<0.001
D p<0.001
E p=0.011
F p=0.003
residuals vs mean (Levene p<0.001)
cuttle length (mm) — QQ residuals (p<0.001)
QQ per group (Shapiro)
A p<0.001
B p=0.752
C p=0.112
D p=0.225
E p=0.939
F p=0.040
residuals vs mean (Levene p=0.800)
shrimp length (mm) — QQ residuals (p<0.001)
QQ per group (Shapiro)
A p<0.001
B p=0.041
C p<0.001
D p=0.006
E p=0.298
F p=0.137
residuals vs mean (Levene p=0.706)
shrimp / cuttle — QQ residuals (p<0.001)
QQ per group (Shapiro)
A p<0.001
B p=0.404
C p<0.001
D p<0.001
E p=0.573
F p=0.001
residuals vs mean (Levene p=0.305)