

**0. Indução e recursão nos naturais**

**0.1** Prove, de duas formas diferentes, que, para todo o número natural  $n \geq 2$ ,  $2n \leq n^2$ .

**0.2** Prove por indução que, para todo o número natural  $n > 4$ ,  $n^2 < 2^n$ . Note como é útil provar simultaneamente  $2n + 1 < n^2$ .

**0.3** Para  $n \in \mathbb{N}$ , seja  $P(n)$  a propriedade:  $2^n < n!$ .

- a) Mostre que: para  $k \in \mathbb{N}$  e  $k > 3$ , se  $P(k)$  é verdadeira,  $P(k+1)$  também é verdadeira.
- b) Indique, justificando, quais os naturais  $n$  para os quais  $P(n)$  é verdadeira.

**0.4** Prove que, para qualquer  $n \in \mathbb{N}$ ,  $1 + \dots + n = n(n+1)/2$ .

**0.5** Prove que, para cada  $n \in \mathbb{N}_0$ :

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \quad \sum_{i=0}^n 2i = n^2 + n; & \text{b)} \quad \sum_{i=0}^n (2i+1) = (n+1)^2; \\ \text{c)} \quad \sum_{i=0}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}; & \text{d)} \quad \sum_{i=0}^n x^i = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}, \text{ com } x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}. \end{array}$$

**0.6** Seja  $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$  a função definida recursivamente por  $f(0) = 1$  e  $f(n+1) = 2f(n)$ , para cada  $n \in \mathbb{N}_0$ .

- a) Calcule  $f(1)$  e  $f(2)$ .
- b) Mostre que, para cada  $n \in \mathbb{N}_0$ ,  $f(n) = 2^n$ .

**0.7** Seja  $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$  a função definida por  $s(1) = 2$  e  $s(n+1) = \frac{2}{s(n)}$ .

- a) Determine  $s(1)$ ,  $s(2)$  e  $s(3)$ .
- b) Determine o contradomínio de  $s$ . Prove a sua afirmação por indução.

**0.8** Sejam  $a, b \in \mathbb{R}$  com  $b \neq 1$  e seja  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  a função definida recursivamente por  $f(1) = a$  e  $f(n+1) = f(n) + ab^n$  para cada  $n \in \mathbb{N}$ .

- a) Verifique que  $f(n) = \frac{a(1-b^n)}{1-b}$  para  $n \in \{1, 2, 3\}$ .
- b) Mostre que, para cada  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f(n) = \frac{a(1-b^n)}{1-b}$ .

**0.9** Seja  $A$  um conjunto finito.

- a) Prove que, se  $A$  tem  $n$  subconjuntos e  $a \notin A$ , então  $A \cup \{a\}$  tem  $2n$  subconjuntos.
  - b) Prove que:  $\#\mathcal{P}(A) = 2^{\#A}$ .
  - c) Qual é o número de subconjuntos de  $A^3$ , quando  $A$  é um conjunto com 3 elementos?
-

**1. Indução e recursão estruturais**

**1.1** Seja  $S$  o subconjunto de  $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$  definido indutivamente pelas 3 regras apresentadas de seguida: (1)  $1 \in S$ ; (2)  $2 \in S$ ; (3)  $q \in S \Rightarrow \frac{1}{q} \in S$ .

- Dê exemplos de elementos de  $S$ .
- Mostre que o conjunto  $\{\frac{1}{2}, 2\}$  é fechado para a operação  $f : \mathbb{Q} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Q} \setminus \{0\}$  tal que  $f(q) = \frac{1}{q}$ , para qualquer  $q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ .
- Determine o conjunto  $S$ .

**1.2** Seja  $A = \{a, b, c, d\}$  e seja  $f : A \times A \rightarrow A$  a operação em  $A$  definida pela tabela que se segue.

$f$	$a$	$b$	$c$	$d$
$a$	$a$	$a$	$a$	$a$
$b$	$a$	$c$	$b$	$c$
$c$	$a$	$c$	$b$	$b$
$d$	$a$	$c$	$b$	$a$

- Calcule os conjuntos indutivos, sobre  $A$ , de base  $\{b\}$  e conjunto de operações  $\{f\}$ .
  - Prove que  $c$  é um dos elementos do conjunto gerado pela definição indutiva  $(\{b\}, \{f\})$ .
  - Indique qual é o conjunto gerado pela definição indutiva  $(\{b\}, \{f\})$ .
- 1.3** Apresente definições indutivas de cada um dos conjuntos que se seguem, explicitando a respetiva base e respetivo conjunto de operações.

- Conjunto dos naturais múltiplos de 5.
- Conjunto dos números inteiros.
- Conjunto das palavras sobre o alfabeto  $A = \{0, 1\}$  cujo comprimento é ímpar.
- Conjunto das palavras sobre o alfabeto  $A = \{a, b\}$  que têm um número par de ocorrências do símbolo  $a$ .

**1.4** Seja  $A = \{1, 2, 3\}$  e seja  $G$  o subconjunto de  $A^*$  dado pela seguinte definição indutiva determinista:

- $1 \in G$ ;
- se  $x \in G$  então  $2x \in G$ , para todo  $x \in A^*$ ;
- se  $x, y \in G$  então  $3xy \in G$ , para todo  $x, y \in A^*$ .

Considere ainda a função  $S : G \rightarrow \mathbb{N}$  definida, por recursão estrutural, do seguinte modo:

- $S(1) = 1$ ;
- para todo  $x \in G$ ,  $S(2x) = 2 + S(x)$ ;
- para todo  $x, y \in G$ ,  $S(3xy) = 3 + S(x) + S(y)$ .

- Para cada letra  $a \in A$ , indique uma palavra  $u \in G$  cuja primeira letra seja  $a$  e apresente uma sequência de formação de  $u$ .
- Indique uma sequência de formação do elemento  $v = 3213211$  de  $G$ .
- Defina por recursão estrutural a função  $C : G \rightarrow \mathbb{N}$  tal que, para todo  $x \in G$ ,  $C(x)$  é o comprimento da palavra  $x$ .
- Calcule  $S(3211)$  e  $C(3211)$ .
- Enuncie o Princípio de Indução Estrutural para  $G$ .
- Mostre que, para todo  $x \in G$ , **i.**  $S(x)$  é ímpar; **ii.**  $C(x) \leq S(x)$ .

**1.5** Seja  $V$  o conjunto numerável formado pelos símbolos  $v_0, v_1, v_2, \dots$  (designados por variáveis) e seja  $A$  o alfabeto  $V \cup \{c, f, g, (, ), , \}$ . Considere que  $E$  é a linguagem em  $A$  definida indutivamente do seguinte modo:

- (1)  $c \in E$ ;
- (2)  $v_n \in E$ , para todo  $n \in \mathbb{N}_0$ ;
- (3) se  $t \in E$ , então  $f(t) \in E$ , para todo  $t \in A^*$ ;
- (4) se  $t_1 \in E$  e  $t_2 \in E$ , então  $g(t_1, t_2) \in E$ , para todo  $t_1, t_2 \in A^*$ .

- a) Dê exemplos de palavras sobre  $A$  que pertençam à linguagem  $E$  e de palavras sobre  $A$  que não pertençam a  $E$ .
- b) Investigue se a linguagem  $E$  é fechada para cada uma das operações que se seguem.

$$\begin{array}{ll} \text{i)} & s_1 : A^* \times A^* \longrightarrow A^* \\ & (t_1, t_2) \mapsto f(t_1, t_2) \end{array} \qquad \begin{array}{ll} \text{ii)} & s_2 : A^* \longrightarrow A^* \\ & t \mapsto g(t, c) \end{array}$$

- c) Para cada um das seguintes palavras pertencentes a  $E$ , indique 2 sequências de formação cujos comprimentos sejam diferentes.

$$\text{i)} c \qquad \text{ii)} f(v_2) \qquad \text{iii)} g(g(v_0, c), c) \qquad \text{iv)} f(g(f(v_1), f(v_1)))$$

- d) Defina funções  $n_a, n_g : E \longrightarrow \mathbb{N}_0$ , por recursão estrutural, que a cada palavra  $e \in E$  façam corresponder, o número de ocorrências de *átomos* (i.e. variáveis ou a letra  $c$ ) em  $e$  e o número de ocorrências da letra  $g$  em  $e$ , respetivamente,.
- e) Enuncie o teorema de indução estrutural para a linguagem  $E$ .
- f) Mostre que, para todo  $e \in E$ ,  $n_g(e) = n_a(e) - 1$ .

**1.6** Seja  $A = \{0, 1\}$  e seja  $G$  o subconjunto de  $A^*$  dado pela seguinte definição indutiva determinista:

1.  $1 \in G$ ;
2. se  $x \in G$ , então  $x0 \in G$  e  $x1 \in G$ , para todo  $x \in A^*$ ;

Considere ainda a função  $i : G \longrightarrow \mathbb{N}$  definida, por recursão estrutural, do seguinte modo:

- $i(1) = 1$ ;
- para todo o  $x \in G$ ,  $i(x0) = 2i(x)$ ;
- para todo o  $x \in G$ ,  $i(x1) = 2i(x) + 1$ .

- a) Indique os elementos de  $G$  que admitem sequências de formação de comprimento inferior a 3.
- b) Defina por recursão estrutural a função  $h : G \longrightarrow G$  tal que, para cada  $x \in G$ ,  $h(x) = 1x$ .
- c) Determine  $i(11)$  e  $i(101)$ .
- d) Enuncie o teorema de indução estrutural para  $G$ .
- e) Mostre que, para todo o  $x \in G$ ,  $i(h(x)) = 2^n + i(x)$ , em que  $n$  é o comprimento da palavra  $x$ .

## 2. Sintaxe do Cálculo Proposicional

**2.1** Represente as seguintes frases através de fórmulas do Cálculo Proposicional, utilizando variáveis proposicionais para representar *frases atômicas*:

- a) Se o Sr. João é feliz, a sua mulher é infeliz e se o Sr. João é infeliz, a sua mulher também o é.
- b) Vou de comboio e perco o avião ou vou de camioneta e não perco o avião.
- c) Se ganho sempre que jogo bem e não ganhei, então não joguei bem.
- d) Não se pode ter sol na eira e chuva no nabal.
- e) Sou preso por ter cão, mas também sou preso por o não ter.
- f) Uma condição necessária para aprovação a Lógica por avaliação periódica é ter pelo menos 7 valores no primeiro teste.
- g) Uma condição suficiente para aprovação a Lógica é ter 14 valores no primeiro teste e 7 valores no segundo teste.

**2.2** Encontre exemplos de *frases verdadeiras* que possam ser representadas através das seguintes fórmulas:

- a)  $(p_1 \rightarrow ((\neg p_2) \vee p_3))$ .    b)  $((p_4 \wedge (\neg p_0)) \vee p_6)$ .
- c)  $(p_{13} \leftrightarrow (\neg p_8))$ .    d)  $((p_{98} \wedge (p_{98} \rightarrow p_{99})) \rightarrow p_{99})$ .

**2.3** De entre as seguintes palavras sobre o alfabeto do Cálculo Proposicional, indique, justificando, aquelas que pertencem ao conjunto  $\mathcal{F}^{CP}$ :

- a)  $(\neg(p_1 \vee p_2))$ .    b)  $((p_0 \wedge \neg p_0) \rightarrow \perp)$ .
- c)  $((\neg p_5) \rightarrow (\neg p_6))$ .    d)  $(\perp)$ .
- e)  $((p_3 \wedge p_1) \vee ($     f)  $((p_9 \rightarrow ((p_3 \vee (\neg p_8)) \wedge p_{12})) \leftrightarrow (\neg p_4)) \rightarrow (p_7 \vee \perp)))$ .

**2.4** Para cada uma das seguintes fórmulas do Cálculo Proposicional:

- i)  $p_{2015}$ .    ii)  $\neg \perp \vee \perp$ .    iii)  $p_0 \rightarrow (\neg p_0 \rightarrow \neg p_1)$ .

- a) construa sequências de formação;
- b) indique o número mínimo de elementos numa sua sequência de formação e diga quantas destas sequências de formação de comprimento mínimo existem.

**2.5** Para cada fórmula  $\varphi$  do exercício anterior, calcule  $\varphi[p_2/p_0]$ ,  $\varphi[p_0 \wedge p_1/p_1]$  e  $\varphi[p_{2016}/p_{2015}]$ .

**2.6** Defina por recursão estrutural as seguintes funções

- a)  $p : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathbb{N}_0$  tal que  $p(\varphi)$  = número de ocorrências de parêntesis em  $\varphi$ .
- b)  $v : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathbb{N}_0$  tal que  $v(\varphi)$  = número de ocorrências de vars. proposicionais em  $\varphi$ .
- c)  $c : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathcal{P}(BIN)$  tal que  $c(\varphi) = \{\square \in BIN : \square \text{ ocorre em } \varphi\}$ , onde  $BIN = \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ .
- d)  $n : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathbb{N}$  tal que  $n(\varphi)$  = o número de nodos na árvore sintática de  $\varphi$ .
- e)  $[\perp / p_7] : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathcal{F}^{CP}$  tal que  $\varphi[\perp / p_7]$  = resultado de substituir em  $\varphi$  todas as ocorrências de  $p_7$  por  $\perp$ .

**2.7** Considere de novo as funções definidas no exercício anterior. Prove, por indução estrutural, que, para todo  $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$ :

- a)  $v(\varphi) \geq \#var(\varphi)$ .      b)  $p(\varphi) \geq \#c(\varphi)$ .  
 c)  $v(\varphi) \geq v(\varphi[\perp / p_7])$ .      d)  $c(\varphi) = c(\varphi[\perp / p_7])$ .  
 e) se  $c(\varphi) \neq \emptyset$  então  $p(\varphi) > 0$ .      f) se  $p_7 \notin var(\varphi)$  então  $\varphi[\perp / p_7] = \varphi$ .

**2.8** Para cada fórmula  $\varphi$  do exercício 2.4, indique o conjunto das suas subfórmulas.

**2.9** Considere a função  $n$  do exercício 2.6.

- a) Dê exemplo de fórmulas  $\varphi$  e  $\psi$ , com 3 subfórmulas, tais que  $n(\varphi) = 3$  e  $n(\psi) > 3$   
 b) Mostre que, para todo  $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$ ,  $n(\varphi) \geq \#subf(\varphi)$ .

**2.10** Mostre que:

- a) se  $S$  é uma sequência de formação de  $\psi$  e  $\varphi$  é uma subfórmula de  $\psi$ , então  $\varphi$  é um dos elementos de  $S$ ;  
 b) toda a fórmula  $\psi$  admite uma sequência de formação que contém apenas subfórmulas de  $\psi$ ;  
 c) uma fórmula  $\psi$  tem  $n$  subfórmulas se e só se as sequências de formação de  $\psi$  mais curtas têm  $n$  elementos.

**2.11** Considere que  $\mathcal{F}_X^{CP}$  denota o subconjunto de  $\mathcal{F}^{CP}$  cujos conetivos pertencem ao conjunto  $X$ .

- a) Dê uma definição indutiva determinista do conjunto  $\mathcal{F}_{\{\neg, \vee\}}^{CP}$ .  
 b) Enuncie o Teorema da Indução Estrutural para  $\mathcal{F}_{\{\neg, \vee\}}^{CP}$ .  
 c) Defina por recursão estrutural a função  $f : \mathcal{F}_{\{\neg, \vee\}}^{CP} \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{F}_{\{\neg, \vee\}}^{CP})$  tal que  $f(\varphi)$  é o conjunto das subfórmulas de  $\varphi$ .  
 d) Prove que: para todo  $\varphi \in \mathcal{F}_{\{\neg, \vee\}}^{CP}$ , se  $\vee$  não ocorre em  $\varphi$ , então  $\#f(\varphi) - 1$  é o número de ocorrências de  $\neg$  em  $\varphi$ .

**2.12** Seja  $\Gamma$  o subconjunto de  $\mathcal{F}^{CP}$  dado pela seguinte definição indutiva determinista:

- (i) Para cada variável proposicional  $p$ ,  $p \in \Gamma$ .  
 (ii) Para cada variável proposicional  $p$ ,  $\neg p \in \Gamma$ .  
 (iii) Se  $\varphi, \psi \in \Gamma$  então  $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ .  
 a) Indique, justificando, fórmulas em  $\Gamma$ .  
 b) Enuncie o Teorema da Indução Estrutural para  $\Gamma$ .  
 c) Prove que: para todo  $\varphi \in \Gamma$ ,  $\perp$  não ocorre em  $\varphi$ .  
 d) Defina por recursão estrutural a função  $f : \Gamma \rightarrow \mathbb{N}_0$  tal que  $f(\varphi)$  é o número de ocorrências de  $\neg$  em  $\varphi$ .  
 e) Diga se  $\Gamma \subseteq \mathcal{F}_{\{\neg, \vee\}}^{CP}$  e se  $\mathcal{F}_{\{\neg, \vee\}}^{CP} \subseteq \Gamma$ .

### 3. Semântica do Cálculo Proposicional

**3.1** Sejam  $v_1$  e  $v_2$  as únicas valorações tais que

$$v_1(p) = \begin{cases} 0 & \text{se } p \in \{p_0, p_1\} \\ 1 & \text{se } p \in \mathcal{V}^{CP} - \{p_0, p_1\} \end{cases} \quad \text{e} \quad v_2(p) = \begin{cases} 1 & \text{se } p \in \{p_1, p_3\} \\ 0 & \text{se } p \in \mathcal{V}^{CP} - \{p_1, p_3\} \end{cases}.$$

Considere as fórmulas:  $\varphi_1 = (p_2 \vee (\neg p_1 \wedge p_3))$ ;  $\varphi_2 = (p_2 \vee p_0) \wedge \neg(p_2 \wedge p_0)$ ;  $\varphi_3 = (p_1 \rightarrow ((p_5 \leftrightarrow p_3) \vee \perp))$ . Calcule os valores lógicos das fórmulas  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$  e  $\varphi_3$  para as valorações  $v_1$  e  $v_2$ .

**3.2** Considere as fórmulas:  $\varphi_1 = \neg p_3 \wedge (\neg p_1 \vee p_2)$ ;  $\varphi_2 = (\neg p_3 \vee \neg p_1) \leftrightarrow (p_1 \rightarrow p_2)$ ;  $\varphi_3 = \neg p_3 \rightarrow (p_1 \wedge \neg p_2)$ .

- Para cada um dos conjuntos  $\{\varphi_1, \varphi_2\}$  e  $\{\varphi_2, \varphi_3\}$ , dê exemplo de uma valoração que atribua o valor lógico 1 a todos os seus elementos.
- Mostre que não existem valorações que, em simultâneo, atribuam o valor lógico 1 a  $\varphi_1$  e  $\varphi_3$ .

**3.3** Seja  $v$  uma valoração. Quais das seguintes proposições são verdadeiras?

- $v((p_3 \rightarrow p_2) \rightarrow p_1) = 0$  e  $v(p_2) = 0$  é uma condição suficiente para  $v(p_3) = 0$ .
- Uma condição necessária para  $v(p_1 \rightarrow (p_2 \rightarrow p_3)) = 0$  é  $v(p_1) = 1$  e  $v(p_3) = 0$ .
- Uma condição necessária e suficiente para  $v(p_1 \wedge \neg p_3) = 1$  é  $v((p_3 \rightarrow (p_1 \rightarrow p_3)) = 1$ .

**3.4** De entre as seguintes fórmulas, indique as tautologias e as contradições.

- |  |  |
|--|--|
| a) $(p_1 \rightarrow \perp) \vee p_1$                | b) $(p_1 \rightarrow p_2) \leftrightarrow (\neg p_2 \rightarrow \neg p_1)$ |
| c) $\neg(p_1 \wedge p_2) \rightarrow (p_1 \vee p_2)$ | d) $(p_1 \vee \neg p_1) \rightarrow (p_1 \wedge \neg p_1)$                 |

**3.5** Das seguintes proposições, indique as verdadeiras. Justifique.

- $\models \varphi \wedge \psi$  se e só se  $\models \varphi$  e  $\models \psi$ .
- Se  $\models \varphi \vee \psi$ , então  $\models \varphi$  ou  $\models \psi$ .
- Se  $\models \varphi$  ou  $\models \psi$ , então  $\models \varphi \vee \psi$ .
- Se  $\models \varphi \leftrightarrow \psi$  e  $\not\models \psi$ , então  $\not\models \varphi$ .

**3.6** Seja  $\varphi = (\neg p_2 \rightarrow \perp) \wedge p_1$ .

- Dê exemplo de:
  - uma valoração  $v$  tal que  $v(\varphi) = v(\varphi[p_0 \wedge p_3/p_2])$ ;
  - uma valoração  $v$  tal que  $v(\varphi) \neq v(\varphi[p_0 \wedge p_3/p_2])$ .
- Seja  $\psi$  uma fórmula. Indique uma condição suficiente para que uma valoração  $v$  satisfaça  $v(\varphi) = v(\varphi[\psi/p_2])$ . A condição que indicou é necessária?

**3.7** Considere o conjunto  $\mathcal{F}_{\{\vee, \wedge\}}^{CP}$  das fórmulas cujos conectivos estão no conjunto  $\{\vee, \wedge\}$ .

- a) Enuncie o teorema de indução estrutural para  $\mathcal{F}_{\{\vee, \wedge\}}^{CP}$ .
- b) Seja  $v$  a valoração que a cada variável proposicional atribui o valor lógico 0. Mostre que  $v(\varphi) = 0$  para qualquer  $\varphi \in \mathcal{F}_{\{\vee, \wedge\}}^{CP}$ .
- c) Existem tautologias no conjunto  $\mathcal{F}_{\{\vee, \wedge\}}^{CP}$ ? Justifique.

**3.8** Para cada uma das seguintes fórmulas, encontre uma fórmula que lhe seja logicamente equivalente e que envolva apenas conectivos no conjunto  $\{\neg, \vee\}$ .

- a)  $(p_0 \wedge p_2) \rightarrow p_3$ .
- b)  $p_1 \vee (p_2 \rightarrow \perp)$ .
- c)  $\neg p_4 \leftrightarrow p_2$ .
- d)  $(p_1 \vee p_2) \rightarrow \neg(p_1 \wedge \perp)$ .

**3.9** Defina, por recursão estrutural em fórmulas, uma função  $f : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathcal{F}_{\{\neg, \vee\}}^{CP}$  que a cada fórmula  $\varphi$  faça corresponder uma fórmula  $f(\varphi)$  logicamente equivalente a  $\varphi$ .

**3.10** Investigue se os conjuntos de conectivos  $\{\vee, \wedge\}$  e  $\{\neg, \vee, \wedge\}$  são ou não completos.

**3.11** Calcule formas normais conjuntivas e disjuntivas logicamente equivalentes a cada uma das seguintes fórmulas:

- a)  $\neg p_0$ .
- b)  $p_1 \wedge (p_2 \wedge p_3)$ .
- c)  $(p_1 \vee p_0) \vee \neg(p_2 \vee p_0)$ .
- d)  $(p_1 \rightarrow \perp)$ .
- e)  $(p_1 \vee p_0) \wedge (p_2 \vee (p_1 \wedge p_0))$ .
- f)  $(p_1 \rightarrow p_2) \leftrightarrow (\neg p_2 \rightarrow \neg p_1)$ .

**3.12** Considere que  $\varphi$  e  $\psi$  são fórmulas cujo conjunto de variáveis é  $\{p_1, p_2\}$  e  $\{p_1, p_2, p_3\}$ , respetivamente, e que têm as seguintes tabelas de verdade:

$p_1$	$p_2$	$\varphi$
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

e

$p_1$	$p_2$	$p_3$	$\psi$
1	1	1	0
1	1	0	1
1	0	1	1
1	0	0	0
0	1	1	0
0	1	0	1
0	0	1	1
0	0	0	1

Determine FND's e FNC's logicamente equivalentes a cada uma das fórmulas.

**3.13** Será que existem outros conectivos binários para além de  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\rightarrow$ , e  $\leftrightarrow$ ? Para responder a esta questão, adotemos esta definição: um conectivo binário é uma função de tipo  $\{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$ .

- a) Quantos conectivos binários existem?
- b) Para cada conectivo binário  $f : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$ , escreva  $f$  como uma tabela de verdade, e “traduza” essa tabela de verdade como uma FND.
- c) Conclua que  $\{\neg, \wedge, \vee\}$  permaneceria um conjunto completo de conectivos, mesmo se tivéssemos adoptado no Cálculo Proposicional outros conectivos binários.

**3.14** Nenhum dos conectivos  $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$  é completo (i.e. constitui, por si só, um conjunto completo de conectivos). No entanto, existem conectivos binários completos.

Considere-se a extensão do conjunto das fórmulas proposicionais  $\mathcal{F}^{CP}$  com o conectivo binário  $\uparrow$  (conhecido como *seta de Sheffer* ou *nand*), determinado pela função booleana  $f_{\uparrow}$  t.q.  $f_{\uparrow}(1, 1) = 0$ ,  $f_{\uparrow}(1, 0) = 1$ ,  $f_{\uparrow}(0, 1) = 1$  e  $f_{\uparrow}(0, 0) = 1$ . Mais precisamente:

- i) acrescente-se ao alfabeto do Cálculo Proposicional a letra  $\uparrow$ ;
  - ii) considere-se a definição indutiva de  $\mathcal{F}^{CP}$  (sobre este alfabeto estendido) com uma nova regra: se  $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$ , então  $(\varphi \uparrow \psi) \in \mathcal{F}^{CP}$ ;
  - iii) à definição de valoração  $v$ , acrescente-se a condição  $v(\varphi \uparrow \psi) = f_{\uparrow}(v(\varphi), v(\psi))$ , para todo  $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$ .
- a) Encontre fórmulas  $\varphi, \psi$  logicamente equivalentes a  $p_0 \uparrow p_1$  e tais que i)  $\varphi$  é FND; ii)  $\psi$  é FNC.
  - b) Mostre que, para todo  $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$ : i)  $\varphi \uparrow \psi \Leftrightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$ ; ii)  $\neg\varphi \Leftrightarrow \varphi \uparrow \varphi$ .
  - c) Dê exemplo de tautologias e de contradições onde o único conectivo usado seja  $\uparrow$ .
  - d) O conjunto  $\{\uparrow\}$  é completo? Justifique.

**3.15** De entre os seguintes conjuntos de fórmulas, indique os que são consistentes e os que são inconsistentes.

- a)  $\{p_0 \wedge p_2, p_1 \rightarrow \neg p_3, p_1 \vee p_2\}$ .
- b)  $\{p_0 \vee \neg p_1, p_1, p_0 \leftrightarrow (p_2 \vee p_3)\}$ .
- c)  $\mathcal{F}^{CP}$ .
- d)  $\mathcal{F}_{\{\vee, \wedge\}}^{CP}$ .

**3.16** Sejam  $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}^{CP}$ . Diga, justificando, se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações.

- a) Se  $\Gamma \cup \Delta$  é consistente, então  $\Gamma$  e  $\Delta$  são conjuntos consistentes.
- b) Se  $\Gamma$  e  $\Delta$  são conjuntos consistentes, então  $\Gamma \cup \Delta$  é consistente.
- c) Se  $\Gamma$  é consistente e  $\varphi \in \Gamma$ , então  $\neg\varphi \notin \Gamma$ .
- d) Se  $\Gamma$  contém uma contradição, então  $\Gamma$  é inconsistente.

**3.17** Este exercício ilustra um método para decidir se uma fórmula do Cálculo Proposicional é uma tautologia (que está na base do chamado método da *resolução*), assente em formas normais conjuntivas e na análise da consistência de conjuntos de fórmulas.

Considere as fórmulas

$$\varphi = (p_3 \rightarrow (p_1 \vee p_2)) \vee \neg(\neg p_1 \rightarrow p_2),$$

$$\psi = \neg p_2 \wedge p_3 \wedge (\neg p_3 \vee \neg p_1 \vee p_2) \wedge (p_2 \vee p_1).$$

- a) Observe que  $\psi$  é uma FNC e mostre que  $\psi$  é logicamente equivalente a  $\neg\varphi$ .
- b) Observe que para toda a valoração  $v$ ,  $v(\psi) = 1$  sse  $v$  satisfaz  $\{\neg p_2, p_3, \neg p_3 \vee \neg p_1 \vee p_2, p_2 \vee p_1\}$ .
- c) Mostre que  $\{\neg p_2, p_3, \neg p_3 \vee \neg p_1 \vee p_2, p_2 \vee p_1\}$  é inconsistente e diga se  $\psi$  é uma contradição.
- d) Diga se  $\varphi$  é uma tautologia.
- e) Aplique a sequência de passos anterior, considerando

$$\varphi = (p_2 \rightarrow p_1) \rightarrow (\neg p_2 \wedge p_3), \quad \psi = (p_1 \vee \neg p_2) \wedge (p_2 \vee \neg p_3).$$



**3.18** Diga, justificando, se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações:

- a)  $p_3 \vee p_0, \neg p_0 \models p_3$ .      b)  $p_0 \vee \neg p_1, p_1 \vee p_2 \models p_0 \vee p_2$ .  
c)  $\neg p_2 \rightarrow (p_1 \vee p_3), \neg p_2 \models \neg p_1$ .      d) para todo  $\varphi, \psi, \sigma \in \mathcal{F}^{CP}$ ,  $\neg\psi, \psi \rightarrow \sigma \models \sigma \vee \varphi$ .

**3.19** Sejam  $\varphi, \psi, \sigma \in \mathcal{F}^{CP}$  e  $\Gamma$  um conjunto de fórmulas. Demonstre que:

- a)  $\varphi \vee \psi, \neg\varphi \vee \sigma \models \psi \vee \sigma$ .      b)  $\models \varphi \rightarrow \psi$  se e só se  $\varphi \models \psi$ .  
c)  $\Gamma \models \varphi \vee \psi$  se e só se  $\Gamma, \neg\varphi \models \psi$ .      d)  $\Gamma$  é inconsistente se e só se  $\Gamma \models \perp$ .

**3.20** Considere as seguintes afirmações:

- Se há vida em Marte, então Zuzarte gosta de tarte.
  - Zuzarte é um marciano ou não gosta de tarte.
  - Zuzarte não é um marciano, mas há vida em Marte.
- a) Exprima as afirmações anteriores através de fórmulas do Cálculo Proposicional, utilizando variáveis proposicionais para representar as frases atômicas.
- b) Mostre que as três afirmações acima não podem ser simultaneamente verdadeiras.

**3.21** Considere as seguintes afirmações:

- Se a porta do cofre foi arrombada, então: o inspetor Heitor desvenda o crime ou o segurança Bragança é culpado.
  - O segurança Bragança não é culpado se e só se: a porta do cofre não foi arrombada e o inspetor Heitor desvenda o crime.
  - Não é verdade que: o segurança Bragança não é culpado ou a porta do cofre foi arrombada.
- a) Exprima as afirmações anteriores através de fórmulas do Cálculo Proposicional, utilizando variáveis proposicionais para representar as frases atômicas.
- b) Admitindo que todas as afirmações são verdadeiras, podemos concluir que o inspetor Heitor desvenda o crime? Justifique.

**3.22** O Carlos, o João e o Manuel, suspeitos de um crime, fizeram os seguintes depoimentos, respetivamente:

- O João é culpado, mas o Manuel é inocente.
  - Se o Carlos é culpado, o Manuel também o é.
  - Eu estou inocente, mas um dos outros dois é culpado.
- a) Os três depoimentos são consistentes?
- b) Algum dos depoimentos é consequência dos outros dois?
- c) Supondo os três réus inocentes, quem mentiu?
- d) Supondo que todos disseram a verdade, quem é culpado?
- e) Supondo que os inocentes disseram a verdade e que os culpados mentiram, quem é culpado?

**4. Dedução Natural para o Cálculo Proposicional**

- 4.1** a) Indique uma derivação em DNP cuja conclusão seja  $p_0 \wedge p_1$  e cuja única hipótese não cancelada seja  $p_1 \wedge p_0$ .  
 b) Indique duas derivações distintas em DNP de conclusão  $p_0 \rightarrow (p_1 \rightarrow (p_0 \vee p_1))$  e sem hipóteses por cancelar.  
 c) Indique as subderivações de cada uma das derivações que apresentou em **a)** e em **b)**.

**4.2** Sejam  $\varphi, \psi, \sigma \in \mathcal{F}^{CP}$ . Encontre demonstrações em DNP das fórmulas abaixo indicadas.

- a)**  $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\varphi \vee \psi)$ .      **b)**  $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \sigma))$ .  
**c)**  $\varphi \rightarrow \varphi$ .      **d)**  $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ .  
**e)**  $\varphi \leftrightarrow \neg\neg\varphi$ .      **f)**  $((\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)) \leftrightarrow (\varphi \leftrightarrow \psi)$ .  
**g)**  $(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\psi \vee \varphi)$ .      **h)**  $(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \neg(\neg\varphi \vee \neg\psi)$ .

**4.3** Mostre que:

- a)**  $p_0 \rightarrow p_1, \neg p_1 \vdash \neg p_0$ .  
**b)**  $p_0 \rightarrow p_1, p_1 \rightarrow p_2, p_2 \rightarrow p_0 \vdash ((p_0 \leftrightarrow p_1) \wedge (p_1 \leftrightarrow p_2)) \wedge (p_0 \leftrightarrow p_2)$ .  
**c)**  $\{p_0 \vee p_1, \neg p_0 \wedge \neg p_1\}$  é sintaticamente inconsistente.

**4.4** Represente o raciocínio que se segue através de uma relação de consequência sintática e construa uma derivação em DNP que prove a validade dessa relação: O Tiago disse: “Vou almoçar ao McDonald’s ou à Pizza Hut”. E, acrescentou: “Se comer no McDonald’s, fico mal disposto e não vou ao cinema”. Nesse dia, a Joana encontrou o Tiago no cinema e conclui: “O Tiago foi almoçar à Pizza Hut”.

**4.5** Mostre que o conjunto das fórmulas do Cálculo Proposicional referidas na alínea **a)** do exercício **3.20** é sintaticamente inconsistente.

**4.6** Demonstre as seguintes proposições, para todo  $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$  e  $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$ .

- a)**  $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$  sse  $\Gamma \vdash \varphi$  e  $\Gamma \vdash \psi$ .      **b)**  $\Gamma \vdash \varphi$  sse  $\Gamma, \neg\varphi \vdash \perp$ .  
**c)**  $\Gamma \vdash \perp$  se e só se  $\Gamma \vdash p_0 \wedge \neg p_0$ .      **d)** Se  $\Gamma, \neg\varphi \vdash \varphi$ , então  $\Gamma \vdash \varphi$ .

**4.7** Sejam  $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$  fórmulas. A fórmula  $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi$  é chamada a *Lei de Peirce*. Mostre que a Lei de Peirce é um teorema de DNP. (Sugestão: tenha em atenção a resolução da alínea **d)** do exercício anterior.)

**4.8** Sejam  $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$  e  $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$ . Mostre que:

- a)**  $(p_0 \vee p_1) \rightarrow (p_0 \wedge p_1)$  não é um teorema de DNP.  
**b)**  $p_0 \vee p_1 \not\vdash p_0 \wedge p_1$ .  
**c)**  $\{p_0 \vee p_1, \neg p_0 \wedge p_1\}$  é sintaticamente consistente.  
**d)**  $\Gamma \vdash \varphi$  e  $\Gamma \vdash \neg\varphi$  se e só se  $\Gamma$  é semanticamente inconsistente.  
**e)** Se  $\Gamma, \varphi \vdash \psi$  e  $\varphi$  é uma tautologia, então  $\Gamma \vdash \psi$ .

(Sugestão: aplique o Teorema da Correção e/ou o Teorema da Completude.)

## 5. Sintaxe do Cálculo de Predicados

**5.1** Seja  $L = (\{0, f, g\}, \{R\}, \mathcal{N})$  o tipo de linguagem tal que  $\mathcal{N}(0) = 0$ ,  $\mathcal{N}(f) = 1$ ,  $\mathcal{N}(g) = 2$ ,  $\mathcal{N}(R) = 2$ .

- a) Explícite a definição indutiva do conjunto dos  $L$ -termos.
- b) Indique quais das seguintes sequências de símbolos constituem  $L$ -termos:
  - i)  $0$ .                      ii)  $f(0)$ .                      iii)  $f(1)$ .
  - iv)  $g(f(x_1, x_0), x_0)$ .    v)  $g(x_0, f(x_1))$ .           vi)  $R(x_0, x_1)$ .
- c) Calcule o conjunto das variáveis de cada um dos seguintes  $L$ -termos:
  - i)  $0$ .                      ii)  $g(x_1, f(x_1))$ .
  - iii)  $g(x_1, x_2)$ .           iv)  $g(x_1, g(x_2, x_3))$ .
- d) Para cada um dos  $L$ -termos  $t$  da alínea anterior, calcule  $\text{subt}(t)$ .
- e) Para cada um dos  $L$ -termos  $t$  da alínea c), calcule  $t[g(x_0, 0)/x_1]$ .

**5.2** Seja  $L$  o tipo de linguagem definido no exercício 5.1.

- a) Enuncie o teorema de indução estrutural para o conjunto dos  $L$ -termos.
- b) Defina, por recursão estrutural em  $L$ -termos, funções  $r, h : \mathcal{T}_L \rightarrow \mathbb{N}_0$  que a cada  $L$ -termo  $t$  fazem corresponder o número de ocorrências de variáveis em  $t$  e o número de ocorrências de símbolos de função em  $t$ , respetivamente.
- c) Dê exemplos de  $L$ -termos  $t_1$  e  $t_2$  tais que  $\#\text{VAR}(t_1) = r(t_1)$  e  $\#\text{VAR}(t_2) < r(t_2)$ .
- d) Demonstre que, para todo o  $L$ -termo  $t$ ,  $\#\text{VAR}(t) \leq r(t)$ .

**5.3** Seja  $L$  um tipo de linguagem. Demonstre que: para todo o  $L$ -termo  $t$ ,  $\text{VAR}(t) \subseteq \text{subt}(t)$ .

**5.4** Escreva as seguintes afirmações como fórmulas para um tipo de linguagem apropriado.

- a) Todo aquele que é persistente aprende Lógica.
  - b) Quem quer vai, quem não quer manda.
  - c) Nem todos os pássaros voam.
  - d) Se toda a gente consegue, também o João consegue.
  - e) Para todo o número natural que é maior do que 6, o seu dobro é maior do que 12.
  - f) Quaisquer dois conjuntos que têm os mesmos elementos são iguais.
  - g) Existe um inteiro positivo menor do que qualquer inteiro positivo.
  - h) Todo o inteiro positivo é menor do que algum inteiro positivo.
  - i) Não há barbeiro que barbeie precisamente aqueles homens que não se barbeiam a si próprios.
-

**5.5** Seja  $L = (\{0, -\}, \{P, <\}, \mathcal{N})$  em que  $\mathcal{N}(0) = 0$ ,  $\mathcal{N}(P) = 1$  e  $\mathcal{N}(-) = \mathcal{N}(<) = 2$ .

- a) Dê exemplos de  $L$ -termos e indique sequências de formação desses termos.
- b) Dê exemplos de  $L$ -fórmulas atômicas.
- c) Indique sequências de formação de cada uma das seguintes  $L$ -fórmulas.
  - i)  $x_2 - 0 < x_1$ .
  - ii)  $\exists x_0 \forall x_1 (x_1 - x_0 < 0)$ .
  - iii)  $\forall x_2 (\exists x_0 (x_0 < x_1) \rightarrow \exists x_1 (x_2 < x_1 - x_0)) \wedge P(x_2)$ .
  - iv)  $\forall x_0 (x_0 < x_1) \vee \exists x_1 (x_1 < x_0)$ .
- d) Para cada  $L$ -fórmula da alínea anterior, calcule o conjunto das suas subfórmulas.
- e) Calcule os conjuntos de variáveis livres e de variáveis ligadas de cada uma das fórmulas da alínea c).
- f) A proposição “Para toda a  $L$ -fórmula  $\varphi$ ,  $\text{LIV}(\varphi) \cap \text{LIG}(\varphi) = \emptyset$ ” é verdadeira?

**5.6** Para cada uma das fórmulas  $\varphi$  do exercício 5.5 c), calcule  $\varphi[x_2 - x_0/x_1]$ .

**5.7** Considere o tipo de linguagem  $L$  do exercício 5.5. Para cada uma das fórmulas  $\varphi$  do exercício 5.5 c), indique quais das seguintes proposições são verdadeiras.

- a) A variável  $x_1$  é substituível pelo  $L$ -termo  $0$  em  $\varphi$ .
- b) A variável  $x_1$  é substituível pelo  $L$ -termo  $x_2$  em  $\varphi$ .
- c) A variável  $x_2$  é substituível por qualquer  $L$ -termo em  $\varphi$ .
- d) Toda a variável é substituível pelo  $L$ -termo  $x_1 - x_3$  em  $\varphi$ .

**5.8** Seja  $L$  um tipo de linguagem.

- a) Defina, por recursão estrutural em  $L$ -fórmulas, a função  $\text{SUBFA} : \mathcal{F}_L \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{F}_L)$  que a cada  $L$ -fórmula  $\varphi$  faz corresponder o conjunto das subfórmulas atômicas de  $\varphi$ .
- b) Sejam  $\varphi$  uma  $L$ -fórmula e  $x$  uma variável. Demonstre que: se  $x \notin \text{LIV}(\psi)$  para todo o  $\psi \in \text{SUBFA}(\varphi)$ , então  $x \notin \text{LIV}(\varphi)$ .

**6. Semântica do Cálculo de Predicados**

**6.1** Considere o tipo de linguagem  $L_{Arit}$ , seja  $E_{Arit}$  a estrutura usual para este tipo de linguagem e sejam  $a_1$  e  $a_2$  atribuições em  $\mathbb{N}_0$  tais que  $a_1(x_i) = 0$ , para todo  $i \in \mathbb{N}_0$ , e  $a_2(x_i) = i$ , para todo  $i \in \mathbb{N}_0$ .

- a) Para cada um dos  $L_{Arit}$ -termos  $t$  que se seguem, calcule  $t[a_1]_{E_{Arit}}$  e  $t[a_2]_{E_{Arit}}$ .
  - i)  $0$ .                      ii)  $x_5$ .                      iii)  $s(x_2)$ .
  - iv)  $+(s(0), x_3)$ .    v)  $s(0 \times (x_2 \times x_3))$ .    vi)  $(s(0) + x_7) \times s(x_1 + x_2)$ .
- b) Para cada uma das  $L_{Arit}$ -fórmulas  $\varphi$  que se seguem, calcule  $\varphi[a_1]_{E_{Arit}}$  e  $\varphi[a_2]_{E_{Arit}}$ .
  - i)  $\perp$ .                      iii)  $s(x_1) < (x_1 + 0)$ .    v)  $(x_1 < x_2) \rightarrow (s(x_1) < s(x_2))$ .
  - ii)  $x_1 = x_2$ .    iv)  $\neg(x_1 = x_1)$ .                      vi)  $(x_1 < x_2) \rightarrow ((x_1 + x_3) < (x_2 + x_3))$ .
- c) Para cada uma das fórmulas  $\varphi$  da alínea anterior, indique, para cada  $n \in \mathbb{N}_0$ , o valor de  $\varphi[a_1(\frac{x_1}{n})]_{E_{Arit}}$  e  $\varphi[a_2(\frac{x_1}{n})]_{E_{Arit}}$ .
- d) Para cada uma das fórmulas  $\varphi$  da alínea b), indique  $(\forall x_1 \varphi)[a_1]_{E_{Arit}}$ ,  $(\forall x_1 \varphi)[a_2]_{E_{Arit}}$ ,  $(\exists x_1 \varphi)[a_1]_{E_{Arit}}$  e  $(\exists x_1 \varphi)[a_2]_{E_{Arit}}$ .
- e) Indique se alguma das fórmulas da alínea b) é válida para a estrutura  $E_{Arit}$ .
- f) Indique se alguma das fórmulas da alínea b) é universalmente válida.

**6.2** Seja  $L = (\{0, \times\}, \{\leq\}, \mathcal{N})$  o tipo de linguagem em que  $\mathcal{N}(0) = 0$ ,  $\mathcal{N}(\times) = 2$  e  $\mathcal{N}(\leq) = 2$ . Seja  $E = (\mathbb{N}_0, \overline{\phantom{x}})$  a  $L$ -estrutura tal que: a interpretação  $\overline{0}$  de  $0$  é o número inteiro *zero*; a interpretação  $\overline{\times}$  de  $\times$  é a função *multiplicação* em inteiros; e a interpretação  $\overline{\leq}$  de  $\leq$  é a relação *menor ou igual do que* em inteiros. Seja  $a : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{N}_0$  a atribuição, em  $E$ , tal que, para todo  $i \in \mathbb{N}_0$ ,  $a(x_i) = 2i$ .

- a) Para cada um dos seguintes  $L$ -termos  $t$ , calcule  $t[a]_E$ .
  - i)  $0$ .                      ii)  $x_2$ .
  - iii)  $x_1 \times x_2$ .                      iv)  $(0 \times (x_2 \times x_1))$ .
- b) Sejam  $\varphi$  e  $\psi$  as  $L$ -fórmulas  $0 \leq x_1$  e  $x_2 \leq x_2 \times x_1$ , respetivamente. Discuta se as fórmulas  $\varphi$ ,  $\forall x_2 \psi$  e  $\forall x_1 \forall x_2 (\varphi \wedge \psi)$  são satisfeitas na estrutura  $E$  para a atribuição  $a$ . Discuta ainda a validade em  $E$  e a validade universal destas fórmulas.

**6.3** Diga, justificando, quais das seguintes proposições são verdadeiras, para quaisquer fórmulas  $\varphi$  e  $\psi$  num tipo de linguagem  $L$ , para qualquer variável  $x$ .

- a)  $\exists x \varphi \Leftrightarrow \forall x \varphi$ ;                      b)  $\models \exists x (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\exists x \varphi \wedge \exists x \psi)$ ;
- c)  $\models (\exists x \varphi \wedge \exists x \psi) \rightarrow \exists x (\varphi \wedge \psi)$ ;                      d)  $\models (\forall x \varphi \vee \forall x \psi) \rightarrow \forall x (\varphi \vee \psi)$ ;
- e)  $\models \forall x (\varphi \vee \psi) \rightarrow (\forall x \varphi \vee \forall x \psi)$ ;                      f)  $\models \exists x \forall y \varphi \rightarrow \forall y \exists x \varphi$ ;
- g)  $\models \forall x \exists y \varphi \rightarrow \exists y \forall x \varphi$ ;                      h) Para toda a  $L$ -estrutura  $E$ ,  $E \models \varphi$  ou  $E \models \neg \varphi$ .

**6.4** Seja  $L$  o tipo de linguagem definida no exercício 6.2 e seja  $\varphi$  a  $L$ -fórmula

$$\neg((\exists x_1 (x_1 \leq 0)) \vee (x_2 \leq 0)) \rightarrow (\neg(\exists x_1 (x_1 \leq 0)) \wedge \neg(x_2 \leq 0)).$$

- a)  $\varphi$  é uma instância de uma tautologia?    b)  $\varphi$  é válida em todas as  $L$ -estruturas?

**6.5** Considere o tipo de linguagem  $L = (\{0, f\}, \{P, =\}, \mathcal{N})$  em que  $\mathcal{N}(0) = 0$ ,  $\mathcal{N}(f) = 1$ ,  $\mathcal{N}(P) = 1$  e  $\mathcal{N}(=) = 2$ , e considere a  $L$ -estrutura  $E = (\mathbb{N}_0, \bar{\cdot})$ , onde  $\bar{0}$  é o número inteiro zero,  $\bar{f} : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$  é a função definida por  $\bar{f}(n) = n + 3$ , para todo  $n \in \mathbb{N}_0$ ,  $\bar{P} = \{n \in \mathbb{N}_0 \mid n \text{ é múltiplo de } 3\}$  e  $\equiv$  é a relação de *igualdade* em  $\mathbb{N}_0$ , i.e.,  $\equiv = \{(n, m) \in \mathbb{N}_0^2 \mid n = m\}$ .

- a) Seja  $a$  a atribuição em  $E$  tal que, para todo  $i \in \mathbb{N}_0$ ,  $a(x_i) = i$ . Calcule:
  - (i)  $f(f(x_4))[a]$
  - (ii)  $(\exists x_1 f(x_1) = 0) \vee \neg P(f(x_2))[a]$
- b) Seja  $\varphi$  a  $L$ -fórmula  $(f(x_1) = x_2 \wedge P(x_1)) \rightarrow P(x_2)$ . Prove que:
  - (i)  $\varphi$  é válida em  $E$ ;
  - (ii)  $\varphi$  não é universalmente válida.
- c) Indique uma  $L$ -fórmula  $\psi$  que seja uma instância da fórmula proposicional  $p_0 \leftrightarrow p_0$ . A  $L$ -fórmula  $\psi$  que indicou é universalmente válida?
- d) Para cada uma das seguintes afirmações, indique uma  $L$ -fórmula que a represente:
  - (i) Existe um número que é múltiplo de 3 mas não é zero.
  - (ii) Para todo o número que seja múltiplo de 3, esse número mais 3 é ainda múltiplo de 3.

**6.6** Seja  $L$  o tipo de linguagem  $(\{f\}, \{=\}, \mathcal{N})$  em que  $\mathcal{N}(f) = 1$  e  $\mathcal{N}(=) = 2$ . Seja ainda  $E = (\mathbb{Z}, \bar{\cdot})$  a  $L$ -estrutura tal que  $\bar{f} : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  é a função definida por  $\bar{f}(n) = |n|$ , para todo  $n \in \mathbb{Z}$ , e  $\equiv$  é a relação de *igualdade* em  $\mathbb{Z}$ , i.e.,  $\equiv = \{(n, m) \in \mathbb{Z}^2 \mid n = m\}$ .

- a) Indique  $L$ -fórmulas  $\varphi$  e  $\psi$  que representem, respetivamente, as afirmações “A função  $f$  é sobrejetiva” e “A função  $f$  é injetiva”.
- b) Verifique se as  $L$ -fórmulas  $\varphi$  e  $\psi$  que indicou na alínea anterior são válidas em  $E$ .
- c) Para cada uma das  $L$ -fórmulas que indicou, dê exemplo, caso seja válida em  $E$ , de uma  $L$ -estrutura na qual a  $L$ -fórmula não seja válida, e, caso não seja válida em  $E$ , de uma  $L$ -estrutura na qual a  $L$ -fórmula seja válida.

**6.7** Seja  $L$  o tipo de linguagem que contém apenas o símbolo de relação unário  $R$ . Justificando, diga se cada um dos seguintes conjuntos é semanticamente consistente:

- a)  $\{\exists x_0 R(x_0), \exists x_0 \neg R(x_0)\}$ ;
- b)  $\{R(x_1), \forall x_0 \neg R(x_0)\}$ .

**6.8** Sejam  $L$  um tipo de linguagem,  $\varphi$  uma  $L$ -fórmula e  $x$  uma variável. Mostre que  $\{\exists x \neg \varphi, \forall x \varphi\}$  é semanticamente inconsistente.

**6.9** Seja  $L = (\{c_1, c_2\}, \{R\}, \mathcal{N})$ , onde  $\mathcal{N}(c_1) = \mathcal{N}(c_2) = 0$  e  $\mathcal{N}(R) = 2$ , um tipo de linguagem. Seja  $\Gamma$  o conjunto formado pelas seguintes  $L$ -sentenças:

- $\forall x_0 R(x_0, x_0)$ ;
- $\forall x_0 \forall x_1 (R(x_0, x_1) \rightarrow R(x_1, x_0))$ ;
- $\forall x_0 \forall x_1 \forall x_2 ((R(x_0, x_1) \wedge R(x_1, x_2)) \rightarrow R(x_0, x_2))$ .

- a) Indique um modelo de  $\Gamma$ , i.e., indique uma  $L$ -estrutura que valide todas as fórmulas de  $\Gamma$ .
- b) Mostre que existem modelos de  $\Gamma \cup \{\neg R(c_1, c_2)\}$  e de  $\Gamma \cup \{R(c_1, c_2)\}$ .