

# Cours 2: preuves en logique du premier ordre

David Delahaye

Polytech' Montpellier  
[David.Delahaye@lirmm.fr](mailto:David.Delahaye@lirmm.fr)

AIGLE M1

# Logique du premier ordre

## Définitions préliminaires

- $\mathcal{V} \equiv$  ensemble de variables d'individu  $x, y$ , etc. ;
- $\mathcal{S}_{\mathcal{F}} \equiv$  ensemble de symboles de fonctions  $f, g$ , etc. ;
- $\mathcal{S}_{\mathcal{P}} \equiv$  ensemble de symboles de prédicats  $P, Q$ , etc. ;
- $\mathcal{S}_{\mathcal{F}} \cap \mathcal{S}_{\mathcal{P}} = \emptyset$  ;
- Arité  $m : \mathcal{S}_{\mathcal{F}} \cup \mathcal{S}_{\mathcal{P}} \rightarrow \mathbb{N}$ .

## Termes du premier ordre

- Plus petit ensemble  $\mathcal{T}$  t.q. :
  - ▶ Si  $x \in \mathcal{V}$  alors  $x \in \mathcal{T}$  ;
  - ▶ Si  $f \in \mathcal{S}_{\mathcal{F}}$  d'arité  $n$  et  $t_1, \dots, t_n \in \mathcal{T}$ , alors  $f(t_1, \dots, t_n) \in \mathcal{T}$ .

# Logique du premier ordre

## Définitions préliminaires

- $\mathcal{V} \equiv$  ensemble de variables d'individu  $x, y$ , etc. ;
- $\mathcal{S}_{\mathcal{F}} \equiv$  ensemble de symboles de fonctions  $f, g$ , etc. ;
- $\mathcal{S}_{\mathcal{P}} \equiv$  ensemble de symboles de prédicats  $P, Q$ , etc. ;
- $\mathcal{S}_{\mathcal{F}} \cap \mathcal{S}_{\mathcal{P}} = \emptyset$  ;
- Arité  $m : \mathcal{S}_{\mathcal{F}} \cup \mathcal{S}_{\mathcal{P}} \rightarrow \mathbb{N}$ .

## Formules du premier ordre

- Plus petit ensemble  $\mathcal{F}$  t.q. :
  - ▶ Si  $P \in \mathcal{S}_{\mathcal{P}}$  d'arité  $n$  et  $t_1, \dots, t_n \in \mathcal{T}$ , alors  $P(t_1, \dots, t_n) \in \mathcal{F}$  ;
  - ▶  $\perp, \top \in \mathcal{F}$  ;
  - ▶ Si  $\Phi \in \mathcal{F}$  alors  $\neg \Phi \in \mathcal{F}$  ;
  - ▶ Si  $\Phi, \Phi' \in \mathcal{F}$  alors  $\Phi \wedge \Phi', \Phi \vee \Phi', \Phi \Rightarrow \Phi' \in \mathcal{F}$  ;
  - ▶ Si  $x \in \mathcal{V}$  et  $\Phi \in \mathcal{F}$ , alors  $\forall x. \Phi, \exists x. \Phi \in \mathcal{F}$ .

## Logique classique

- Une formule est toujours vraie ou fausse ;
- Que je puisse en démontrer la validité ou non ;
- Logique bi-valuée (vrai, faux) ;
- Logique du « tiers exclu » :  $A \vee \neg A$ .

## Logique intuitionniste ou constructive

- Une formule est vraie, fausse, ou « on ne sait pas » ;
- Si on ne sait en démontrer la validité, alors « on ne sait pas » ;
- Logique tri-valuée d'une certaine manière ;
- Le « tiers exclu » n'est pas admis dans cette logique.

# Systèmes de preuves

## Plusieurs systèmes

- Systèmes à la Frege-Hilbert ;
- Systèmes à la Gentzen :
  - ▶ Dédution naturelle ;
  - ▶ Calcul des séquents.

## Adéquation vis-à-vis de la sémantique

- Correction et complétude par rapport à la sémantique ;
- Correction : si je trouve une preuve de  $P$  alors  $P$  est vraie ;
- Complétude : si  $P$  est vraie alors il existe une preuve de  $P$  ;
- Preuve  $\equiv$  moyen syntaxique de vérifier la validité d'une formule.

# Calcul des séquents intuitionniste

## Règles

$$\frac{}{\Gamma, A \vdash A} \text{ ax}$$

$$\frac{\Gamma, A, A \vdash B}{\Gamma, A \vdash B} \text{ cont}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma, A \Rightarrow B \vdash C} \Rightarrow_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \Rightarrow B} \Rightarrow_{\text{right}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma, A \Leftrightarrow B \vdash C} \Leftrightarrow_{\text{left1}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash B \quad \Gamma, A \vdash C}{\Gamma, A \Leftrightarrow B \vdash C} \Leftrightarrow_{\text{left2}}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash B \quad \Gamma, B \vdash A}{\Gamma \vdash A \Leftrightarrow B} \Leftrightarrow_{\text{right}}$$

# Calcul des séquents intuitionniste

## Règles

$$\frac{\Gamma, A, B \vdash C}{\Gamma, A \wedge B \vdash C} \wedge_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B} \wedge_{\text{right}}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash C \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma, A \vee B \vdash C} \vee_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B} \vee_{\text{right1}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B} \vee_{\text{right2}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma, \neg A \vdash B} \neg_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \perp}{\Gamma \vdash \neg A} \neg_{\text{right}}$$

$$\frac{}{\Gamma, \perp \vdash A} \perp_{\text{left}}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \top} \top_{\text{right}}$$

# Calcul des séquents intuitionniste

## Règles

$$\frac{\Gamma, A(t) \vdash B}{\Gamma, \forall x A(x) \vdash B} \forall_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A(x)}{\Gamma \vdash \forall x A(x)} \forall_{\text{right}}, x \notin \Gamma$$

$$\frac{\Gamma, A(x) \vdash B}{\Gamma, \exists x.A(x) \vdash B} \exists_{\text{left}}, x \notin \Gamma, B$$

$$\frac{\Gamma \vdash A(t)}{\Gamma \vdash \exists x.A(x)} \exists_{\text{right}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash B} \text{cut}$$



# Calcul des séquents classique

## Règles

$$\frac{\Gamma, A(t) \vdash B}{\Gamma, \forall x A(x) \vdash B} \forall_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A(x)}{\Gamma \vdash \forall x A(x)} \forall_{\text{right}}, x \notin \Gamma$$

$$\frac{\Gamma, A(x) \vdash B}{\Gamma, \exists x.A(x) \vdash B} \exists_{\text{left}}, x \notin \Gamma, B$$

$$\frac{\Gamma \vdash A(t)}{\Gamma \vdash \exists x.A(x)} \exists_{\text{right}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash B} \text{cut}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \neg\neg A}{\Gamma \vdash A} \text{em}$$

# Calcul des séquents classique (LK)

## Règles

$$\frac{}{\Gamma, A \vdash \Delta, A} \text{ ax}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash B} \text{ cut}$$

$$\frac{\Gamma, A, A \vdash \Delta}{\Gamma, A \vdash \Delta} \text{ cont}_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A, A}{\Gamma \vdash \Delta, A} \text{ cont}_{\text{right}}$$

# Calcul des séquents classique (LK)

## Règles

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \Rightarrow B \vdash \Delta} \Rightarrow_{\text{left}} \qquad \frac{\Gamma, A \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \Rightarrow B} \Rightarrow_{\text{right}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \Leftrightarrow B \vdash \Delta} \Leftrightarrow_{\text{left1}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, B \quad \Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma, A \Leftrightarrow B \vdash \Delta} \Leftrightarrow_{\text{left2}}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta, B \quad \Gamma, B \vdash \Delta, A}{\Gamma \vdash \Delta, A \Leftrightarrow B} \Leftrightarrow_{\text{right}}$$

# Calcul des séquents classique (LK)

## Règles

$$\frac{\Gamma, A, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \wedge B \vdash \Delta} \wedge_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \wedge B} \wedge_{\text{right}}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \vee B \vdash \Delta} \vee_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \vee B} \vee_{\text{right}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A}{\Gamma, \neg A \vdash \Delta} \neg_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \Delta, \neg A} \neg_{\text{right}}$$

$$\frac{}{\Gamma, \perp \vdash \Delta} \perp_{\text{left}}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \Delta, \top} \top_{\text{right}}$$

# Calcul des séquents classique (LK)

## Règles

$$\frac{\Gamma, A(t) \vdash \Delta}{\Gamma, \forall x. A(x) \vdash \Delta} \forall_{\text{left}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A(x)}{\Gamma \vdash \Delta, \forall x. A(x)} \forall_{\text{right}}, x \notin \Gamma, \Delta$$

$$\frac{\Gamma, A(x) \vdash \Delta}{\Gamma, \exists x. A(x) \vdash \Delta} \exists_{\text{left}}, x \notin \Gamma, \Delta$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A(t)}{\Gamma \vdash \Delta, \exists x. A(x)} \exists_{\text{right}}$$



# Exemple de preuve au premier ordre dans LJ/LK

## Négation et quantificateurs

$$\frac{\frac{\frac{\overline{P(x) \vdash P(x)}}{P(x) \vdash \exists x.P(x)} \exists_{\text{right}}}{\neg(\exists x.P(x)), P(x) \vdash \perp} \neg_{\text{left}}}{\neg(\exists x.P(x)) \vdash \neg P(x)} \neg_{\text{right}}}{\neg(\exists x.P(x)) \vdash \forall x.\neg P(x)} \forall_{\text{right}}}{\vdash \neg(\exists x.P(x)) \rightarrow \forall x.\neg P(x)} \Rightarrow_{\text{right}}$$

# Logiques classique/intuitionniste

## Sémantique du « il existe »

- En logique classique :  $\exists x.P(x) \equiv$  il existe  $n$  termes  $t_1, t_2, \dots, t_n$  tels que  $P(t_1) \vee P(t_2) \vee \dots \vee P(t_n)$  est vraie (théorème de Herbrand) ;
- En logique intuitionniste :  $\exists x.P(x) \equiv$  il existe un terme  $t$  tel que  $P(t)$  est vraie.

On doit contruire un témoin  $t$  qui vérifie  $P$  et en avoir l'intuition.  
D'où le nom de logique « intuitionniste » ou « constructive ».

## Logique classique

- La logique classique est une logique assez « exotique » ;
- On peut démontrer une formule  $\exists x.P(x)$  sans jamais montrer un seul témoin qui fonctionne (c'est-à-dire qui vérifie  $P$ ) !
- De ce fait, c'est plus facile de faire des preuves en logique classique qu'en logique intuitionniste.



# Exemple de preuve en logique classique

## Petit théorème mathématique

- Il existe  $a$  et  $b$  irrationnels tels que  $a^b$  est rationnel ;
- Preuve :
  - ▶ Utilisation du tiers exclu :  $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$  est rationnel ou non ; deux cas :
    - ★ Si  $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$  est rationnel, alors le théorème est vrai ;
    - ★ Si  $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$  est irrationnel, alors  $(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2$ , qui est rationnel.

## En logique intuitionniste

- Le théorème est vrai en logique intuitionniste ;
- Mais on doit montrer un  $a$  et  $b$  qui fonctionnent ;
- Plusieurs pages de théorie des nombres non triviales !

# Un autre exemple de preuve en logique classique

## Preuve dans LK

Démontrer :  $\exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)$ .

Cette formule est-elle valide ?

# Un autre exemple de preuve en logique classique

## Preuve dans LK

$$\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\Gamma \vdash P(a), P(a) \wedge P(b)}{\Gamma \vdash P(a), P(b)} \text{ ax} \quad \frac{\Gamma \vdash P(b), P(a) \wedge P(b)}{\Gamma \vdash P(b), P(a) \wedge P(b)} \text{ ax}}{\Gamma \vdash P(a), P(b), P(a) \wedge P(b)} \wedge_{\text{right}}}{\Gamma \vdash P(a), P(b) \vdash P(a) \wedge P(b), P(a) \wedge P(b)} \Rightarrow_{\text{right}}}{\frac{\Gamma \vdash P(a), P(b) \vdash P(a) \wedge P(b), P(a) \wedge P(b)}{\Gamma \vdash P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), P(b) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \exists_{\text{right}}}{\frac{\Gamma \vdash P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)}{\Gamma \vdash P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \Rightarrow_{\text{right}}}{\frac{\Gamma \vdash P(a) \vdash P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)}{\Gamma \vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b), \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \exists_{\text{right}}}{\Gamma \vdash \exists x.P(x) \Rightarrow P(a) \wedge P(b)} \text{cont}_{\text{right}}$$

# Exercices en logique propositionnelle

## Propositions à démontrer

- ❶  $A \Rightarrow B \Rightarrow A$
- ❷  $(A \Rightarrow B \Rightarrow C) \Rightarrow (A \Rightarrow B) \Rightarrow A \Rightarrow C$
- ❸  $A \wedge B \Rightarrow B$
- ❹  $B \Rightarrow A \vee B$
- ❺  $(A \vee B) \Rightarrow (A \Rightarrow C) \Rightarrow (B \Rightarrow C) \Rightarrow C$
- ❻  $A \Rightarrow \perp \Rightarrow \neg A$
- ❼  $\perp \Rightarrow A$
- ❽  $(A \Leftrightarrow B) \Rightarrow A \Rightarrow B$
- ❾  $(A \Leftrightarrow B) \Rightarrow B \Rightarrow A$
- ❿  $(A \Rightarrow B) \Rightarrow (B \Rightarrow A) \Rightarrow (A \Leftrightarrow B)$

# Exercices en logique du premier ordre

## Propositions à démontrer

- ❶  $\forall x.P(x) \Rightarrow \exists y.P(y) \vee Q(y)$
- ❷  $(\exists x.P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow (\exists x.P(x)) \vee (\exists x.Q(x))$
- ❸  $(\forall x.P(x)) \wedge (\forall x.Q(x)) \Rightarrow \forall x.P(x) \wedge Q(x)$
- ❹  $(\forall x.P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow (\forall x.P(x)) \wedge (\forall x.Q(x))$
- ❺  $(\forall x.\neg P(x)) \Rightarrow \neg(\exists x.P(x))$
- ❻  $\neg(\forall x.P(x)) \Rightarrow \exists x.\neg P(x)$

## Utilisation du logiciel Edukera

- URL : <http://edukera.com/> ;
- Création de compte : email, Google+, ou Facebook ;
- Code pour accéder aux exercices : « 9A01FB4 ».

## Démo