

# Quiz #4) Newt's Law

1.

$$\frac{dT}{dt} \propto T - T_{in} \rightarrow \frac{dT}{dt} = k(T - T_{in})$$

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 100)$$

$$\int \frac{dT}{T - 100} = k \int dt$$

$$\ln(T - 100) = kt + C$$

$$T = 100 + ce^{kt}$$

$$T = 100 - 80e^{kt}$$

$$90 = 100 - 80e^{-0.025318t}$$

$$\frac{100 - 90}{80} = e^{-0.025318t}$$

$$t = 82 \text{ sec}$$

\* time taken to reach 900

$$T_m = 100$$

$$T(0) = 20 \leftarrow$$

$$T(1) = 22 \leftarrow$$

$$20 = 100 + (e^{1k})C$$

$$20 = 100 + C$$

$$C = -80$$

$$22 = 100 - 80e^{k(1)}$$

$$\frac{100 - 22}{80} = e^{k}$$

$$k = -0.025318$$


$$98 = 100 - 80e^{-0.025318t}$$

$$\frac{100 - 98}{80} = e^{-0.025318t}$$

$$t = 145.7 \text{ sec}$$

\* time taken to reach 900

2. (Quiz 4) Mixture



$$\frac{dA}{dt} = R_{in} - R_{out} \quad A(0) = 0$$

$$\frac{dA}{dt} = 6(5) - 4(A) = 30 - 4A$$

$$\int \frac{dA}{30 - 4A} = \int dt$$

$$\frac{\ln(30 - 4A)}{-4} = t + C$$

$$\ln(30 - 4A) = -4t + C$$

$$30 - 4A = Ke^{-4t}$$

$$A = \frac{30}{4} + Ke^{-4t}$$

$$1 = \frac{30}{4} + K$$

$$K = -6.5$$

$$A = \frac{30}{4} - 6.5e^{-4t}$$

$$A = 7.5 - 6.5e^{-4(30)}$$

$$A = 7.5 \text{ lb/gal}$$

$$100 + (6 - 4)t = 90 \text{ gal total}$$

$$160 \text{ gal}$$

for 30 minutes

$$16 \text{ lb of salt} = 120 \text{ lb}$$

$$100 + 2t = 200$$

↑ tank overflow

$$t = 50 \text{ minutes}$$

$$A = 7.5$$

$$150 \text{ lb of salt}$$

↑ under tank overflow

(continues on next page)

Quiz 4

poor musician

After 2  
hours

$$t=120 \quad A=.75$$

$$100 + 2 + = 340 \text{ gal}$$

$$340 \times .75 = 255 \text{ lb of salt}$$

# Quiz 4 New mutation

3

$$a(0) = 40$$

$$b(0) = 50$$

$$\frac{dx}{dt} \propto \overset{A}{\left[40 - \frac{2}{1+2}x\right]} \overset{B}{\left[50 - \frac{1}{1+2}x\right]}$$

$$x(5) = 10$$

$$x(0) = 0$$

$$\frac{dx}{dt} = k \left[40 - \frac{2}{3}x\right] \left[50 - \frac{1}{3}x\right]$$

$$= k \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{1}{3}\right) [60-x][150-x]$$

$$\frac{dx}{dt} = k [60-x][150-x]$$

$$\int \frac{dx}{(60-x)(150-x)} = \int k dt$$

$$k t + C_1$$

$$\int \left( \frac{A}{60-x} + \frac{B}{150-x} \right) dx = k t$$

continued

802 4 (Now mustafa)

#3

$$-\frac{1}{90} \ln(60-x) + \frac{1}{90} \ln(150-x) = k+t$$

$$-\ln(60-x) + \ln(150-x) = k+tC$$

$$\ln\left[\frac{150-x}{60-x}\right] = k+tC$$

$$\frac{150-x}{60-x} = Ce^{kt} \rightarrow X(0)=0$$

$$\rightarrow \frac{150}{60} = C \rightarrow \frac{5}{2} = C$$

$$X(5)=10$$

$$\frac{150-10}{60-10} = \frac{5}{2} e^{k(5)}$$

$$\frac{140}{50} = \frac{5}{2} e^{k(5)}$$

$$\frac{\ln(1.12)}{5} = k$$

$$k = .02267$$

Quiz 1) Noor  
mustafa  
#3

$$\frac{150 - x}{80 - x} = \frac{5}{2} e^{-0.02267 t}$$

How much is formed in 20 minutes?

$$\frac{150 - x}{80 - x} = N$$

$$150 - 80N = x(1 - N)$$

$$150 - x = 80N - Nx$$

$$x = \frac{150 - 80N}{1 - N}$$

$$N = 3.934137803$$

$$x = \frac{150 - 80N}{1 - N}$$

→ 29.33  
grams

Ques 4) need mustn't fu)

3) find limiting amount

$$0 = K [60 - x][150 - x]$$


$$x = 60, 150$$

Only 60 g of C because

you can only use up to 60 g for C.

---

How much chemical A is remaining after a long time?



0g A      30g B  $\rightarrow$  remaining

