

# Réactions d'oxydo-réduction

## Au programme

### Savoirs

- ◇ Oxydants et réducteurs, réactions d'oxydoréduction, nombre d'oxydation, dismutation et médiamutation.
- ◇ Exemples d'oxydants et de réducteurs minéraux usuels : nom, nature et formule des ions thiosulfate, permanganate, hypochlorite, du peroxyde d'hydrogène.
- ◇ Pile, tension à vide, potentiel d'électrode, formule de NERNST, électrodes de référence.
- ◇ Diagrammes de prédominance ou d'existence.
- ◇ Aspect thermodynamique des réactions d'oxydo-réduction.

### Savoir-faire

- ◇ Relier la position d'un élément dans le tableau périodique et le caractère oxydant ou réducteur du corps simple correspondant.
- ◇ Prévoir les nombres d'oxydation extrêmes d'un élément à partir de sa position dans le tableau périodique.
- ◇ Identifier l'oxydant et le réducteur d'un couple.
- ◇ Décrire le fonctionnement d'une pile à partir d'une mesure de tension à vide ou à partir des potentiels d'électrode.
- ◇ Utiliser les diagrammes de prédominance ou d'existence pour prévoir les espèces incompatibles ou la nature des espèces majoritaires.
- ◇ Prévoir qualitativement ou quantitativement le caractère thermodynamiquement favorisé ou défavorisé d'une réaction d'oxydo-réduction à partir des potentiels standard des couples.



## Sommaire

<b>I Oxydants et réducteurs</b>	<b>3</b>
I/A Couples oxydo-réducteurs	3
I/B Nombre d'oxydation	4
<b>II Distribution des espèces d'un couple</b>	<b>5</b>
II/A Potentiel d'un couple	5
II/B Diagramme de prédominance	7
<b>III Réactions entre couples</b>	<b>7</b>
III/A Réactions d'oxydoréduction	7
III/B Sens de réaction	8
III/C Cas particuliers	9
III/D Calcul de constantes d'équilibre	10
<b>IV Piles électrochimiques</b>	<b>10</b>
IV/A Présentation	10
IV/B Potentiel d'électrode	11
IV/C Charge totale d'une pile	11

## Résultats phares



### Liste des définitions

Définition 6.1 : Oxydant et réducteur . . . . .	3
Définition 6.2 : Nombre d'oxydation . . . . .	4
Définition 6.3 : Force des oxydants et des réducteurs . . . . .	7
Définition 6.4 : Réaction d'oxydoréduction . . . . .	7
Définition 6.5 : Dismutation . . . . .	9
Définition 6.6 : Médiamutation . . . . .	9
Définition 6.7 : Piles électrochimiques . . . . .	10
Définition 6.8 : Force électromotrice . . . . .	11
Définition 6.9 : Électrodes de référence . . . . .	11



### Liste des propriétés

Propriété 6.1 : Nombre d'oxydation . . . . .	5
Propriété 6.2 : Formule de NERNST . . . . .	5
Propriété 6.3 : Potentiel en solution . . . . .	10
Propriété 6.4 : Quantité d'électricité d'une pile . . . . .	11



### Liste des applications

Application 6.1 : Équilibrage d'une équation redox . . . . .	3
Application 6.2 : Calculs de nombres d'oxydation . . . . .	5
Application 6.3 : Calcul de potentiels . . . . .	6
Application 6.4 : Stabilité par dismutation ou médiamutation . . . . .	9
Application 6.5 : Calcul de constante d'équilibre . . . . .	10
Application 6.6 : Calcul de la f.e.m. de la pile DANIELL . . . . .	11
Application 6.7 : Charge de la pile DANIELL . . . . .	11



### Liste des remarques

Remarque 6.1 : Autour des demi-équations . . . . .	4
Remarque 6.2 : Autour de la formule de NERNST . . . . .	6



### Liste des exemples

Exemple 6.1 : Couples simples . . . . .	3
Exemple 6.2 : Couples à connaître . . . . .	4
Exemple 6.3 : Illustrations simples du nombre d'oxydation . . . . .	4
Exemple 6.4 : Nombre d'oxydation et structure électronique . . . . .	5
Exemple 6.5 : Équilibrage d'équations redox . . . . .	8
Exemple 6.6 : Dismutation du fer . . . . .	9



### Liste des points importants

Important 6.1 : Règles de calcul nombre d'oxydation . . . . .	5
Important 6.2 : Diagramme de prédominance . . . . .	7
Important 6.3 : Sens spontané de réaction . . . . .	8



### Liste des erreurs communes

Attention 6.1 : Utilisation des diagrammes redox . . . . .	7
Attention 6.2 : Réactions d'oxydoréduction . . . . .	8
Attention 6.3 : Calcul de constantes . . . . .	10



# I Oxydants et réducteurs

## I/A Couples oxydo-réducteurs

### Définition 6.1 : Oxydant et réducteur

- ◇ Un **oxydant** est une espèce chimique capable de \_\_\_\_\_ un ou plusieurs électrons ;
- ◇ Un **réducteur** est une espèce chimique capable de \_\_\_\_\_ un ou plusieurs électrons ;
- ◇ Un **couple** oxydant-réducteur, noté Ox/Red<sup>1</sup>, est associé *via* la **demi-équation** électronique :

### Exemple 6.1 : Couples simples

- ◇ Le cuivre :  $\text{Cu}^{2+}$  \_\_\_\_\_, Cu \_\_\_\_\_
- ◇ Le zinc : \_\_\_\_\_ De même
- ◇ Le dichlore :  $\text{Cl}_2$  \_\_\_\_\_,  $\text{Cl}^-$  \_\_\_\_\_


### Outils 6.1 : Équilibrer une demi-réaction

Pour équilibrer une demi-équation en **milieu acide** :

- 1 Équilibrer les éléments **autres que O ou H** ;
- 2 Équilibrer l'**oxygène avec**  $\text{H}_2\text{O}_{(l)}$  ;
- 3 Équilibrer les **hydrogènes avec**  $\text{H}_{(aq)}^+$  ;
- 4 Équilibrer les **charges avec**  $e^-$

Si le **milieu est basique**, écrire une équation avec des  $\text{H}_{(aq)}^+$  n'est pas représentatif de la réalité :

- 5 On **remplace**  $\text{H}^+$  par  $\text{HO}^-$  grâce à l'autoprotolyse de l'eau :



### Application 6.1 : Équilibrage d'une équation rédox

- 1) Équilibrer la demi-équation du couple  $\text{MnO}_4^-_{(aq)}/\text{MnO}_{2(s)}$  en milieu basique.
- 2) Équilibrer la demi-équation du couple  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}_{(aq)}/\text{Cr}^{3+}_{(aq)}$

- 
- 1) 

<div>1</div>	=	
<div>2</div>	=	
<div>3</div>	=	
<div>4</div>	=	milieu acide
<div>5</div>	=	milieu basique

1. On fera donc particulièrement au sens qui n'est pas « redox » !

2) <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span>	=	
<span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">2</span>	=	
<span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">3</span>	=	
<span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">4</span>	=	milieu acide
<span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">5</span>	=	milieu basique



### Exemple 6.2 : Couples à connaître

◇ Ions tétrathionate/ion thiosulfate	◇ Peroxyde d'hydrogène <sup>2</sup> /eau
◇ Ion permanganate/ion manganèse II	◇ dioxygène/eau
◇ Ion hypochlorite/ion chlorure	◇ dioxygène/péroxyde d'hydrogène
◇ Ion dichromate/ion chrome III	◇ Eau/dihydrogène



### Remarque 6.1 : Autour des demi-équations

- ◇ Ces demi-équation ne représentent pas de réelles transformations chimiques, on ne peut faire intervenir explicitement des électrons libres : ce sont des outils.
- ◇ Comme pour les réactions acide-base, certaines espèces sont à la fois oxydante et réductrice.

## I/B Nombre d'oxydation



### Définition 6.2 : Nombre d'oxydation

Le **nombre d'oxydation**<sup>3</sup> d'un **atome dans une molécule** est le nombre de charges élémentaires  $e$  qu'il porterait si on venait à répartir les électrons des liaisons aux **plus électronégatifs**. Il s'écrit en chiffres romains.



### Exemple 6.3 : Illustrations simples du nombre d'oxydation

◇ Oxygène dans dioxygène :	◇ Oxygène et hydrogène dans l'eau :
----------------------------	-------------------------------------

2. Aussi appelée « eau oxygénée »

3. Aussi **degré d'oxydation**

**Propriété 6.1 : Nombre d'oxydation**

- Le nombre d'oxydation d'un élément est lié à **sa structure électronique** : dans un édifice chaque élément cherche à se rapprocher de la structure des gaz nobles en remplissant ou vidant sa couche de valence, et son nombre d'oxydation est donc **borné**.
- Lors d'une **oxydation**, **n.o.**  $\nearrow$ ; lors d'une **réduction**, **n.o.**  $\searrow$ .

**Exemple 6.4 : Nombre d'oxydation et structure électronique**

- Oxygène :
- Alcalins :
- Alcalinos-terreux :
- Halogènes :
- Gaz nobles :

H							He
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar

**Important 6.1 : Règles de calcul nombre d'oxydation**

- Le n.o. d'un élément seul est égal à sa charge ;
- La somme des n.o. des éléments d'une molécule est égale à la charge de la molécule ;
- En général, dans les molécules et ions complexes,  $\text{n.o.}(\text{H}) = +\text{I}$  ;
- En général, dans les molécules et ions complexes,  $\text{n.o.}(\text{O}) = -\text{II}$  (sauf si cela met en défaut les règles précédentes).

**Application 6.2 : Calculs de nombres d'oxydation**

- |                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| ◇ Cu :               | ◇ $\text{H}_2\text{O}_2$ :      |
| ◇ $\text{Cu}^{2+}$ : | ◇ $\text{IO}_3^-$ :             |
| ◇ $\text{Fe}^{3+}$ : | ◇ $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ : |

**Transition**

Ainsi, l'équilibre entre les espèces d'un couple repose sur la capacité du milieu à recevoir ou perdre des électrons : les couples oxydant-réducteur ont donc des caractéristiques électriques.

**II Distribution des espèces d'un couple****II/A Potentiel d'un couple****Propriété 6.2 : Formule de NERNST**

Pour une demi-équation d'oxydoréduction

le potentiel électrique d'une solution à l'équilibre est donné par la formule de NERNST :

- ◇  $E$  est le potentiel, et s'exprime en \_\_\_\_\_ ;
- ◇  $E^\circ$  est le potentiel standard du couple à la température  $T$  ;
- ◇  $n$  le nombre d'électrons échangés (variation du degré d'oxydation) ;
- ◇  $R$  la constante des gaz parfaits en \_\_\_\_\_ ;
- ◇  $T$  la température en \_\_\_\_\_ ;
- ◇  $\mathcal{F}$  la constante de FARADAY, représentant la charge électrique d'une mole de protons :

D'où la forme commune :



### Remarque 6.2 : Autour de la formule de NERNST

- ◇ Faites attention au passage du logarithme en base  $e$  ( $\ln$ ) au logarithme décimal :

$$\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$$

- ◇ Le potentiel seul n'a pas de sens de manière absolue : il est défini à une constante près. Il faut donc choisir une référence arbitraire afin de fixer toutes les valeurs. On choisit pour cela le premier couple de l'eau

$$E^\circ(\text{H}_{(\text{aq})}^+/\text{H}_{2(\text{g})}) = 0 \text{ V}$$



### Application 6.3 : Calcul de potentiels

Donner les potentiels des couples suivants :

- ◇  $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}/\text{Fe}_{(\text{s})}$  :

- ◇  $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+}/\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$

- ◇  $\text{MnO}_{4(\text{aq})}^-/\text{Mn}_{(\text{aq})}^{2+}$

- ◇  $\text{H}_{(\text{s})}^+/\text{H}_{2(\text{g})}$

## II/B Diagramme de prédominance

### Important 6.2 : Diagramme de prédominance

Pour \_\_\_\_\_ on a \_\_\_\_\_

On utilisera alors une **convention de tracé** donnant la valeur de  $(a_{\text{Ox}}^\gamma)/(a_{\text{Red}}^\alpha)$  à la limite pour trouver  $E_{\text{lim}}$ , afin de tracer le diagramme de prédominance :



FIGURE 6.1 – Diagramme de prédominance générique

### Attention 6.1 : Utilisation des diagrammes redox

Ce raisonnement n'est valable **que pour un couple simple**, sans autres espèces dans la demi-réaction. À partir du moment où les protons  $\text{H}^+$  interviennent, les diagrammes seront à 2 dimensions : ce sont les **diagrammes potentiel-pH** (cf. chapitre suivant).

### Définition 6.3 : Force des oxydants et des réducteurs

Comme dans le cas des couples acide-base, on peut parler de la force d'un oxydant ou d'un réducteur selon la valeur du potentiel standard :

$E^\circ$	Oxydant	Réducteur
Élevé		
Bas		




FIGURE 6.2 – Échelle des  $E^\circ$

## III Réactions entre couples

### III/A Réactions d'oxydoréduction

#### Définition 6.4 : Réaction d'oxydoréduction

Une réaction d'oxydoréduction est une réaction de **transfert d'électrons** entre deux espèces :

- ◇ L'oxydant \_\_\_\_\_ un (des) électrons, il subit une \_\_\_\_\_ et son n.o. \_\_\_\_\_ ;
- ◇ Le réducteur \_\_\_\_\_ un (des) électrons, il subit une \_\_\_\_\_ et son n.o. \_\_\_\_\_ .

### Attention 6.2 : Réactions d'oxydoréduction

- ◇ Il n'y a jamais d'électrons dans la réaction bilan ;
- ◇ La somme des n.o. est conservée pendant une réaction redox.

### Exemple 6.5 : Équilibrage d'équations redox

- 1) Écrire et équilibrer la réaction entre  $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$  et  $\text{Cu}_{(\text{s})}$ . Les couples mis en jeu sont  $\text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+}/\text{Cu}_{(\text{s})}$  et  $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+}/\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$ .
- 2) Écrire et équilibrer la réaction entre  $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$  et  $\text{MnO}_{4(\text{aq})}^{-}$ . Les couples mis en jeu sont  $\text{MnO}_{4(\text{aq})}^{-}/\text{Mn}_{(\text{aq})}^{2+}$  et  $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+}/\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$

1)

2)

## III/B Sens de réaction

Ainsi, comme pour les réactions acide-base, on peut déterminer la stabilité de certains ions en solution, que ce soit par la superposition des diagrammes de prédominance ou par la règle du gamma sur une échelle en  $E^\circ$  :

### Important 6.3 : Sens spontané de réaction

Au cours d'une réaction d'oxydoréduction, l'**oxydant le plus fort** (de  $E^\circ$  le plus élevé) réagit avec le **réducteur le plus fort** (de  $E^\circ$  le plus faible). Cette règle schématise avec la **règle du gamma**, voir Figure 6.4.

Cela se détermine aussi avec un diagramme de prédominance. En effet, deux espèces de **domaines disjoints** vont réagir ensemble pour donner les espèces qui peuvent exister ensemble au même potentiel, voir Figure 6.3.




FIGURE 6.3 – Domaines disjoints.





FIGURE 6.4 – Échelle  $E^\circ$



## III/C Cas particuliers

## Définition 6.5 : Dismutation

Une réaction dans laquelle le **réactif** est à la fois **oxydant** et **réducteur** est appelée **dismutation**. On la schématise par la règle du gamma ci-contre, et on écrit cette réaction




## Exemple 6.6 : Dismutation du fer

C'est le cas de l'ion  $\text{Fe}^{2+}$  qui intervient dans les couples  $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$  et  $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}$  : les potentiels standard donnent

## Définition 6.6 : Médiamutation

Une réaction dans laquelle le **produit** est à la fois **oxydant** et **réducteur** est appelée **médiamutation**. On la schématise par la règle du gamma ci-contre, et on écrit cette réaction



## Application 6.4 : Stabilité par dismutation ou médiamutation

Montrer que l'eau oxygénée  $\text{H}_2\text{O}_2$  est instable et que l'eau est stable. On donne  $E^\circ(\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,78 \text{ V}$ ,  $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2) = 0,68 \text{ V}$ ,  $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$  et  $E^\circ(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2) = 0,0 \text{ V}$ .

### III/D Calcul de constantes d'équilibre

#### Propriété 6.3 : Potentiel en solution

Il y a unicité du potentiel en solution : en présence de plusieurs couples rédox dans la solution, les potentiels rédox des différents couples sont égaux à l'équilibre. On trouve ainsi la constante d'équilibre d'une réaction :

#### Attention 6.3 : Calcul de constantes

Ne vous précipitez pas avec les formules, s'il est demandé de **déterminer** il faut faire le calcul ! De même, ne vous trompez pas de sens dans la soustraction : tout dépend du sens de la réaction étudiée.

#### Application 6.5 : Calcul de constante d'équilibre

Calculer la constante de réaction entre l'eau oxygénée et l'ion permanganate.


## IV Piles électrochimiques

Par essence, les réactions d'oxydoréduction sont le siège de l'échange d'électrons : en imposant que le transfert se fasse par un circuit électrique extérieur à la solution, on pourra mettre en évidence et utiliser cette énergie en réalisant une pile.

### IV/A Présentation

#### Définition 6.7 : Piles électrochimiques

On appelle



**IV/B** Potentiel d'électrode**Définition 6.8 : Force électromotrice**

a

Application 6.6 : Calcul de la f.e.m. de la pile DANIELL

**Définition 6.9 : Électrodes de référence****IV/C** Charge totale d'une pile**Propriété 6.4 : Quantité d'électricité d'une pile**

$$Q = n\xi_{\text{eq}}\mathcal{F}$$

Application 6.7 : Charge de la pile DANIELL