

CIR₂ TD de Maths Groupes (suite)

EXERCICE 1

L'ensemble $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^\times$ est muni de sa structure naturelle de groupe produit.

Soit φ l'application $\begin{cases} \mathbb{R} \times \mathbb{R}^\times & \longrightarrow & \mathbb{R} \times \mathbb{R}^\times \\ (x, y) & \longmapsto & (\ln |y|, \text{sg}(y)e^x) \end{cases}$, où sg est l'application « signe ».

- 1) Montrer que φ est un endomorphisme de groupes de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^\times$.
- 2) Calculer $\varphi \circ \varphi$. En déduire que φ est un automorphisme de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^\times$.

EXERCICE 2

- 1) Montrer que l'application $\begin{cases} \mathbb{R}^\times & \longrightarrow & \mathbb{R}^\times \\ x & \longmapsto & \frac{x}{|x|} \end{cases}$ est un morphisme de groupes.

Déterminer son noyau et son image.

- 2) Même question avec $\begin{cases} \mathbb{C}^\times & \longrightarrow & \mathbb{C}^\times \\ z & \longmapsto & \frac{z}{|z|} \end{cases}$.

EXERCICE 3

Montrer que l'application $\begin{cases} \mathbb{C}^\times & \longrightarrow & \mathbb{R}_+^\times \times \mathbb{U} \\ z & \longmapsto & \left(|z|, \frac{z}{|z|} \right) \end{cases}$ est un isomorphisme de groupes

$\mathbb{R}_+^\times \times \mathbb{U}$ étant muni de sa structure naturelle de groupe produit.

EXERCICE 4

Soit G un groupe. On suppose que $\forall x \in G, x^2 = 1_G$

Montrer que G est commutatif.

EXERCICE 5

Soit G un groupe. Pour tout $g \in G$, notons μ_g l'application $\begin{cases} G & \longrightarrow & G \\ x & \longmapsto & gx \end{cases}$.

- 1) Montrer pour tout $g \in G$ que μ_g est une permutation de G , i.e. une bijection de G sur G . Quelle est sa réciproque ?
- 2) Montrer que l'application $\mu : \begin{cases} G & \longrightarrow & S_G \\ g & \longmapsto & \mu_g \end{cases}$ est un morphisme de groupes injectif. En déduire que G est isomorphe à un sous-groupe de S_G . Ce résultat est connu sous le nom de *théorème de Cayley*.

EXERCICE 6

- a) Soit (G, \cdot) un groupe. Montrer que la loi de composition « externe »

$$g \star x := g \cdot x \cdot g^{-1}$$

définit une action de G sur lui-même (deux choses à vérifier).

- b) Expliciter les orbites pour cette action dans le cas de $G = S_3$. Décrire également le stabilisateur d'un élément représentatif dans chaque orbite.

EXERCICE 7

- a) Déterminer le nombre de roulettes différentes à 12 secteurs que l'on peut réaliser si 2 secteurs sont bleus, 3 sont rouges et 7 sont verts.
- b) Déterminer le nombre de colliers différents que l'on peut réaliser avec 2 saphirs, 3 rubis et 7 émeraudes.

EXERCICE 8

Pour Pâques, on décide de confectionner de jolies boîtes de chocolats hexagonales contenant 7 chocolats pralinés, 6 à la liqueur et 6 à la nougatine.

On estime que deux assortiments qui ne diffèrent que par une rotation de la boîte sont « les mêmes. » On va donc considérer donc l'action du groupe de rotations

$$\mathcal{C}_6 = \langle \rho \rangle$$

sur l'ensemble X des assortiments.

- a) Numéroté les emplacements à votre guise, et donner avec cette notation la décomposition cyclique des permutations dans S_{19} correspondant à : ρ , ρ^2 et ρ^3 .

- b) Combien d'assortiments réellement différents peut-on réaliser ?

