# TD Intégrales impropres

# Exercice 1:

Déterminer si les intégrales suivantes sont convergentes, et le cas échéant calculer leur valeur :

$$1. \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t}}$$

$$3. \int_{-\infty}^{0} xe^{-x^2} dx$$

$$5. \int_2^{+\infty} \frac{1}{3^t} dt$$

$$2. \int_{1}^{+\infty} \frac{t}{(1+t^2)^2} \, dt$$

4. 
$$\int_0^{+\infty} 1 dt$$

$$6. \int_0^{+\infty} xe^{-x} \, dx$$

## Exercice 2:

Déterminer si les intégrales suivantes sont convergentes :

1. 
$$\int_0^{+\infty} \sqrt{\frac{2x+3}{5x^3+3x^2+7}} dx$$
 4.  $\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du$ 

$$4. \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du$$

7. 
$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t^3 + 3t^2 + t}} dt$$

2. 
$$\int_0^{+\infty} \frac{x-5}{x^2+4x+4} \, dx$$

$$5. \int_0^{+\infty} \frac{2 + \ln x}{x + 4} \, dx$$

8. 
$$\int_{1}^{+\infty} \ln \left( 1 + \frac{1}{x^2} \right) dx$$

3. 
$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2 + 1} dx$$

6. 
$$\int_{1}^{2} \frac{1}{t^2 - t} dt$$

#### Exercice 3:

Montrer la convergence et calculer la valeur des intégrales :

$$I_1 = \int_0^{+\infty} t^3 e^{-t} dt \; ; \; I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{1}{t\sqrt{t^2 + 1}} dt \; ; \; I_3 = \int_0^{+\infty} \frac{t \ln(t)}{(t^2 + 1)^2} dt \; ; \; I_4 = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1 + t^2)}{t^2} dt$$

#### Exercice 4:

Les intégrales généralisées suivantes sont-elles convergentes ou divergentes ?

$$\begin{split} I_1 &= \int_2^{+\infty} \ln(t) \, dt \, ; \, I_2 = \int_0^2 \ln(t) \, dt \, ; I_3 = \int_0^{+\infty} e^{-4t} dt \, ; I_4 = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt \, ; I_5 = \int_0^{+\infty} \frac{t^5}{(t^4+1)\sqrt{t}} dt \\ I_6 &= \int_0^{\pi} \ln(\sin(t)) \, dt \, ; I_7 = \int_2^{+\infty} \left(1 - \cos\left(\frac{1}{t}\right)\right) dt \, ; I_8 = \int_0^1 \sin\left(\frac{1}{t}\right) dt \, , I_9 = \int_{\frac{2}{\pi}}^{+\infty} \ln\left(\cos\left(\frac{1}{t}\right)\right) dt \end{split}$$

#### Exercice 5:

Calculer  $I = \int_{1}^{+\infty} \frac{1}{t\sqrt{t^2 + 1}} dt$  à l'aide du changement de variable  $u = \sqrt{t^2 + 1}$ 

### Exercice 6:

Etudier la convergence de l'intégrale  $I = \int_0^{+\infty} \frac{t^x + t^{2-x}}{t^3 + \sqrt{t}} dt$  selon les valeurs de  $x \in \mathbb{R}$ 

# Exercice 7:

Soit f la fonction définie sur  $[2; +\infty[$  par  $f(t) = \frac{1}{t(\ln(t))^2}$ 

- 1. Quelle est la nature de l'intégrale  $\int_2^{+\infty} f(t) dt$ ?
- 2. Déterminer le tableau de variations de f.
- 3. En déduire la nature de la série  $\sum_{n\geq 2} \frac{1}{n \ln^2(n)}$
- 4. Généraliser ce résultat en déterminant la nature de la série  $\sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{n \ln^{\beta}(n)}$ , où  $\beta>1$ .

## Exercice 8:

On note f la fonction définie pour tout réel x > 0 par  $f(x) = \frac{e^{1/x}}{x^2}$ .

On pose pour tout entier  $n \ge 1$ ,  $I_n = \int_n^{+\infty} f(x) dx$ 

- 1. Montrer que l'intégrale  $I_n$  est convergente et exprimer  $I_n$  en fonction de n.
- 2. Montrer que  $I_n \underset{n \to +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$ .
- 3. Montrer que la série  $\sum_{n\geqslant 1} f(n)$  est convergente.

# Exercice 9:

- 1. Démontrer la convergence de l'intégrale  $\int_0^1 \frac{x-1}{\ln(x)} dx$ .
- 2. Montrer que, pour tout  $x \in ]0,1[,\frac{x-1}{x} \le \ln(x) < x-1.$
- 3. Pour  $X \in ]0,1[$ , démontrer l'égalité :

$$\int_0^X \frac{x dx}{\ln(x)} = \int_0^{X^2} \frac{dx}{\ln(x)}$$

4. En déduire un encadrement de  $\int_0^X \frac{x-1}{\ln(x)} dx$  et montrer que

$$\int_0^1 \frac{x-1}{\ln(x)} dx = \ln(2)$$