

1/ Étudier la convergence et calculer éventuellement la somme de la série $[u_n]_{n \in \mathbb{N}}$ dans les cas suivants :

$u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$	$u_n = \left(\frac{n^2 - 5n + 1}{n^2 - 4n + 2}\right)^{n^2}$	$u_n = \int_n^{n+1} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}$	$u_n = \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$
$u_n = \operatorname{Arcsin} \frac{2n}{4n^2 + 1}$	$u_n = \left(\frac{n-1}{n}\right)^n$	$u_n = \frac{n!}{n^n}$	$u_n = \frac{2^n}{n^2}$
$u_n = \frac{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times (2n)}{n^n}$	$u_n = \frac{1}{n} \sin\left(\frac{4n-3}{6} \pi\right)$	$u_n = \sin\left(\frac{n^2 + n + 1}{n+1} \pi\right)$	$u_n = \frac{3 \times 6 \times 9 \times \dots \times (3n)}{n^n}$
$u_n = \sqrt{1 + \frac{(-1)^n}{n}} - 1$	$u_n = \frac{1}{n \ln(n)}$	$u_n = \sin\left(\pi \sqrt{n^2 + 1}\right)$	$u_n = \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)$
$u_n = \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$	$u_n = \frac{\sin^2 n}{n}$	$u_n = (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n}$	$u_n = \sqrt[3]{n^3 + 1} - \sqrt{n^2 + 1}$

2/ Soit $a \in \mathbb{C}$ tel que $|a| < 1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, et tout $k \leq n$, calculer $S_k = a^k + a^{k+1} + \dots + a^{n-1} + a^n$

Calculer de 2 manières la somme $S_0 + S_1 + \dots + S_n$. Montrer que $(n+1)a^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

En déduire que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} (n+1)a^n$ converge et calculer sa somme.

3/ Soit $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ le nombre d'or.

Le côté du carré C_0 est 1, celui de C_1 $\frac{1}{\varphi}$,



celui de C_2 $\frac{1}{\varphi^2}$, etc...

Calculer $\frac{1}{\varphi} + \frac{1}{\varphi^2}$.

Remarquer que cela justifie la construction.

Calculer la somme de la série $[C_n]$.

Calculer la longueur de la spirale.



4/ Soient $u_n = \frac{n!}{n^n e^{-n} \sqrt{n}}$ et $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx$

En étudiant la série de terme général $\ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$, montrer que la suite (u_n) a une limite non nulle L.

Calculer par récurrence $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx$. Montrer que $I_{n+1} < I_n < I_{n-1}$.

En déduire que la suite $\left(\frac{I_n}{I_{n+1}}\right)$ converge. Calculer L.

Étudier la série de terme général $a_n = \frac{(\ln n)^n}{n!}$.

Problème : la série harmonique alternée

a/ Pour des entiers $0 < n < p$, soit $S_{n,p} = \sum_{k=n+1}^p \frac{1}{k}$.

Encadrer $S_{n,p}$ à l'aide d'intégrales. Montrer que $\ln\left(\frac{p+1}{n+1}\right) < S(n,p) < \ln\left(\frac{p}{n}\right)$

b/ On pose $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n}$, $A_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n}$ et $B_n = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \dots + \frac{1}{2n-1}$

Écrire A_n et B_n en fonction des H_{\dots}

c/ Écrire $U_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n}$ en fonction des H_{\dots} puis en fonction des $S_{\dots,\dots}$

Encadrer U_n . En déduire que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ est convergente et calculer sa somme

d/ Encadrer de même $V_n = \left(1 + \frac{1}{3}\right) - \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{7}\right) - \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{11}\right) - \frac{1}{6} + \dots + \left(\frac{1}{4n-3} + \frac{1}{4n-1} - \frac{1}{2n}\right)$

En déduire que la série $\left(1 + \frac{1}{3}\right) - \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{7}\right) - \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{11}\right) - \frac{1}{6} + \dots$ est convergente et calculer sa

somme

e/ Étudier la série

$\left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5}\right) + \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11}\right) + \left(-\frac{1}{6} - \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{13} + \frac{1}{15} + \frac{1}{17}\right) + \left(-\frac{1}{10} - \frac{1}{12}\right) + \dots$

puis la série $\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{8} - \frac{1}{10} - \frac{1}{14}\right) + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{16} - \frac{1}{18} - \frac{1}{30}\right) + \dots$

f/ Riemann a démontré (voir document Absolue convergence, semi-convergence) qu'en changeant l'ordre des termes de la série harmonique alternée, on pouvait trouver une série convergeant vers n'importe quel réel fixé à l'avance.

Écrire le pseudo-code d'un programme étudie une telle série « permutée » convergeant vers $\pi = 3.141592654\dots$. On affichera les termes d'une somme partielle de rang suffisant pour que la somme soit approchée à 10^{-3} près

