

核准日期：2006 年 07 月 05 日
修改日期：2010 年 09 月 30 日
修改日期：2012 年 10 月 01 日
修改日期：2015 年 11 月 30 日
修改日期：2018 年 05 月 23 日
修改日期：2018 年 08 月 05 日
修改日期：2020 年 06 月 17 日
修改日期：2020 年 12 月 29 日
修改日期：2022 年 03 月 10 日
修改日期：2025 年 06 月 04 日
修改日期：2025 年 09 月 30 日

奥美拉唑肠溶胶囊说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：奥美拉唑肠溶胶囊

英文名称：Omeprazole Enteric Capsules


汉语拼音：Aomeilazuo Changrong Jiaonang

【成份】

本品主要成份为奥美拉唑。

化学名称：5-甲氧基-2-[[（4-甲氧基-3，5-二甲基-2-吡啶基）甲基]亚硫酸基]-1*H*-苯并咪唑。

化学结构式：



分子式: $C_{17}H_{19}N_3O_3S$

分子量: 345.42

【性状】

本品为胶囊剂，内容物为白色或类白色肠溶小丸或颗粒。

【适应症】

适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、应激性溃疡、反流性食管炎和卓-艾综合征（胃泌素瘤）。

【规格】

20mg

【用法用量】

口服，不可咀嚼。

1、消化性溃疡：一次 1 粒（20mg），一日 1~2 次。每日晨起吞服或早晚各 1 次，胃溃疡疗程通常为 4~8 周，十二指肠溃疡疗程通常 2~4 周。

2、反流性食管炎：一次 1~3 粒（20~60mg），一日 1~2 次。晨起吞服或早晚各 1 次，疗程通常为 4~8 周。

3、卓-艾综合征：一次 3 粒（60mg），一日 1 次，以后每日总剂量可根据病情调整为 1~6 粒（20~120mg）。若一日总剂量需超过 4 粒（80mg）时，应分为 2 次服用。

【不良反应】

本品耐受性良好，常见不良反应是腹泻、头痛、恶心、腹痛、胃肠胀气及便秘，偶见血清氨基转移酶（ALT，AST）增高、皮疹、眩晕、嗜睡、失眠等，这

些不良反应通常是轻微的，可自动消失，与剂量无关。在有些病例中可发生胃粘膜细胞增生和萎缩性胃炎；低镁血症（低镁血症也可能与低钾血症有关；严重低镁血症可能导致低钙血症）；髌部、腕部或脊柱骨折；艰难梭菌相关性腹泻。

【禁忌】

对本品过敏者、严重肾功能不全者及婴幼儿禁用。

【注意事项】

1、治疗胃溃疡时，应首先排除溃疡型胃癌的可能，因用本品治疗可减轻其症状，从而延误治疗。

2、肝肾功能不全者慎用。

3、本品为肠溶胶囊，服用时注意不要嚼碎，以免药物在胃内过早释放而影响疗效。

4、艰难梭菌相关性腹泻

已发表的观察性研究表明，质子泵抑制剂（PPI）治疗可能会增加艰难梭菌相关性腹泻的风险，尤其是住院患者。如果腹泻不改善，应考虑该诊断。

5、与氯吡格雷的相互作用

应避免本品与氯吡格雷联合使用。氯吡格雷是一种前体药物，其活性代谢产物抑制血小板聚集。与奥美拉唑等药物联合用药时，后者抑制 CYP2C19 活性，可影响氯吡格雷代谢为活性代谢产物。80mg 奥美拉唑与氯吡格雷联合使用，可降低氯吡格雷的药理活性，即使两者相隔 12 小时给药。当使用本品时，应考虑使用其他药物进行抗血小板治疗（见【药物相互作用】）。

6、骨折

多项已发表的观察性研究表明，质子泵抑制剂（PPI）治疗可能增加骨质疏

松相关骨折（髌骨、腕骨或脊柱）的风险。接受高剂量（定义为每日多次给药）和长期（1 年或更久）PPI 治疗的患者，骨折风险增加。患者应根据医疗情况使用最低剂量和最短疗程的 PPI 治疗。对于有骨质疏松相关骨折风险的患者，应根据相关治疗指南处理。

7、低镁血症

在接受质子泵抑制剂（PPI）治疗至少 3 个月（绝大多数治疗 1 年后）的患者中，罕见无症状和有症状的低镁血症病例报告。严重不良事件包括手足抽搐、心律失常和癫痫发作。对于大多数患者，纠正低镁血症需补镁并停用 PPI。

预期需延长 PPI 治疗或有合并用药如地高辛或可能导致低镁血症的药物（如利尿剂），需要考虑定期监测血镁浓度。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

虽然本品在动物实验中无致畸作用，但孕妇一般应不用，哺乳期妇女也应慎用。

【儿童用药】

尚无儿童用药经验，婴幼儿禁用。

【老年用药】

尚不明确。

【药物相互作用】

本品可延缓经肝脏代谢药物在体内的消除，如安定、苯妥英钠、华法令、硝苯啶等，当本品和上述药物一起使用时，应减少后者的用量。

氯吡格雷：健康受试者中的研究结果显示，氯吡格雷（300mg 负荷剂量 /75mg 日维持剂量）和奥美拉唑（每日 80mg 口服）之间的药代动力学（PK）

/药效学 (PD) 相互作用，导致氯吡格雷活性代谢产物的暴露量平均下降 46%，并导致血小板聚集的最大抑制作用 (ADP 诱导) 平均下降 16%。关于奥美拉唑和氯吡格雷 PK/PD 相互作用在重大心血管事件的临床意义，观察性研究和临床研究有不一致的数据报告。应避免同时使用奥美拉唑和氯吡格雷。

【药物过量】

尚不明确。

【药理毒理】

质子泵抑制剂。本品为脂溶性弱碱性药物，易浓集于酸性环境中，因此口服后可特异地分布于胃黏膜壁细胞的分泌小管中，并在此高酸环境下转化为亚磺酰胺的活性形式，然后通过二硫键与壁细胞分泌膜中的 H^+, K^+ -ATP 酶（又称质子泵）的巯基不可逆性的结合，生成亚磺酰胺与质子泵的复合物，从而抑制该酶活性，阻断胃酸分泌的最后步骤，因此本品对各种原因引起的胃酸分泌具有强而持久的抑制作用。

【药代动力学】

口服本品后，经小肠吸收，1 小时内起效，0.5 ~ 3.5 小时血药浓度达峰值，作用持续 24 小时以上，可分布到肝、肾、胃、十二指肠、甲状腺等组织，且易透过胎盘。通常单剂量生物利用度约 35%，多剂量生物利用度增至约 60%，血浆蛋白结合率为 95% ~ 96%，血浆半衰期为 0.5 ~ 1 小时，慢性肝病患者为 3 小时。本品在体内经肝脏微粒体细胞色素 P450 氧化酶系统代谢，代谢物约 80% 经尿排泄，其余由胆汁分泌后从粪便排泄。

【贮藏】

遮光，密封，在干燥处 (10~30℃) 保存。

【包装】

药用塑料瓶装（内装干燥剂）。每瓶 3 粒；每瓶 7 粒；每瓶 14 粒；每瓶 28 粒。

铝塑泡罩包装。**每板 4 粒**，每盒 1 板；每板 4 粒，每盒 2 板；每板 4 粒，每盒 3 板；每板 4 粒，每盒 4 板；每板 4 粒，每盒 5 板；**每板 5 粒**，每盒 1 板；每板 5 粒，每盒 2 板；每板 5 粒，每盒 3 板；每板 5 粒，每盒 4 板；每板 5 粒，每盒 5 板；**每板 6 粒**，每盒 1 板；每板 6 粒，每盒 2 板；每板 6 粒，每盒 3 板；每板 6 粒，每盒 4 板；每板 6 粒，每盒 5 板；**每板 7 粒**，每盒 1 板；每板 7 粒，每盒 2 板；每板 7 粒，每盒 3 板；每板 7 粒，每盒 4 板；每板 7 粒，每盒 5 板；**每板 8 粒**，每盒 1 板；每板 8 粒，每盒 2 板；每板 8 粒，每盒 3 板；每板 8 粒，每盒 4 板；每板 8 粒，每盒 5 板；**每板 9 粒**，每盒 1 板；每板 9 粒，每盒 2 板；每板 9 粒，每盒 3 板；每板 9 粒，每盒 4 板；每板 9 粒，每盒 5 板；**每板 10 粒**，每盒 1 板；每板 10 粒，每盒 2 板；每板 10 粒，每盒 3 板；每板 10 粒，每盒 4 板；每板 10 粒，每盒 5 板；**每板 11 粒**，每盒 1 板；每板 11 粒，每盒 2 板；每板 11 粒，每盒 3 板；每板 11 粒，每盒 4 板；每板 11 粒，每盒 5 板；**每板 12 粒**，每盒 1 板；每板 12 粒，每盒 2 板；每板 12 粒，每盒 3 板；每板 12 粒，每盒 4 板；每板 12 粒，每盒 5 板；**每板 13 粒**，每盒 1 板；每板 13 粒，每盒 2 板；每板 13 粒，每盒 3 板；每板 13 粒，每盒 4 板；每板 13 粒，每盒 5 板；**每板 14 粒**，每盒 1 板；每板 14 粒，每盒 2 板；每板 14 粒，每盒 3 板；每板 14 粒，每盒 4 板；每板 14 粒，每盒 5 板；**每板 15 粒**，每盒 1 板；每板 15 粒，每盒 2 板；每板 15 粒，每盒 3 板；每板 15 粒，每盒 4 板；每板 15 粒，每盒 5 板；**每板 16 粒**，每盒 1 板；每板 16 粒，每盒 2 板；每板 16 粒，每盒 3

板；每板 16 粒，每盒 4 板；每板 16 粒，每盒 5 板。

【有效期】

24 个月。

【执行标准】

《中国药典》2025 年版二部

【批准文号】

国药准字 H20066724

【药品上市许可持有人】

企业名称：珠海润都制药股份有限公司

企业地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号

邮政编码：519041

电话号码：0756-7630088 0756-7630122

传真号码：0756-7630678 0756-7630123

不良反应反馈：电话：13702329078 邮箱：ywjj@rdpharma.cn

网 址：<http://www.rdpharma.cn>

【生产企业】

企业名称：珠海润都制药股份有限公司

生产地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号

邮政编码：519041

电话号码：0756-7630088 0756-7630122

传真号码：0756-7630678 0756-7630123

不良反应反馈：电话：13702329078 邮箱：ywjj@rdpharma.cn

网 址: <http://www.rdpharma.cn>

030467-12-01