

## Variables Aleatorias

Definición 1: Una variable aleatoria (v.a.) es una función que transforma los resultados del espacio muestral asociado a un experimento en números.

Observación 1: Las variables aleatorias se denotan por letras mayúsculas tales como  $X$ ,  $Y$  y  $Z$ , y sus valores por las mismas letras pero minúsculas:  $x$ ,  $y$ ,  $z$ .

Definición 2: Las variables aleatorias pueden ser de dos tipos: Discretas y Continuas. Una variable aleatoria discreta es aquella que solo puede tomar valores enteros. Una variable aleatoria continua es aquella cuyos resultados pertenecen a uno o más conjuntos de los reales.

Definición 3: Llamaremos función de probabilidad o función de cuantía de la v.a. discreta  $X$ , a  $P(X = x)$  o bien a  $p(x)$  si satisface las siguientes dos condiciones:

- ✓  $P(X = x) \geq 0, \forall x \in R_X$
- ✓  $\sum_{i=1}^n P(X = x) = 1$

Definición 4: Llamaremos función de densidad de la v.a. continua  $X$ , a  $f(x)$ , si satisface las siguientes dos condiciones:

- ✓  $f(x) \geq 0, \forall x \in R_X$
- ✓  $\int_{R_X} f(x)dx = 1$

Definición 5: Llamaremos función de distribución acumulada (f.d.a.) a la probabilidad de que  $X$  sea menor o igual que  $x$  y la denotaremos por  $F(x)$ . Formalmente,


$$F(x) := P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i), \text{ Si } X \text{ es v.a. discreta.}$$

Y

$$F(x) := P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(u)du, \text{ Si } U \text{ es una v.a. continua.}$$

### Algunas Propiedades de $F(x)$ , cuando $X$ es v.a. discreta

1.  $0 \leq F(x) \leq 1$
2.  $P(X > x) = 1 - F(x)$
3.  $P(X = x) = F(x) - F(x - 1)$
4.  $P(x_i \leq X \leq x_j) = F(x_j) - F(x_{i-1})$



### Algunas Propiedades de $F(x)$ , cuando $X$ es v.a. continua

1.  $0 \leq F(x) \leq 1$
2.  $P(X > x) = 1 - F(x)$
3.  $P(X = x) = 0$
4.  $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx$
5.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$  y  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
6.  $\frac{\partial}{\partial x} F(x) = f(x)$

Definición 6: Llamaremos Esperanza de una variable aleatoria  $X$  al promedio o media de ella y la denotaremos por  $E(X)$ . Formalmente, está definida por:

- ✓  $E(X) = \sum_{i=1}^n x \cdot P(X = x)$ , si  $X$  es v.a.d.
- ✓  $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x)dx$ , si  $X$  es v.a.c.

### Propiedades de $E(X)$

Consideremos  $c$  constante:

- ✓  $E(c) = c$
- ✓  $E(X + c) = E(X) + c$
- ✓  $E(X \cdot c) = c \cdot E(X)$
- ✓  $E(g(X) + h(X)) = E(g(X)) + E(h(X))$


Donde

- ✓  $E(g(X)) = \sum_{i=1}^n g(x) \cdot P(X = x)$ , si  $X$  es v.a.d.
- ✓  $E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \cdot f(x)dx$ , si  $X$  es v.a.c.

Definición 7: Llamaremos Varianza de la variable aleatoria  $X$  a  $V(X)$  o  $\text{Var}(X)$  que está definida por:

$$V(X) = E[(X - E(X))^2]$$

Observación: Se puede probar que  $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$



### Propiedades de $V(X)$

Consideremos  $c$  constante:

- ✓  $V(c) = 0$
- ✓  $V(X + c) = V(X)$
- ✓  $V(X \cdot c) = c^2 \cdot V(X)$
- ✓  $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$ , si  $X$  e  $Y$  son independientes.

### Ejemplo caso discreto

Un experimento consiste en lanzar al aire tres veces una moneda. Sea la variable aleatoria:  $X$  = "número de caras que se obtienen".

Obtenga:

- a) Distribución de probabilidad de  $X$ . Grafique.
- b) Función de distribución acumulada (f.d.a.) de  $X$ . Representación gráfica.
- c) Media, varianza y desviación estándar de  $X$ .
- d) Probabilidad de que salgan a lo sumo dos caras.
- e) Probabilidad de que salgan al menos dos caras.

Desarrollo:


- a) Espacio muestral:  $\Omega = \{(c,c,c), (c,c,s), (c,s,c), (s,c,c), (c,s,s), (s,c,s), (s,s,c), (s,s,s)\}$   
El recorrido de  $X$  está dado por:  $R_X: \{0, 1, 2, 3\}$


$$\text{Luego, } P(X = 0) = \frac{1}{8} \quad P(X = 1) = \frac{3}{8} \quad P(X = 2) = \frac{3}{8} \quad P(X = 3) = \frac{1}{8}$$

Así, la función de probabilidad está dada por:

$X = x_i$	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$1/8$	$3/8$	$3/8$	$1/8$

Y su representación gráfica es:





b) La función de distribución:  $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i) = \sum_{x_i \leq x} p_i$

$$x < 0 \quad F(x) = P(X \leq x) = P(\emptyset) = 0$$


$$0 \leq x < 1 \quad F(x) = P(X \leq x) = P(X = 0) = 1/8$$

$$1 \leq x < 2 \quad F(x) = P(X \leq x) = P(X < 2) = P(X = 0) + P(X = 1) = 1/8 + 3/8 = 4/8$$

$$2 \leq x < 3 \quad F(x) = P(X \leq x) = P(X < 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 1/8 + 3/8 + 3/8 = 7/8$$

$$x = 3 \quad F(x) = P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 1$$

$$x > 3 \quad F(x) = P(X \leq x) = P(\Omega) = 1$$



$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1/8 & 0 \leq x < 1 \\ 4/8 & 1 \leq x < 2 \\ 7/8 & 2 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

$$F(0) = P(X \leq 0) = P(X = 0) = 1/8$$

$$F(1) = P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{4}{8}$$

$$F(2) = P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 7/8$$


$$F(3) = P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 1$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$E(X^2) = \sum_{i=1}^n x^2 * P(X = x) = 0^2 * \frac{1}{8} + 1^2 * \frac{3}{8} + 2^2 * \frac{3}{8} + 3^2 * \frac{1}{8} = \frac{24}{8} = 3$$

Luego

$$V(X) = 3 - (1,5)^2 = 0,75$$



c) Media, varianza y desviación típica de X

$$\text{Media: } \alpha_1 = \mu_x = E(X) = \sum_{i=1}^4 x_i \cdot P(X = x_i) = \sum_{i=1}^4 x_i \cdot p_i = \frac{12}{8} = 1,5$$

$$\alpha_2 = E(X^2) = \sum_{i=1}^4 x_i^2 \cdot P(X = x_i) = \sum_{i=1}^4 x_i^2 \cdot p_i = \frac{24}{8} = 3$$

$$\text{Varianza: } \sigma_x^2 = E(X - \mu_x)^2 = \sum_{i=1}^4 (x_i - \mu_x)^2 \cdot P(X = x_i) = \alpha_2 - \alpha_1^2$$

$$\sigma_x^2 = \alpha_2 - \alpha_1^2 = 3 - 1,5^2 = 0,75$$

$$\text{Desviación típica: } \sigma_x = \sqrt{0,75} = 0,87$$

d) Probabilidad de que salgan a lo sumo dos caras

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$$

$$\text{o bien } P(X \leq 2) = F(2) = \frac{7}{8}$$

e) Probabilidad de que salgan al menos dos caras

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$


$$\text{o bien } P(X \geq 2) = F(1) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

### Ejemplo caso continuo

Considere la siguiente v.a. X con función de densidad de probabilidad dada por:

$$f(x) = \frac{4}{3}(1 - x^3), \quad 0 \leq x \leq 1$$

- Verifique que la función  $f(x)$  es f.d.p.
- Obtenga  $E(X)$ .
- Obtenga la función de distribución acumulada.



d) Calcule  $P\left(X > \frac{3}{4}\right), P\left(X \leq \frac{1}{2}\right), P\left(\frac{1}{4} \leq X \leq \frac{3}{4}\right)$

e) Calcule  $E(2X + 3)$  y  $V(2X + 3)$

Desarrollo:

a)  $\int_0^1 \frac{4}{3}(1 - x^3)dx = 1$ . Luego,  $f(x)$  es f.d.p.

$$\begin{aligned} \text{b) } E(X) &= \int_{R_x} x * f(x)dx = \int_0^1 x * \frac{4}{3}(1 - x^3) = \int_0^1 \frac{4}{3}(x - \\ x^4)dx &= \frac{4}{3} \left[ \frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \right] = \frac{4}{3} \left[ \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) - (0) \right] = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

c)  $F(x) := P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(u)du$ , Si  $U$  es una v.a. continua.

Recordemos que  $f(x)$  está dada por:

$$f(x) = \frac{4}{3}(1 - x^3), \quad 0 \leq x \leq 1$$


$$0, \quad e.o.c.$$

Caso 1:  $x < 0$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(u)du = 0$$

Caso 2:  $0 \leq x < 1$

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^0 0 du + \int_0^x \frac{4}{3}(1 - u^3)du \\ F(x) &= \frac{4}{3} \left( x - \frac{x^4}{4} \right) \end{aligned}$$



Caso 3:  $x \geq 1$ ;  $1 \leq x < \infty$

$$F(x) = \int_{-\infty}^0 0 \, du + \int_0^1 \frac{4}{3} (1 - u^3) \, du + \int_1^x 0 \, du = 1$$

Luego  $F(x)$  está dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{4}{3} \left( x - \frac{x^4}{4} \right), & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

d) Calcule  $P\left(X > \frac{3}{4}\right)$ ,  $P\left(X \leq \frac{1}{2}\right)$ ,  $P\left(\frac{1}{4} \leq X \leq \frac{3}{4}\right)$

Esto se puede hacer de 2 maneras: utilizando la función de densidad de probabilidad,  $f(x)$  y utilizando la función de distribución acumulada,  $F(x)$ .

Primera forma:

$$P\left(X > \frac{3}{4}\right) = \int_{3/4}^1 \frac{4}{3} (1 - x^3) \, dx = 0,11$$

O bien utilizando propiedades de la  $F(x)$


$$P\left(X > \frac{3}{4}\right) = 1 - F\left(\frac{3}{4}\right) = 1 - \frac{4}{3} \left( \left(\frac{3}{4}\right) - \frac{(\frac{3}{4})^4}{4} \right) = 0,11$$

Luego,

$$P\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = \int_0^{1/2} \frac{4}{3} (1 - x^3) \, dx =$$

O bien utilizando propiedades de la  $F(x)$

$$P\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{4}{3} \left( \left(\frac{1}{2}\right) - \frac{(\frac{1}{2})^4}{4} \right) =$$



Finalmente,

$$P\left(\frac{1}{4} \leq X \leq \frac{3}{4}\right) = \int_{1/4}^{3/4} \frac{4}{3}(1 - x^3)dx =$$

O bien utilizando propiedades de la  $F(x)$

$$P\left(\frac{1}{4} \leq X \leq \frac{3}{4}\right) = F\left(\frac{3}{4}\right) - F\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{4}{3}\left((3/4) - \frac{(3/4)^4}{4}\right) - \frac{4}{3}\left((1/4) - \frac{(1/4)^4}{4}\right)$$

e) Calcule  $E(2X+3)$  y  $V(2X+3)$

$$E(2X + 3) = \int_0^1 (2x + 3) \cdot \frac{4}{3}(1 - x^3)dx = \dots$$

O bien utilizando propiedades de la Esperanza

$$E(2X + 3) = E(2X) + E(3) = 2E(X) + 3 = 2 \cdot \frac{2}{5} + 3 = 3,8$$

En el caso de  $V(2X + 3)$ , también se utilizan propiedades de la varianza.

$$V(2X + 3) = V(2X) = 2^2 \cdot V(X) = 4V(X)$$

$$\text{Donde } V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 =$$

$$E(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot \frac{4}{3}(1 - x^3)dx = \int_0^1 \frac{4}{3}(x^2 - x^5)dx = \frac{2}{9}$$

Luego,

$$V(X) = \frac{2}{9} - \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{14}{225} \quad \text{y} \quad V(2X + 3) = 4V(X) = 4 \cdot \frac{14}{225} = \frac{56}{225}$$