CADO ODONTOLOGIA · CALAMA

Dr. Javier Beiza Ayala | Cirujano Dentista Titular (13 anos en Calama)

Vivar #1580 Of. 203, Edificio Espacio Parque | Urgencias & WhatsApp: +56 9 4465 7815

PROTOCOLO CLINICO DE RECUPERACION POSTOPERATORIA

Cuidados Posteriores a una Extraccion Dental (Exodoncia)

Indicaciones medicas para las primeras 48 a 72 horas tras el procedimiento

Las primeras horas posteriores a una exodoncia son cruciales para formar y proteger el coagulo una y sin sanguineo, permitiendo cicatrizacion comoda, rapida dolor.

1. Primeras 2 horas despues del procedimiento

- Mantener la gasa esteril colocada por el doctor mordiendo con presion suave y constante por 30 a 45 minutos.
- No escupir, no enjuagarse la boca con fuerza ni succionar la herida: la succion desaloja el coagulo y reinicia el sangrado.
- Guardar reposo relativo en posicion semisentada. Evitar agacharse, levantar peso o hacer actividad fisica.

2. Alimentacion e hidratacion segura (Primeras 48 horas)

- Consumir exclusivamente alimentos blandos, frios o a temperatura ambiente (yogur, jalea, helado sin semillas, pure tibio).
- PROHIBIDO usar bombillas (pajitas): la presion negativa destruye el tapon protector de fibrina.
- Evitar comidas calientes, condimentos picantes, alcohol, bebidas gaseosas y cualquier alimento crujiente o con granos.

3. Higiene oral adaptada

- No enjuagar la boca durante las primeras 24 horas.
- A partir del segundo dia, cepillar los demas dientes con suavidad extrema sin frotar la zona intervenida.
- Si el doctor lo indico, realizar enjuagues pasivos (sin escupir con fuerza, dejando caer el liquido) con solucion salina tibia.

4. Manejo del dolor y control de la inflamacion

- Tomar estrictamente los analgesicos y antiinflamatorios prescritos por el Dr. Javier Beiza en los horarios pautados.
- Aplicar compresas frias sobre la mejilla externa: 10 minutos de frio con toalla, 10 minutos de descanso durante las primeras 6 horas.
- No automedicarse con aspirina (acido acetilsalicilico) ya que favorece el sangrado.

SENALES DE ALERTA - CONTACTO INMEDIATO CON CADO

! Sangrado abundante y continuo que no disminuye tras presionar suavemente con una gasa limpia por 30 minutos.

! Dolor agudo punzante que aparece o aumenta intensamente a partir del tercer dia (posible alveolitis).

! Fiebre superior a 38 C o dificultad para tragar o abrir la boca.