

Suplementação com HMB aumenta testosterona em adultos:

Metanálise indica ausência de efeitos significativos sobre cortisol, IGF-1 e GH



O crescente interesse em melhorar o desempenho físico e a massa muscular em adultos tem destacado os potenciais benefícios da suplementação de β -hidroxi- β -metilbutirato (HMB). Pesquisas clínicas conduzidas em atletas indicam que a suplementação com HMB pode efetivamente mitigar um aumento nos níveis séricos de creatina fosfoquinase, reduzindo assim os danos ao músculo esquelético. Além disso, o HMB tem sido associado a melhorias na força e na massa corporal magra, tornando-se uma escolha preferida entre atletas e treinadores de resistência (BIDESHKI et al., 2025). O objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos da suplementação com HMB nos níveis hormonais (testosterona, cortisol, IGF-1 e GH) em adultos.

MÉTODOS

Uma revisão sistemática e metanálise foram realizadas abrangendo bases de dados, incluindo PubMed, Web of Science e Scopus, foi realizada para identificar estudos relevantes até janeiro de 2024. O protocolo foi registrado no Prospero (CRD42024552074). Os estudos avaliaram o impacto da suplementação de HMB em desfechos hormonais, incluindo:

- Testosterona;
- Cortisol;
- Fator de crescimento semelhante à insulina-1 (IGF-1);
- Hormônio do crescimento (GH).

Os critérios de inclusão incluíram:

- População: Adultos (≥ 18 anos).
- Intervenção: Suplementação com HMB (qualquer forma: HMB, HMB-Ca, HMB-FA) por ≥ 2 semanas
- Comparação: Placebo ou controle.

As análises seguiram o modelo de efeitos aleatórios, e diferenças padronizadas de médias (SMD) com intervalos de confiança de 95%.

RESULTADOS

15 ensaios controlados (712 participantes) foram selecionados.

- Aumento significativo de Testosterona (SMD: 0,82; IC95%: 0,35–1,29; $*p = 0,001$) com evidência de alta qualidade (GRADE).
- Não houve alterações significativas no Cortisol (SMD: -0,39; IC95%: -0,92–0,14; $*p = 0,14$).
- Não houve alterações significativas no IGF-1 (SMD: -0,18; IC95%: -0,54–0,18; $*p = 0,33$).
- Não houve alterações significativas no GH (SMD: 0,04; IC95%: -0,73–0,82; $*p = 0,91$).

CONCLUSÃO

A suplementação com HMB eleva significativamente os níveis de testosterona em adultos, sem impactos distintos em outras vias hormonais. Além disso, não influencia significativamente nos níveis de cortisol, IGF-1 ou GH.

BIDESHKI, Mohammad Vesal; SADEGHI, Behrad; BEHZADI, Mehrdad; JOZI, Hannane; ESKANDARI DAMANEH, Hadi; RASHIDINEJAD, Ali. β -Hydroxy- β -methyl butyrate (HMB) supplementation elevates testosterone levels without significant changes to cortisol, IGF-1, or growth hormone in adults: a GRADE-assessed systematic review and meta-analysis of controlled trials. *Frontiers in Nutrition*, v. 12, p. 1582135, 19 June 2025.

FORMULAÇÃO



HMB (β -hidroxi- β -metilbutirato)

HMB	3g
Apus Mix Adoçante qsp	1 Sachê

Administrar 1 sachê ao dia, diluído em água, ou conforme orientação médica/nutricional.

Compatível com:



Pós
Encapsulados
Comprimidos
Drágeas
Supositórios
Lenços umedecidos
Seringas
Cremes



@apusnutricosmeticos

Ideal®

Equipamentos para Laboratórios