

# Задание №1

М8О-411Б, Солдатов Вячеслав

Март 2023

## 1 Задача

Пусть  $Y = \{0, 1\}$ ,  $D = [0, 1]$ ,  $l(x, y) = |x - y|$ . Докажите, что общие потери алгоритма экспоненциального взвешивания экспертных решений не меньше общих потерь лучшего эксперта.

## 2 Известно

$\hat{L}_t = \sum_{i=1}^N l(x, y) = \sum_{i=1}^N |\hat{p}_t - y_t|$  - потери алгоритма

$L_{i,t} = \sum_{i=1}^N l(x_i, y) = \sum_{i=1}^N |\hat{f}_{i,t} - y_t|$  - потери эксперта

$\hat{p}_t = \frac{\sum_{i=1}^N w_{i,t-1} \cdot f_{i,t}}{\sum_{i=1}^N w_{i,t-1}} = \frac{\sum_{i=1}^N e^{-nL_{i,t-1}} f_{i,t}}{\sum_{i=1}^N e^{-nL_{i,t-1}}}$  - предсказание

$W_t = \sum_{i=1}^N w_{i,t} = \sum_{i=1}^T e^{-nL_{i,t}}$  - веса экспертов

$\ln \frac{W_t}{W_{t-1}} = \ln \sum_{i=1}^N p_i(t-1) e^{-\eta |f_{i,t} - y_t|}$

$\ln \frac{W_t}{W_0} = \ln(\sum_{i=1}^N e^{-nL_{i,t}}) - \ln N$

## 3 Решение

Общие потери лучшего эксперта обозначим как:

$$i^* = \arg \min_{i=1}^N L_{i,T}$$

Для доказательства того, что общие потери алгоритма не меньше общих потерь лучшего эксперта, воспользуемся леммой. Лемма: При любых неотрицательных весах экспертов  $w_1, w_2, \dots, w_N$ , и их неотрицательных значений

$p_1, p_2, \dots, p_N$  имеем

$$\frac{\sum_{i=1}^N w_i \cdot f_i}{\sum_{i=1}^N w_i} \geq \min_{i=1}^N f_i$$

Доказательство леммы:

Обозначим  $i^* = \arg \min_{i=1}^N l_i$ . Тогда

$$\frac{\sum_{i=1}^N w_i \cdot p_i}{\sum_{i=1}^N w_i} \geq \frac{w_{i^*} \cdot p_{i^*}}{\sum_{i=1}^N w_i} \geq \frac{w_{i^*} \cdot \min_{i=1}^N p_i}{\sum_{i=1}^N w_i} \geq \min_{i=1}^N p_i$$

Доказательство теоремы:

$$\begin{aligned} \hat{L}_t &= \sum_{i=1}^N l(\hat{p}_t, y_t) = \sum_{i=1}^N |\hat{p}_t - y_t| = \sum_{i=1}^N \left| \frac{\sum_{i=1}^N w_i \cdot f_i}{\sum_{i=1}^N w_i} - y_t \right| \geq \\ &\geq \sum_{i=1}^N \min_{i=1}^N l(f_{i,t}, y_t) = \min_{i=1}^N \sum_{t=1}^T |f_{i,t} - y_t| = L_{i^*,t} \end{aligned}$$

Таким образом мы показали, что общие потери алгоритма по крайней мере не меньше общих потерь эксперта.