

Personel rzeźni w zakładach dokonujących uboju drobiu może pomagać w wykonywaniu zadań związanych z badaniem poubojowym, pod warunkiem, że:

- Działa niezależnie od personelu produkcyjnego rzeźni
- Został odpowiednio przeszkolony
- Wykonuje te zadania w obecności urzędowego lekarza weterynarii lub urzędowego pracownika pomocniczego i zgodnie z ich poleceniami

Tusze i towarzyszące im podroby podlegające badaniu poubojowym **niezwłocznie po uboju !!!**

Właściwe organy mogą wymagać od podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze zapewnienia specjalnych urządzeń technicznych i wystarczającej powierzchni do kontroli podrobów.

Właściwe organy:

- Sprawdzają wszystkie powierzchnie zewnętrzne, w tym powierzchnie jam ciała tusz, oraz podroby
- Zwracają szczególną uwagę na wykrywanie chorób odzwierzęcych oraz chorób zwierząt, w odniesieniu do których w rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono przepisy dotyczące zdrowia zwierząt

Szybkość przesuwania linii ubojowej i liczba obecnych pracowników przeprowadzających badanie muszą być takie, aby umożliwić odpowiednie badanie.

W przypadku gdy ani urzędowy lekarz weterynarii, ani urzędowy pracownik pomocniczy nie są obecni w rzeźni podczas uboju i obróbki poubojowej **badanie poubojowe może zostać opóźnione o maksymalnie 24h od uboju**, pod warunkiem, że:

- Ubój odbywa się w rzeźni o niskiej wydajności, w której poddaje się ubojowi mniej niż 150 000 sztuk drobiu rocznie
- Zakład dysponuje wystarczającą infrastrukturą do przechowywania świeżego mięsa i podrobów, tak aby można było je zbadać
- Badanie poubojowe jest przeprowadzane przez urzędowego lekarza weterynarii

Właściwe organy mogą zdecydować, że badaniu poubojowemu poddawane jest jedynie reprezentatywna próbka drobiu z każdego stada, jeśli:

- Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze dysponują systemem zgodnym z wymogami urzędowego lekarza weterynarii, który umożliwia wykrywanie i oddzielanie ptaków z nieprawidłowościami, zanieczyszczeniami lub wadami
- Rzeźnia jest od dawna zgodna z wymogami (kryteria mikrobiologiczne, procedury oparte na zasadach HACCP, przepisy dotyczące higieny zgodne z rozp. 853/2004)
- Podczas badania przedubojowego i sprawdzania informacji dotyczących łańcucha żywnościowego nie stwierdzono nieprawidłowości, które mogłyby wskazywać na poważny problem dla zdrowia ludzi lub zwierząt

Przeprowadza się dodatkowe badania, takie jak badanie dotykowe i nacięcia tusz i podrobów oraz badania laboratoryjne, jeśli jest to konieczne:

- W celu uzyskania ostatecznej diagnozy podejrzanego zagrożenia lub
- W celu wykrycia: choroby, pozostałości chemicznych lub zanieczyszczeń, niezgodności z kryteriami mikrobiologicznymi, innych czynników

Podczas badania poubojowego stosowane są środki ostrożności w celu zapewnienia, by zanieczyszczenie świeżego mięsa w wyniku takich czynności, jak badanie dotykowe, cięcie lub nacięcie, było ograniczone do minimum.

Kontrola dobrostanu brojlerów w gospodarstwie w ramach badania poubojowego – ocena łapek → instrukcja głównego lekarza weterynarii (2022) w sprawie postępowania przy przeprowadzaniu kontroli dobrostanu brojlerów w gospodarstwie na podstawie badania poubojowego.

Dotyczy stad utrzymywanych w tym samym czasie w jednym kurniku. Gdy do rzeźni trafia przesyłka, która składa się z ptaków pochodzących z różnych kurników nie podlega ona temu badaniu.

Ocena łapek

- Dla każdego stada należy wykonywać badanie polegające na ocenie po jednej łapce od 100 ptaków
- Gdy jedno stado jest przesyłane w kilku partiach do różnych rzeźni, w każdej rzeźni pokonuje się badania przesyłki, pochodzącej z tego stada

Gdy do jednej rzeźni przesyłane są ptaki z tego samego stada w kilku partiach i będzie wiadomo na etapie badania, że ptaki pochodzą z tego samego stada może zostać wykonane:

- Badanie 100 łapek tylko z jednej partii lub
- Badanie łapek z kilku partii, aby po zsumowaniu uzyskać wynik 100 łapek, np. 50 łapek z jednej i 50 z kolejnej partii → tylko pod warunkiem, że wyniki zostaną powiązane ze sobą

Ocena zmian zapalnych na skórze podeszwy:

- Należy pobrać po jednej łapce od 100 ptaków z każdej przesyłki → jeśli jest to możliwe 50 łapek z pierwszej, 1/3 i 50 łapek z ostatniej 1/3 partii
- Łapki pobiera się losowo (bez wstępnej oceny)
- Należy pobierać tylko lewe albo prawe łapki, aby uniknąć badania 2 łapek od tego samego ptaka
- Łapki które mają zostać ocenione powinny być umyte i pozbawione naskórka
- Jeśli łapki pozyskane z linii ubojowej nie są czyste i pozbawione naskórka, należy je umyć oraz usunąć naskórek
- Ocenę prowadzi się poprzez oględziny, w przypadku wątpliwości co do głębokości zmian dokonuje się nacięcia zmiany

Skala oceny zmian zapalnych:

- 0 – brak zmian • 0
- 1 – zmiany powierzchowne, przebarwienia o średnicy nie większej niż 0,5cm • 0,5
- 2 – głębokie zmiany ze strupem i owrzodzeniem, przebarwienia o średnicy 0,5cm i większej • 2

Po dokonaniu oceny:

- Liczba łapek ocenionych na 0 jest mnożona przez 0
- Liczba łapek ocenionych na 1 jest mnożona przez 0,5
- Liczba łapek ocenionych na 2 jest mnożona przez 2

Ogólna liczba punktów:

- <45 punktów – bez uwag (skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej wynosi poniżej wartości 1% + 0,06% pomnożonej przez wiek stada w dniu uboju podany w dniach)
- 46 – 120 punktów – niski poziom nieprawidłowości (skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej wynosi poniżej wartości 1% + 0,06% pomnożonej przez wiek stada w dniu uboju podany w dniach)
- >120 punktów – wysoki poziom nieprawidłowości (skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej wynosi poniżej wartości 1% + 0,06% pomnożonej przez wiek stada w dniu uboju podany w dniach)

Ostateczna ocena poziomu dobrostanu powinna uwzględnić ocenę zmian zapalnych na skórze podeszwy oraz skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej. Urzędowy lekarz weterynarii dokonując oceny poziomu dobrostanu w rzeźni, przekazuje PLW nadzorującemu rzeźnię, w cyklach miesięcznych zastosowanie z przeprowadzonej oceny.

PLW nadzorujący rzeźnię zawiadamia PLW nadzorującego gospodarstwo pochodzenia kurcząt o wynikach badania.

Wskaźnik śmiertelności dziennej – oblicza się dzieląc liczbę kurcząt brojlerów padłych w kurniku tego samego dnia, w tym uśmierconych z powodu choroby lub z innych przyczyn, przez liczbę kurcząt brojlerów znajdujących się w kurniku tym dniu i mnożąc otrzymaną wartość przez 100

Skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej – suma wskaźników śmiertelności dziennej

*Kurczęta padłe
będące w kurniku • 100*

Przekazanie wyników badania przed- i poubojowego (627/2019)

- Urzędowy lekarz weterynarii rejestruje i ocenia wyniki badania przed- i poubojowego
- Jeżeli wyniki ujawniają występowanie choroby lub stanu, który mógłby mieć wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt lub naruszyć dobrostan zwierząt, urzędowy lekarz weterynarii:
 - Informuje podmiot prowadzący rzeźnię
 - W przypadku gdy problem pojawił się w trakcie produkcji podstawowej i dotyczy zdrowia ludzi, zwierząt, dobrostanu zwierząt lub pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych, substancji niedozwolonych lub zakazanych pozostałości pestycydów, dodatków paszowych lub zanieczyszczeń Urzędowy Lek. Wet. Informuje:
 - Lekarza weterynarii obsługującego gospodarstwo pochodzenia
 - Urzędowego lekarza weterynarii, który prowadził badania przedubojowe w gospodarstwie (o ile nie jest to lekarz obsługujący gospodarstwo)
 - Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze odpowiedzialny za gospodarstwo pochodzenia
 - Właściwe organy odpowiedzialne za nadzór nad gospodarstwem pochodzenia

Jeżeli badany drób był utrzymywany w innym państwie, urzędowy lekarz weterynarii zapewnia, by poinformowane zostały właściwe organy tego państwa.

Jeśli urzędowy lekarz weterynarii w trakcie przeprowadzania badania przed- lub poubojowego podejrzewa wystąpienie choroby zwierząt, w odniesieniu do której w rozp. 429/2016 ustanowiono przepisy dotyczące zdrowia zwierząt, powiadamia o tym właściwe organy. Urzędowy lekarz weterynarii i właściwe organy w odpowiednim zakresie swoich kompetencji podejmują wszelkie niezbędne działania i środki ostrożności, aby zapobiec możliwemu rozprzestrzenianiu się czynnika chorobotwórczego.

Znak identyfikacyjny (853/2004)

- Znak identyfikacyjny musi zostać naniesiony przed opuszczeniem zakładu produkcyjnego przez produkt
- Znak musi być czytelny i trwały, a czcionki muszą być łatwe do rozszyfrowania
- Znak musi wskazywać nazwę kraju
- Znak musi wskazywać numer zatwierdzenia zakładu
- W przypadku nanoszenia znaku w zakładzie znajdującym się na terytorium Unii znak ten musi mieć kształt owalny i zawierać skrót odnoszący się do Unii Europejskiej

W zależności od sposobu prezentacji różnych produktów pochodzenia zwierzęcego, znak można nanosić bezpośrednio na produkt, opakowanie jednostkowe lub zbiorcze, lub drukować na etykiecie załączonej do produktu, na opakowaniu jednostkowym albo zbiorczym. Znak może mieć także postać nieusuwalnej przywieszki, wykonanej z opornego materiału.

W przypadku opakowania zbiorczego zawierającego krojone mięso lub podroby, znak musi zostać naniesiony na etykietę przytwierdzoną do opakowania zbiorczego lub wydrukowany na opakowaniu zbiorczym, w sposób zapewniający jego zniszczenie przy otwieraniu opakowania zbiorczego. Jednakże nie ma takiej konieczności, gdy proces otwarcia wiąże się ze zniszczeniem opakowania zbiorczego. W przypadku gdy opakowanie jednostkowe zapewnia taką samą ochronę co opakowanie zbiorcze, etykietę można przytwierdzić do opakowania jednostkowego.

W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczonych w pojemnikach transportowych lub dużych opakowaniach zbiorczych, które to produkty mają zostać poddane dalszej obróbce, przetwarzaniu, pakowaniu jednostkowemu lub zbiorczemu w innym zakładzie, znak może zostać naniesiony na zewnętrzną powierzchnię pojemnika lub opakowania zbiorczego.

W przypadku gdy produkty pochodzenia zwierzęcego są umieszczane w opakowaniu zbiorczym, które ma zostać bezpośrednio dostarczone do konsumenta końcowego, znak wystarczy nanieść jedynie na zewnętrzną część tego opakowania zbiorczego.

BADANIE MIKROBIOLOGICZNE:

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2073/2005 Z DNIA 15 LISTOPADA 2005 R. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.

Kryteria higieny procesu – tusze drobiowe brojlerów i indyków:

SALMONELLA SPP.: $N = 50$, $C = 5$, $m=M$ – nieobecne w 25g zbiorczej próbki skóry szyi – tusze drobiowe brojlerów i indyków po chłodzeniu.

50 próbek pobiera się w ramach 10 kolejnych sesji zgodnie z zasadami pobierania próbek i częstotliwościami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

- Jakość zadowalająca jeśli obecność salmonella została wykryta maksymalnie w C/N próbek
- Jakość niezadowalająca jeśli obecność salmonella została wykryta w większej liczbie próbek niż C/N

Po każdej sesji pobierania próbek wyniki ostatnich dziesięci sesji pobierania próbek polegają ocenie dla uzyskania liczby N próbek.

Badanie poubojowe szczegółowe tuszki drobiowej z wykonywaniem nacięć:

1. Cięcie skóry między udem a ścianą brzucha w celu określenia barwy, zapachu i konsystencji tkanki łącznej okolicy pachwinowej
2. Dwa łukowate cięcia wzdłuż tylnego brzegu ostatnich żeber oraz cięcie pionowe w kierunku steku. W ten sposób odsłania się narządy wewnętrzne jamy brzusznej
3. Otwarcie klatki piersiowej – dokonuje się przy pomocy dwu cięć bocznych w połowie długości żeber – ku przodowi po obu stronach mostka
4. Dwa głębokie cięcia po obu stronach grzebienia mostkowego – badanie mięśni piersiowych
5. Nacięcie szyi i wola
6. Nacięcie kości wzdłuż oraz otwarcie stawów

BADANIE SANITARNO-WETERYNARYJNE ZAJĘCZAKÓW

Królik jako zwierzę produkcyjne:

- duża płodność i plenność
- wczesne dojrzewanie i wysokie tempo wzrostu
- dobre wykorzystanie paszy (1kg pobranej paszy na 4kg przyrostu)
- wysoka wydajność rzeźna (powyżej 60%)
- wysoka jakość mięsa
- wartościowa skóra

Liczba zakładów zatwierdzonych do uboju zajęczaków (2026r.): 4 (w tym jedna działalność zawieszona od 2022r.)

Rasy królików:

- Mięsne – belgijski olbrzym (do 10kg), francuski baran, olbrzym srokacz, szynszyl wielki (ale może być też na futro), burgundzki, morawski olbrzym
- Futerkowe
- Wełniste – angora
- Laboratoryjne
- Amatorskie
- Króliki miniatutki

Każdą rasę królików można hodować jako rasę towarzyszącą.

Zwierzę rzeźne – króliki rzeźne – przeznaczone do uboju bez względu na rasę, płeć i wiek (z wyjątkiem samic w ciąży i samic w laktacji).

Definicja – rozp. 2004/853 – „Zajęczaki” – oznaczają króliki, gryzonie i zające.

USTAWA z dnia 10 grudnia 2020r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich – zwierzęta futerkowe to zwierzęta gatunków:

- lis pospolity i polarny
- norka amerykańska
- tchórz
- jenot
- nutria
- szynszyla
- królik

utrzymywane w celu produkcji surowca dla przemysłu futrzarskiego, mięsnego i włókienniczego (z królików to np. szynszyl wielki lub belgijski olbrzym- gdzie futro to jest produkt uboczny).

Minimalne warunki utrzymywania królików

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 28 CZERWCA 2010R. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich inne niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE

- króliki utrzymuje się: na wolnym wybiegu pod zadaszeniem lub w pomieszczeniach inwentarskich w klatkach lub kojcach
- pojedynczo lub grupowo – zwierzęta stada podstawowego utrzymuje się pojedynczo
- samce i samice królików po osiągnięciu dojrzałości płciowej utrzymuje się oddzielnie

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: wysokość i szerokość klatek, powierzchnia podłogi w klatkach i kojcach.

Klasyfikacja królików rzeźnych ze względu na kolor okrywy włosowej:

- króliki białe (b) – z dopuszczalnymi innymi ubarwieniami na głowie, uszach i kończynach
- króliki kolorowe (k) – inne niż białe

Klasyfikacja królików rzeźnych ze względu na pochodzenie:

- króliki z chowu tradycyjnego (S) – przydomowe, żywione ekstensywnie
- króliki fermowe (T) – chów fermowy, żywienie wyłącznie pełnoporcjowymi paszami granulowanymi

Klasyfikacja ze względu na masę ciała

- klasa I → 2,2 do 5,5 kg
- klasa II → poniżej 2,2 kg i powyżej 5,5 kg

Jak oznaczamy królika? → królik rzeźny PN – R – 78310 II S b (klasa II, chów tradycyjny, biały) – zawsze w tej kolejności!!!

Transport do rzeźni (rozp. 2004/853)

- podczas odbioru i transportu zwierząt, trzeba się z nimi ostrożnie obchodzić, aby nie powodować u nich zbędnego niepokoju
- zwierzęta z objawami choroby lub pochodzące ze stad, o których wiadomo, że są skażone substancjami o znaczeniu dla zdrowia publicznego, można transportować do rzeźni wyłącznie za zgodą właściwych organów
- klatki do celów transportu zwierząt do rzeźni oraz moduły, jeśli są stosowane muszą być wykonane z materiału odpornego na korozję oraz muszą być łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. Niezwłocznie po opróżnieniu oraz, w razie konieczności, przed ponownym zastosowaniem, wszystkie urządzenia wykorzystywane do odbioru i dostaw żywych zwierząt muszą zostać oczyszczone, umyte i zdezynfekowane

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań.