

Praktyczne rozwiązania dotyczące kontroli urzędowych pod kątem wągryzcy podczas badania poubojowego bydła domowego i świniowatych (art. 30)

Procedury badania poubojowego opisane w art. 18, 19 i 23 stanowią minimalne wymogi w odniesieniu do badania na obecność wągryzcy u bydła i świniowatych (świania domowa, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych i zwierzęta łowne). W przypadku bydła, o którym mowa w art. 19, właściwe organy mogą postanowić, że nacięcie mięśni żwaczy podczas badania poubojowego nie jest obowiązkowe, jeśli:

- Stosowany jest specjalny test serologiczny
- Zwierzęta były utrzymywane w gospodarstwie pochodzenia oficjalnie wolnym od wągryzcy lub
- Współczynnik chorobotwórczości w populacji źródłowej lub w dokładnie określonej subpopulacji wynosi poniżej jednego na milion, został on wykazany przy pewności wynoszącej 95% lub nie wykryto żadnych przypadków u zwierząt poddanych ubojowi w ciągu ostatnich pięciu lat (lub dwóch lat jeśli, jeśli zostało to poparte dowodami i uzasadnione w drodze analizy ryzyka przeprowadzanej przez właściwe organy) na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach sporządzonych zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy 2003/99/WE.

Mięso zarażone wągryzami uznaje się za niezdadne do spożycia przez ludzi. Jeżeli jednak zwierzę nie jest ogólnie zarażone wągryzłą, części niezarażone można uznać za zdadne do spożycia przez ludzi po poddaniu tego mięsa procesowi mrożenia.

BADANIE SAMITARNO-WETERYNARYJNE DZICZYNY

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie
- Rozporządzenie z dnia 22 marca 2018 r. O zmianie ustawy – prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw
- Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne – z późniejszymi zmianami (29.06.2022)
- Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz – z późniejszymi zmianami (07.11.2022)
- Rozporządzenie MRIRW z dnia 26 listopada 2010 r. W sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych z późniejszymi zmianami (20.03.2019)
- Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. W sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części
- Rozporządzenie 853/2004 - (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny u odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
- Rozporządzenie 2019/627 – ustanawiające jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Rozporządzenie 853/2004 – definicje

Zwierzęta łowne – to dzikie zwierzęta kopytne i zajęczaki oraz inne ssaki lądowe, łowione do celów spożycia przez ludzi i uznawane za zwierzęta łowne na mocy właściwego prawa danego państwa członkowskiego, w tym ssaki żyjące na terytoriach zamkniętych w warunkach zapewniających im swobodę, zbliżonych do warunków, w jakich żyją zwierzęta łowne oraz dzikie ptaki pozyskiwane do celów spożycia przez ludzi

Drobna zwierzyna łowna – oznacza dzikie ptactwo łowne oraz zajęczaki żyjące na wolności w ich środowisku naturalnym

Gruba zwierzyna łowna – oznacza dzikie ssaki lądowe żyjące na wolności w ich środowisku naturalnym, które nie podlegają definicji drobnej zwierzyny łownej

Zakład obróbki dziczyzny – oznacza zakład, w którym zwierzęta łowne i mięso uzyskane w wyniku polowania są przygotowywane do wprowadzenia do obrotu

Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 16 marca 2005 r.

- zwierzyna gruba - łoś (pod ochroną – moratorium), jeleń szlachetny, daniel, sarna, dzik, muflon
- zwierzyna drobna - zając szarak, dziki królik
- ptactwo łowne → bażant, kuropatwa
 - kaczka → krzyżówka, cyraneczka, głowienka, czernica
 - gęś → gęgawa, zbożowa, białoczelna
 - jarząbek, łyska, słonka, gołąb grzywacz
- zwierzyna płowa → łoś, jeleń, daniel, sarna
- zwierzyna czarna → dziki i muflony

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 9 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE LISTY INWAZYJNYCH GATUNKÓW OBCYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA UNII I LISTY INWAZYJNYCH GATUNKÓW OBCYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA POLSKI, DZIAŁAŃ ZARADCZYCH ORAZ ŚRODKÓW MAJĄCYCH NA CELU PRZYWRÓCENIE NATURALNEGO STANU EKOSYSTEMÓW

Rozporządzenie określa:

Listę inwazyjnych gatunków obcych, zwanych dalej „IGO”, stwarzających zagrożenie dla unii

- podlegających szybkiej eliminacji
- rozprzestrzenionych na szeroką skalę

Listę IGO stwarzających zagrożenie dla Polski

- podlegających szybkiej eliminacji
- rozprzestrzenionych na szeroką skalę

Inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla unii rozprzestrzenione na szeroką skalę: jenot, piżmak, szop prac

Inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Polski podlegające szybkiej eliminacji → jeleń sika

Dziczyzna → jest to mięso zwierząt łownych

Narogi → jadalne narządy wewnętrzne zwierzyny grubej (serce, płuca, wątroba, nerki)

Patrochy → niejadalne narządy wewnętrzne zwierzyny

Masa tuszy i wydajność rzeźna dziczyzny

Gatunek	Masa tuszy (kg)	Wydajność rzeźna (%)
Sarna	13-17	60
Jeleń	75-90	52-60
Dzik	80-105	60-75
Daniel	40-55	48-59
Łoś	150-200-250	65-70
Zając	3-4,5	53-72

Postępowanie myśliwego

- odstrzał zwierzyny
- wytrzewienie → nie przecina się mostka
- wychłodzenie → nacięcie pach i pachwin, kołki rozporowe do jamy brzusznej
- nie ściąga się skóry
- oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia
- przywiezienie odstrzelonej zwierzyny do badania sanitarno-weterynaryjnego

Patroszenie → studzenie → pobieranie trofeów → przechowywanie → transport

Patroszenie	• sposób patroszenia (umiejętności) • warunki środowiskowe • miejsce ulokowania kuli po strzale • czas od momentu pozyskania • higiena w trakcie i po patroszeniu • toaleta tuszy → niedozwolone mycie wodą
Studzenie	• sposób ułożenia tuszy • warunki środowiskowe • wykonanie odpowiednich nacięć (podcięć) i założenie rozpórek • czas chłodzenia (studzenia) w zależności od warunków środowiskowych • higiena w trakcie chłodzenia (miejsce)
Pobieranie trofeów	• sposób pobierania (umiejętności) • higiena w trakcie i po pobraniu • odpowiednie zabezpieczenie odsłoniętych części tuszy
Transport	• warunki pogodowe • warunki środowiskowe • czas transportu • tusze niewystudzone → zaparzenie • higiena i temperatura w trakcie transportu

Rozporządzenie mriw z dnia 26 listopada 2010 r. W sprawie przeprowadzania szkoleń myśliwych określa

- zakres tematyczny, warunki i sposób przeprowadzania szkolenia
- wzór oświadczenia o przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia
- sposób przekazywania informacji o nietypowych cechach i zachowaniu się zwierzęcia oraz o podejrzeniu skażenia środowiska
- wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia

Nietypowe oznaki w zachowaniu i wyglądzie zewnętrznym u zwierzyny grubej płowej

- brak odruchu ucieczki przed człowiekiem (wścieklizna, CWD – chroniczna wyniszczająca choroba łosi i jeleni)
- posmutnienie, apatia, osowiałość, spowolniona reakcja na bodźce zewnętrzne (księgosusz, pastereleza, okres zwiastunowy wścieklizny, pryszczycza, CWD, choroby pasożytnicze → bąblowica, wągrzyca sieciowa, motyllica wątrobowa, itp.)
- wzmoczona pobudliwość (postać szałowa wścieklizny, tężec, listerioza, cenuroza)
- wychudzenie → związane zazwyczaj z chorobami przewlekłymi i wyniszczającymi (choroby pasożytnicze, choroby bakteryjne i wirusowe związane z biegunką), wszołowica, lipoptenoza, cefanomyioza, hyperdermatoza
- trudności w poruszaniu się → sztywny chód (wścieklizna, tężec, pryszczycza, wyniszczenie ogólne organizmu spowodowane chorobami pasożytniczymi, bakteryjnymi i wirusowymi)

Nietypowe oznaki w zachowaniu i wyglądzie zewnętrznym u dzika

- brak odruchu ucieczki przed człowiekiem (wścieklizna, ogólne wyniszczenie organizmu)
- posmutnienie, apatia, osowiałość, spowolniona reakcja na bodźce zewnętrzne (pomór, pastereleza, wąglik, okres zwiastunowy wścieklizny, pryszczycza, choroby pasożytnicze → bąblowica, wągrzyca dzików, wągrzyca sieciowa, włośnica, glistnica, itp.)
- wzmoczona pobudliwość (dochodzenie postrzałka, postać szałowa wścieklizny, tężec, listerioza, zatrucia środkami ochrony roślin i metalami ciężkimi)
- wychudzenie → związane zazwyczaj z chorobami przewlekłymi i wyniszczającymi, np. choroby pasożytnicze, choroby bakteryjne (gruźlica, różycza, salmonelozy) i wirusowe związane z biegunką
- trudności w poruszaniu się → sztywny chód (wścieklizna, tężec, pryszczycza), chwiejny chód, zwierzę się potyka i wstaje (wyniszczenie ogólne organizmu spowodowane chorobami pasożytniczymi, bakteryjnymi i wirusowymi), wnyki, rany postrzałowe

Nietypowe oznaki w zachowaniu i wyglądzie zewnętrznym u sarny i zająca

- brak odruchu ucieczki przed człowiekiem (wścieklizna, ogólne wyniszczenie organizmu)
- posmutnienie, apatia, osowiałość, spowolniona reakcja na bodźce zewnętrzne (księgosusz, pastereleza, okres zwiastunowy wścieklizny, pryszczycza, choroby pasożytnicze → bąblowica, wągrzyca sieciowa, motyliczka wątrobowa, itp.), biegunki pokarmowe (rzepaki, opryskiwane oziminy, buraki, itp.)
- wzmoczona pobudliwość (postać szatowa wścieklizny, tężec, listerioza, cenuroza, zatrucia środkami ochrony roślin i metalami ciężkimi)
- wychudzenie → związane zazwyczaj z chorobami przewlekłymi i wyniszczającymi, np. choroby pasożytnicze, choroby bakteryjne i wirusowe związane z biegunką, wszołowica, lipoptenoza, cefanomyioza, hyperdermatoza, oznaką mogą być formy myłkusowate poroża lub brak wytarcia scypułu jeszcze w miesiącach letnich
- trudności w poruszaniu się → sztywny chód (wścieklizna, tężec, pryszczycza), chwiejny chód, zwierzę się potyka i wstaje (wyniszczenie ogólne organizmu spowodowane chorobami pasożytniczymi, bakteryjnymi i wirusowymi), wnyki, rany postrzałowe, skaleczenia przez np. dziczące psy

Nietypowe zachowania i wygląd ptactwa łownego

- brak odruchu ucieczki przed człowiekiem i psami (pomór drobiu, ogólne wyniszczenie organizmu)
- posmutnienie, apatia, osowiałość, spowolniona reakcja na bodźce zewnętrzne (pomór drobiu, rzekomy pomór drobiu, salmonelozy, mykoplasmoza, choroby pasożytnicze → endo- i ektopasożyty)
- wychudzenie → związane zazwyczaj z chorobami przewlekłymi i wyniszczającymi, np. choroby pasożytnicze, choroby bakteryjne i wirusowe związane z biegunką
- trudności w poruszaniu się (pomór drobiu, ogólne wyniszczenie organizmu spowodowane chorobami pasożytniczymi, bakteryjnymi i wirusowymi), wnyki, rany postrzałowe, skaleczenia przez psy
- znajdowanie w łowisku sztuk padniętych (pomór, zatrucia pokarmowe środkami ochrony roślin lub innymi szkodliwymi dla ptactwa substancjami)

WYTYCZNE ODNOŚNIE STOSOWANIA ZASAD BIOASEKURACJI PRZEZ MYŚLIWYCH W CZASIE POLOWAŃ ORAZ W CZASIE POBIERANIA PRÓBEK OD DZIKÓW DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF NA OBSZARACH OBJĘTYCH RESTRYKCJAMI W ZWIĄZKU Z ASF

rozporządzenie MRiRW z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia w 2023 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału na obszarach objętych ograniczeniami i zagrożenia

- na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożenia dziki odstrzelone **nie mogą być patroszone w łowisku, lecz na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych** dzików
- na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „miejsce patroszenia”
- każdy odstrzelony dzik u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono **objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF**, po oględzinach i pobraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, przeznaczony jest do utylizacji
- zaleca się dokonywanie **patroszenia** dzików **na folii lub innym, szczelnym materiale**
- miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu, dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu
- zaleca się umieszczenie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku
- po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie
- **na obszarze ochronnym oraz na obszarach nie objętych restrykcjami dopuszcza się patroszenie na łowisku**, przy czym zaleca się zachowanie powyższych zasad bioasekuracji

Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików

- środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi
- środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji
- środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików
- wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału

Wymagania dla punktów przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zlokalizowanych na obszarach objętych restrykcjami w związku z asf

- punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej
- tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy gromadzone są oddzielnie, zapewniając w miarę możliwości ich przetrzymywanie w temperaturze chłodni
- patrochy oznacza się w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni
- w punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędownego lekarza weterynarii
- przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić przy patrochach, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji
- przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej

Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku asf od odstrzelonych dzików

- próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku bez antykoagulantu, a następnie umieścić je w worku strunowym i oznakować, minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml
- należy unikać zanieczyszczenia od otoczenia tuszy, z której pobierana jest próbka z krwią zwierzęcia
- wszelkie materiały lub sprzęt użyte do pobierania próbek krwi, po zakończeniu próbkobrania należy umyć a następnie zdezynfekować lub, w razie konieczności, poddać utylizacji

Dziczyna – temperatura przechowywania i transportu

Zwierzyna gruba nieskórowana

- tusze → temperatura nie wyższa niż 7°C
- narządy wewnętrzne → temperatura nie wyższa niż 3°C

Zwierzyna drobna niewypatroszona

- temperatura nie wyższa niż 4°C