

## **Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików**

- środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi
- środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji
- środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików
- wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału

## **Wymagania dla punktów przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zlokalizowanych na obszarach objętych restrykcjami w związku z asf**

- punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej
- tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy gromadzone są oddzielnie, zapewniając w miarę możliwości ich przetrzymywanie w temperaturze chłodni
- patrochy oznacza się w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni
- w punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędownego lekarza weterynarii
- przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić przy patrochach, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji
- przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej

## **Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku asf od odstrzelonych dzików**

- próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku bez antykoagulantu, a następnie umieścić je w worku strunowym i oznakować, minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml
- należy unikać zanieczyszczenia od otoczenia tuszy, z której pobierana jest próbka z krwią zwierzęcia
- wszelkie materiały lub sprzęt użyte do pobierania próbek krwi, po zakończeniu próbkobrania należy umyć a następnie zdezynfekować lub, w razie konieczności, poddać utylizacji

## **Dziczyna – temperatura przechowywania i transportu**

### **Zwierzyna gruba nieskórowana**

- tusze → temperatura nie wyższa niż 7°C
- narządy wewnętrzne → temperatura nie wyższa niż 3°C

### **Zwierzyna drobna niewypatroszona**

- temperatura nie wyższa niż 4°C

## Badanie sanitarno-weterynaryjne dziczyzny w zakładzie rozbioru i przetwórstwa dziczyzny

- w pierwszej kolejności lekarz badający sprawdza oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia, a następnie przystępuje do właściwego badania sanitarno-weterynaryjnego poubojowego

### Rozp. 853 Sekcja IV – Mięso zwierząt łownych – rozdział I – szkolenie myśliwych w zakresie zdrowia i higieny

1.osoby, które polują na zwierzynę łowną z myślą o wprowadzeniu jej do obrotu do celów spożycia przez ludzi, aby mogły przeprowadzić wstępne badanie zwierzęcia na miejscu, muszą posiadać wystarczającą znajomość z zakresu patologii zwierząt łownych, oraz produkcji i obróbki zwierząt łownych i ich mięsa po odstrzeleniu

2.wystarczy jednak, aby wiedzę o której mowa w pkt 1 posiadała przynajmniej jedna osoba z zespołu łowieckiego. Odniesienia w niniejszej sekcji do „osoby przeszkolonej” dotyczy właśnie takiej osoby

3.przeszkolona osoba, jeśli wchodzi w skład koła łowieckiego lub rezyduje w bezpośrednim sąsiedztwie terenów łowieckich mogłaby także pełnić funkcję strażnika łowieckiego lub przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. W tym drugim przypadku, myśliwy zobowiązany jest okazywać zwierzęta łowne strażnikowi łowieckiemu lub przedstawicielowi dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz informować go o wszelkich nietypowych zachowaniach, jakie zaobserwował u danego zwierzęcia przed uśmierceniem go.

5.Właściwe organy powinny zachęcać organizacje łowieckie do przeprowadzania takich szkoleń.

4. Szkolenie musi być przeprowadzane zgodnie z wymogami właściwych organów, w celu umożliwienia myśliwym zdobycia tytułu osób przeszkolonych. Powinno one obejmować przynajmniej następujące tematy:

- prawidłowa anatomia, fizjologia i zachowania zwierząt łownych
- nietypowe zachowania i zmiany patologiczne u zwierząt łownych, spowodowane chorobami, skażeniem środowiska lub innymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na zdrowie ludzi po spożyciu mięsa
- przepisy dotyczące higieny oraz prawidłowe techniki obróbki transportu, wytrzewiania itd. zwierząt łownych po ich uśmiercaniu
- prawodawstwo i przepisy administracyjne dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wymogów w zakresie higieny regulujących wprowadzenie do obrotu zwierząt łownych.

### ROZDZIAŁ II OBRÓBA GRUBEJ ZWIERZNY ŁOWNEJ

1. Po uśmierceniu grubej zwierzyny łownej, zwierzęciu należy jak najszybciej usunąć żołądek i jelita oraz, w razie konieczności poddać je wykrwawieniu
2. Osoba przeszkolona musi dokonać oględzin uśmierconego zwierzęcia i usuniętych narządów wewnętrznych, w celu stwierdzenia ewentualnych cech, które mogą wskazywać, że mięso stanowi zagrożenie dla zdrowia. Oględzin należy dokonać możliwie jak najszybciej po uśmierceniu zwierzęcia
3. Mięso grubej zwierzyny łownej można wprowadzić do obrotu wyłącznie w przypadku gdy uśmiercone zwierzę zostanie możliwie jak najszybciej przewiezione do zakładu obróbki dziczyzny, po dokonaniu oględzin, o których mowa w pkt. 2. Narządy wewnętrzne przewozi się wraz ze zwierzęciem, stosownie do przepisów pkt. 4. Narządy wewnętrzne muszą być oznakowane jako przynależące do danego zwierzęcia.
4. Jeżeli w trakcie oględzin, o których mowa w pkt 2, nie zostaną stwierdzone żadne nietypowe cechy, a przed uśmierceniem zwierzęcia nie zostaną zaobserwowane żadne nietypowe zachowania i nie ma żadnych podejrzeń co do skażeń środowiska, przeszkolona osoba zobowiązana jest załączyć do ciała zwierzęcia opatrzone numerem oświadczenie stwierdzające powyższe fakty. Wszystkie ciała zwierząt opatrzone jednym oświadczeniem muszą trafić do jednego zakładu.

Właściwy organ może jednak zezwolić na wysyłanie głów zwierząt podatnych na zarażenie włośniem do zakładu technicznego zatwierdzonego zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w celu wytwarzania trofeów myśliwskich. W przypadku gdy wynik badania na obecność włośnia jest pozytywny, właściwy organ przeprowadza urzędową kontrolę, aby sprawdzić prawidłowość obchodzenia się z głową w zakładzie technicznym.

## Badanie sanitarno-weterynaryjne dziczyzny w zakładzie rozbioru i przetwórstwa dziczyzny

Pierwszej kolejności lekarz badający sprawdza oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia, a następnie przystępuje do właściwego badania sanitarno-weterynaryjnego poubojowego.

W przypadkach wątpliwych należy sprawdzić, czy:

- tusza przysłana do badania nie należy do zwierzęcia padłego
- osoba dostarczająca dziczyznę do punktu skupu posiada zezwolenie na odstrzał dostarczonego zwierzęcia
- zwierzę zostało pozyskane w inny sposób, niż to przewiduje prawo łowieckie, np. złapane we wnyki

W pierwszej kolejności wykonuje się badanie narządów wewnętrznych, głowy, a następnie tuszy. Podczas badania należy zwrócić uwagę na:

- oznaki naturalnej śmierci zwierzęcia
- choroby, które przenoszą się na ludzi i zwierzęta
- nowotwory
- rozsiane inwazje pasożytów w tkance podskórnej lub mięśniach
- zatrucia
- rozległe zranienia, rozległe wylewy krwawe oraz wodniste nacieki
- rozkład gnilny, zaparzenia
- znaczne zmiany dotyczące barwy, zapachu i smaku (próba gotowania, pieczenia)
- znaczne zmiany w konsystencji np. przy wodnicy
- zabrudzenia, których nie można usunąć przez dokładne oczyszczenie

Badanie laboratoryjne mięsa zwierząt łownych takie jak przy badaniu mięsa zwierząt rzeźnych.

Dziki → obowiązkowe badanie na włośnię

Wszelkie inne przepisy natury ogólnej mają takie samo zastosowanie, jak w przypadku badania zwierząt rzeźnych. Przy badaniu mięsa zwierząt łownych stosuje się przepisy związane z ustawą o zwalczaniu zaraźliwych chorób dotyczących zwierząt rzeźnych

## Ocena sanitarno-weterynaryjna

### Mięso zwierząt łownych:

- łosi, jeleni, danieli, saren, dzików i zajęcy → powinno być ocenione jako zdatne lub niezdatne
- ptaków łownych → również jako zdatne lub niezdatne (jak ptactwa domowego)

### Mięso uznaje się za nienadające się do spożycia przez ludzi (art. 28 rozp. 627)

- nienormalne zachowanie lub zaburzenie ogólnego stanu zwierzęcia żywego, zgłaszane przez myśliwego
- uogólnione występowanie guzów lub ropni na różnych narządach lub mięśniach
- zapalenie stawów, zapalenie jądra, zmiany patologiczne wątroby lub śledziony, stan zapalny okolicy jelitowej lub pępkowej
- obecność ciał obcych niewynikających ze sposobu polowania w jamach ciała, w żołądku lub jelitach czy też w moczu, w przypadku, gdy występuje przebarwienie opłucnej lub otrzewnej (gdy odpowiednie wnętrzości są przedstawione do badania)
- obecność pasożytów
- powstanie dużej ilości gazu w układzie trzewnym z przebarwieniem narządów wewnętrznych (gdy wnętrzości te przedstawione są do badania)
- znaczne anomalie w barwie, konsystencji lub zapachu tkanki mięśniowej lub narządów
- zestarzałe otwarte złamania
- wycieńczenie i/lub ogólny lub miejscowy obrzęk
- świeże zrosty opłucnej lub otrzewnej
- inne oczywiste rozległe zmiany, takie jak proces gnilny

## Dziczyzna – okresy przechowywania w chłodni (w miesiącach)

| Rodzaj dziczyzny           | -18,1 do -22°C | -22 do -30°C |
|----------------------------|----------------|--------------|
| Dziczyzna gruba w skórze   | 10             | 12           |
| Dziczyzna gruba oskórowana | 6 (8)          | 10           |
| Dziczyzna drobna           | 7              | 9            |

### Możliwości zagospodarowania tuszy zwierzyny przez myśliwego

- wzięcie na użytek własny
- wprowadzenie do obrotu - sprzedaż do punktu skupu zwierzyny łownej, sprzedaż bezpośrednia, sprzedaż w działalności MOL (marginalnej, ograniczonej, lokalnej)

### Wzięcie tuszy zwierzyny przez myśliwego na użytek własny – podstawa prawna

- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
- rozporządzenie MRiRW z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Definicja - pozyskiwanie mięsa, utrzymywanych w gospodarstwie cieląt do 6 miesiąca życia, świń, owiec, kóz, drobiu oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych albo pozyskiwanie przez myśliwego, w wyniku odstrzału, mięsa zwierząt łownych, przeznaczonego na własne potrzeby

**Mięso świń, nutrii oraz dzików poddaje się badaniu na obecność włośni jedną z metod określoną w załączniku do rozporządzenia komisji (we) nr 1375/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. na koszt**

- posiadacza tego mięsa lub
- podmiotu prowadzącego gospodarstwo, w którym dokonano uboju

### SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK DO BADANIA MIĘSA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI ORAZ ZASADY DOSTARCZANIA PRÓBEK DO URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII – ZAŁ. NR 2 DO ROZP. MRiRW Z 26 SIERPNIA 2015 R. – DZIKI

Pobiera się 6 próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, po jednej próbce z:

- mięśni każdego filara przepony w przejściu do części ścięgniastej
- mięśni żuchwowych
- mięśni przedramienia
- mięśni międzyżebrowych
- mięśni języka

84 kawałek? imo  
>14.6?  
miejsca pierwotne min 10g

Jeżeli nie można pobrać próbek niektórych wyżej wymienionych mięśni, wówczas pobiera się 4 próbki mięsa z mięśni, które są dostępne. Łączna masa pobranych próbek – min. 50 g

Niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały pobrane. Niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, nie później niż 48 godzin od dokonania odstrzału

Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone. Dostarczający próbki powinien poinformować o wieku i miejscu pochodzenia zwierzęcia oraz części zwierzęcia, z której zostały pobrane próbki

**Zaświadczenie o badaniu** - jeżeli w wyniku badania na obecność włośni próbek mięsa świń, nutrii i dzików (pobranych i dostarczonych zgodnie z art. 7 ust. 3) nie stwierdzono włośni – urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu badania próbek mięsa, które zawiera ww. informacje

Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso odstrzelonych dzików nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem jednego z ww. zaświadczeń

## Mięso niezdatne do spożycia

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania poubojowego, w tym również badania na obecność włośni, stwierdzono, że badane mięso zwierząt jest niezdatne do spożycia przez ludzi, urzędowy lekarz weterynarii znakuje tuszę znakiem weterynaryjnym w kształcie trójkąta równobocznego o długości boku 5 cm zawierającym:

- w górnej części – litery "PL"
- w dolnej części – litery "IW"



Znak weterynaryjny umieszcza się na zewnętrznej powierzchni tuszy przez opieczętownie jej znakiem przy użyciu tuszu lub przez znakowanie na gorąco lub zawieszce przymocowanej do tuszy.

Jeżeli w wyniku badania na obecność włośni próbek mięsa świń, nutrii i dzików stwierdzono włośnię

- powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję administracyjną w sprawie uznania mięsa za niezdatne do spożycia przez ludzi, określając w niej sposób postępowania z tym mięsem
- przed wydaniem ww. decyzji urzędowy lekarz weterynarii z urzędu pobiera próbki mięsa i przeprowadza ponowne badanie na koszt posiadacza mięsa

**Rozporządzenie mrirw z dnia 30 września 2015 r. W sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej określa**

- wymagania weterynaryjne przy produkcji i dla produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
- wielkość, zakres i obszar produkcji tych produktów
- wymagania weterynaryjne dla miejsc sprzedaży

**Sprzedaż bezpośrednia** - bezpośrednie dostawy dokonywane przez producentów lub myśliwych do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrujących konsumenta końcowego:

- małych ilości surowców (produkty produkcji pierwotnej)
- małych ilości mięsa drobiu i zajęczaków
- małych ilości zwierzyny łownej
- małych ilości dziczyzny

W ramach sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się

- tusze grubej zwierzyny łownej nieoskórowanej → temperatura przechowywania i transportu nie wyższa niż 7°C (narządy wewnętrzne do 3°C)
- tusze drobnej zwierzyny łownej niewypatroszonej → temperatura przechowywania i transportu nie wyższa niż 4°C

## Zasady

- sprzedażą bezpośrednią mogą być objęte wyłącznie produkty własne, wyprodukowane przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie
- podmiot prowadzący odpowiada za bezpieczeństwo zdrowotne produktów i spełnienie wymagań weterynaryjnych w zakresie prowadzonej działalności
- powiadomienie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowanej produkcji o jej zakresie i wielkości oraz rodzaju produktów, które mają być produkowane w zakładzie, co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem działalności
- miejsca sprzedaży
  - punkty na terenie gospodarstw, statków i miejsc sprzedaży dziczyzny
  - targowiska
  - zakłady prowadzące handel detaliczny dla konsumenta końcowego
  - specjalistyczne środki transportu