

Próba Ebera

- w probówce należy umieścić 1 ml odczynnika Ebera, zatykając szczelnie wylot probówki
- następnie pobrać niewielki kawałek mięsa i umieszczając go na pręciku szklanym wprowadzić do wnętrza probówki, na wysokość ok. 1 cm nad powierzchnię znajdującego się tam odczynnika
- przy stężeniu ok. 26 mg% amoniaku powstają po kilku sekundach szare lub niebieskawe opary salmiaku
- widoczne są one wyraźnie na ciemnym tle i stwierdzone już w początkowym okresie gnicia mięsa, kiedy to z reguły stężenie amoniaku wynosi ponad 30 mg%

Wykrywanie siarkowodoru – próba siarkowodorowa

- rozdrobnione mięso należy przenieść na płytkę Petriego i zamknąć nakrywką
- po wewnętrznej stronie nakrywki umieszcza się krążek bibuły nasączony 10% roztworem octanu ołowiowego
- w obecności siarkowodoru bibuła barwi się na kolor czarny

Badanie w świetle uv

- badane mięso należy umieścić w świetle analitycznej lampy kwarcowej emitującej promienie UV o długości fali 360-365 nm
- dochodzi wówczas do emitowania z badanego mięsa widocznej wzrokowo luminescencji
- oceniamy barwę mięsa

W świetle UV tkanki posiadają luminescencje

- jasnobrązową → świeże mięso wieprzowe
- ciemnobrązową → świeże mięso baranie
- niebieską → tkanka łączna
- jasnożółtą → tłuszcz
- czerwoną → mięso znajdujące się w stanie rozkładu, świecenie wywołane jest obecnością porfiryn będących produktem rozkładu mioglobiny

Inne metody – metody spektroskopii optycznej

- stosuje się do oznaczenia składników i włośności żywności oraz monitorowania procesów zachodzących w produktach spożywczych
- stosowane są w kontroli procesów technologicznych w przemyśle spożywczym
- na podstawie pojedynczego pomiaru widma można zoaczyć wiele składników właściwości produktów

Czujniki zapachu i technologia e-nose - są to sensory oparte na mechanizmie ludzkiego węchu

- działanie tych urządzeń oparte jest na chemicznej reakcji pomiędzy związkami zapachowymi i elektrochemicznymi sensorami
- najczęściej wykorzystywaną technologią są tranzystory polowe (MOS) i przewodzące polimery organiczne (CP)

Odbierane sygnały są następnie w sposób podobny jak w ludzkim mózgu poddawane analizie i w rezultacie łączone w końcowe wrażenie zapachowe

OCENA SANITARNO-WETERYNARYJNA ŚWIEŻOŚCI MIĘSA (ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/627)

Artykuł 45 – środki w przypadkach niezgodności z wymogami w zakresie świeżego mięsa. Urzędowy lekarz weterynarii uznaje świeże mięso za niezdatne do spożycia przez ludzi jeśli mięso to:

- wykazuje zmiany patologiczne lub organoleptyczne,
- w szczególności wyraźny zapach płciowy lub niedostateczne wykrwawienie (z wyjątkiem zwierząt łownych)