

Definicja – rozp. 2004/853 – „Zajęczaki” – oznaczają króliki, gryzonie i zające.

USTAWA z dnia 10 grudnia 2020r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich – zwierzęta futerkowe to zwierzęta gatunków:

- lis pospolity i polarny
- norka amerykańska
- tchórz
- jenot
- nutria
- szynszyla
- królik

utrzymywane w celu produkcji surowca dla przemysłu futrzarskiego, mięsnego i włókienniczego (z królików to np. szynszyl wielki lub belgijski olbrzym- gdzie futro to jest produkt uboczny).

Minimalne warunki utrzymywania królików

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 28 CZERWCA 2010R. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich inne niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE

- króliki utrzymuje się: na wolnym wybiegu pod zadaszeniem lub w pomieszczeniach inwentarskich w klatkach lub kojcach
- pojedynczo lub grupowo – zwierzęta stada podstawowego utrzymuje się pojedynczo
- samce i samice królików po osiągnięciu dojrzałości płciowej utrzymuje się oddzielnie

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: wysokość i szerokość klatek, powierzchnia podłogi w klatkach i kojcach.

Klasyfikacja królików rzeźnych ze względu na kolor okrywy włosowej:

- króliki białe (b) – z dopuszczalnymi innymi ubarwieniami na głowie, uszach i kończynach
- króliki kolorowe (k) – inne niż białe

Klasyfikacja królików rzeźnych ze względu na pochodzenie:

- króliki z chowu tradycyjnego (S) – przydomowe, żywione ekstensywnie
- króliki fermowe (T) – chów fermowy, żywienie wyłącznie pełnoporcjowymi paszami granulowanymi

Klasyfikacja ze względu na masę ciała

- klasa I → 2,2 do 5,5 kg
- klasa II → poniżej 2,2 kg i powyżej 5,5 kg

Jak oznaczamy królika? → królik rzeźny PN – R – 78310 II S b (klasa II, chów tradycyjny, biały) – zawsze w tej kolejności!!!

Transport do rzeźni (rozp. 2004/853)

- podczas odbioru i transportu zwierząt, trzeba się z nimi ostrożnie obchodzić, aby nie powodować u nich zbędnego niepokoju
- zwierzęta z objawami choroby lub pochodzące ze stad, o których wiadomo, że są skażone substancjami o znaczeniu dla zdrowia publicznego, można transportować do rzeźni wyłącznie za zgodą właściwych organów
- klatki do celów transportu zwierząt do rzeźni oraz moduły, jeśli są stosowane muszą być wykonane z materiału odpornego na korozję oraz muszą być łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. Niezwłocznie po opróżnieniu oraz, w razie konieczności, przed ponownym zastosowaniem, wszystkie urządzenia wykorzystywane do odbioru i dostaw żywych zwierząt muszą zostać oczyszczone, umyte i zdezynfekowane

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań.

Wymagania dla ubojni zajęczaków (rozp. 2004/853)

- Musi posiadać pomieszczenia lub zadaszoną powierzchnię do odbioru zwierząt oraz do nadania przedubojowego.
- Aby zapobiegać zanieczyszczeniu mięsa zakład musi:
 - Posiadać wystarczającą liczbę pomieszczeń właściwych do przeprowadzania poszczególnych etapów uboju
 - Posiadać oddzielne pomieszczenia do patroszenia i dalszej obróbki
- Zapewnić odrębne miejsca albo oddzielenie w czasie następujących czynności:
 - Ogłuszenie i wykrwawienie
 - Skórowanie
 - Wysyłka mięsa
- Posiadać instalację zapobiegającą styczności mięsa z podłogami ścianami i osprzętem
- Posiadać linie uboju zaprojektowane w sposób uniemożliwiający stały postęp procesu uboju i uniemożliwiający zanieczyszczenie krzyżowe różnych części linii uboju. W przypadku gdy w tych samych pomieszczeniach uruchomionych jest więcej linii uboju, muszą one być od siebie odpowiednio oddzielone, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu
- Muszą być wyposażone w urządzenia do dezynfekcji narzędzi z dopływem gorącej wody o temp. nie niższej niż 82°C. lub w alternatywnych systemach o równoważnym skutku
- urządzenie do mycia rąk dla pracowników mających styczność z mięsem niepakowanym wyposażone w kurki zaprojektowane w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
- urządzenia zamykane na klucz do chłodniczego przechowywania zatrzymanego mięsa, a także oddzielne urządzenia, również zamykane na klucz, do przechowywania mięsa uznanego za niezdatne do spożycia przez ludzi

Zakład musi posiadać wydzielone miejsce z odpowiednim urządzeniami do celów czyszczenia, mycia i dezynfekcji:

- urządzeń służących do transportu, takich jak klatki
- środki transportu

W zakładzie musi znajdować się odpowiednio wyposażone zamykane na klucz miejsce lub pomieszczenie do wyłącznego użytku służb weterynaryjnych.

Higiena w czasie uboju (rozp. 2004/853) – identyczne wymagania jak w przypadku z drobiu (wypisane wyżej pod tym samym tytułem „Higiena w czasie uboju”)

Oszalanie królików

- urządzenie bolcowe penetrujące i niepenetrujące
- broń palna z pociskiem
- uderzenie w głowę (rezerwowa metoda ogłuszania, inne wymagania)
- ogłuszenie elektryczne elektrodami położonymi jedynie z obu stron głowy
- ogłuszenie z elektrodami położonymi na głowie i ciele zwierzęcia
- tlenek węgla (czyste źródło) – zwierzęta futerkowe, sytuacje inne niż ubój
- tlenek węgla w połączeniu z innymi gazami) – zwierzęta futerkowe, sytuacje inne niż ubój
- śmiertelna iniekcja) – zwierzęta futerkowe, sytuacje inne niż ubój

Oszołomienie elektryczne – zalecenia to:

- 100 – 117 V
- 140 – 400 mA
- 50 Hz
- 1 – 3 sekundy

Opór głowy królików jest bardzo zmienny (300 – 1500 omów) przez futro i kontakt elektrod, dlatego przy tym samym napięciu prąd bardzo się różni.

ETAPY PROCESU TECHNOLOGICZNA

Wykrwawienie

- Na wisząco
- Przebiega w dwóch etapach
 - Przecięcie skóry w okolicy podżuchwowej
 - Przecięcie naczyń tętniczych i żylnych
- Czas – od 3 do 5 minut

Skórowanie - bezpośrednio po wykrwawieniu, systemem workowym: kończyny tylne, ogon, tułów, głowa, kończyny przednie

Wytrzewianie - 45min po oszłomieniu

- Przecięcie powłok brzusznych
- Usuwa się: jelita, żołądek, pęcherzyk żółciowy, pęcherz moczowy i narządy rozrodcze
- Następnie otwieramy jamę klatki piersiowej i usuwamy ośrodek

Znakowanie i pakowanie:

- Formowanie tuszki (cała tuszka, albo wycina się comber)
- Folie termokurczliwe
- Określenie masy
- Etykiety (na stronie grzbietowej) i plomby
- Temperatura w magazynie 12°C, jeśli mrożone -18°C

BADANIE PRZEDUBOJOWE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 625/2017 Z DNIA 15 MARCA 2017R. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzonych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin

Badanie przedubojowe przeprowadzane w rzeźni przez urzędowego lekarza weterynarii, któremu w kwestiach selekcji wstępnej zwierząt mogą pomagać przeszkoleni w tym celu urzędowi pracownicy pomocniczy.

W drodze odstępstwa, w odniesieniu do zajęczaków, badanie przedubojowe przeprowadzane przez urzędowego lekarza weterynarii, pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii lub, w przypadku gdy zastosowano wystarczające zabezpieczenia na odpowiedzialność urzędowego lekarza weterynarii.

BADANIE PRZEDUBOJOWE W RZEŹNI (ROZP. 2019/627)

- wszystkie zwierzęta przed ubojem poddawane są badaniu przedubojowemu
- badanie może być jednak ograniczone do reprezentatywnej próby zajęczaków z każdego gospodarstwa pochodzenia zajęczaków
- badanie przedubojowe następuje **w ciągu 24 godzin po przybyciu zwierząt do rzeźni i w czasie krótszym niż 24h przed ubojem**, urzędowy lekarz weterynarii może wymagać przeprowadzenia dodatkowego badania przedubojowego w dowolnym innym czasie

W ramach badania przedubojowego w szczególności ustala się, czy w przypadku konkretnego badanego zwierzęcia występują jakiegokolwiek oznaki:

- że zdrowie i dobrostan zwierzęcia zostały narażone na szwank
- stanu, nieprawidłowości lub choroby, z powodu których świeże mięso staje się niezdatne do spożycia przez ludzi lub które mogłyby mieć niepożądany skutek dla zdrowia zwierząt, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wykrywanie chorób odzwierzęcych oraz chorób zwierząt, w odniesieniu do których w rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono przepisy dotyczące zdrowia zwierząt

- stosowania zakazanych lub niedozwolonych substancji, niewłaściwego stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych lub obecności pozostałości chemicznych lub zanieczyszczeń

W ramach badania przedubojowego sprawdza się, czy podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze wypełniają obowiązek polegający na zapewnieniu, aby zwierzęta **miały czystą skórę lub runo**, tak aby uniknąć wszelkiego niedopuszczalnego ryzyka zanieczyszczenia świeżego mięsa podczas uboju

Urzędowy lekarz weterynarii przeprowadza badanie kliniczne wszystkich zwierząt, które ewentualnie zostały **odizolowane** przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze lub urzędowego pracownika pomocniczego w celu poddania ich dokładniejszemu badaniu przedubojowemu

Jeżeli badanie przedubojowe jest przeprowadzane w gospodarstwie pochodzenia urzędowy lekarz weterynarii w rzeźni przeprowadza badanie przedubojowe tylko **w określonych przypadkach i w określonym zakresie**.



BADANIE PRZEDUBOJOWE NA TERENIE GOSPODARSTWA (ROZP. 2019/624 – ARTYKUŁ 5)

Właściwy organ może zezwolić na przeprowadzenie badania przedubojowego zwierząt przeznaczonych do uboju w gospodarstwie pochodzenia.

Po przeprowadzonym badaniu lekarza weterynarii wystawia świadectwo zdrowia, które ważne jest 72h.

W odniesieniu do wszystkich gatunków stosuje się następujące kryteria i warunki:

- przeprowadzane są kontrole rejestrów lub dokumentacji w gospodarstwie pochodzenia, w tym weryfikacja informacji dotyczących łańcucha żywnościowego
- podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze ułatwia indywidualne badanie zwierząt, jeżeli jest to wymagane

Badania przedubojowe na terenie gospodarstwa pochodzenia obejmują badanie kliniczne zwierząt w celu ustalenia, czy:

- występuje w nich choroba lub stan, które mogą być przenoszone na zwierzęta lub ludzi przy obróbce lub przez spożycie takich zwierząt, lub też czy zachowują się indywidualnie lub zbiorowo, w sposób wskazujący, że taka choroba wystąpiła
- wykazują ogólne zaburzenia w zachowaniu, objawy choroby lub nieprawidłowości, które mogą powodować, że mięso z takich zwierząt nie jest zdatne do spożycia przez ludzi
- istnieją dowody lub powody, aby podejrzewać, że u zwierząt tych mogą występować pozostałości chemiczne przekraczające poziomy ustanowione w prawodawstwie unii lub pozostałości substancji zabronionych
- występują u nich oznaki wskazujące na problemy związane z dobrostanem zwierząt, w tym są nadmiernie zabrudzone
- nadają się do transportu

Kontrole i badanie przedubojowe na terenie gospodarstwa pochodzenia przeprowadzane są przez urzędowego lekarza weterynarii. Zwierzęta zdatne do uboju są właściwie identyfikowane i oddzielane od innych zwierząt oraz wysyłane do rzeźni bezpośrednio z gospodarstwa pochodzenia

Dla zwierząt zdatnych do uboju wydaje się świadectwo zdrowia określone w części I załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/628:

- świadectwo zdrowia towarzyszy zwierzętom w drodze do rzeźni lub jest wysyłane z wyprzedzeniem w dowolnej formie
- w świadectwie zdrowia zapisuje się wszelkie uwagi istotne dla późniejszej kontroli mięsa, świadectwo zdrowia ważne jest 72 h

W rzeźni przeprowadza się następujące dodatkowe kontrole

- regularna weryfikacja wypełniania przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze obowiązku zapewnienia prawidłowej identyfikacji zwierząt
- regularna weryfikacja tego, czy przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt są przestrzegane podczas transportu i w chwili przybycia zwierząt do rzeźni oraz czy występują objawy świadczące o stanie mogącym mieć niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt

W przypadku, gdy zwierzęta nie są poddawane ubojowi w ciągu trzech dni:

- jeżeli zwierzęta nie zostały wysłane z gospodarstwa pochodzenia do rzeźni, przeprowadza się dodatkowe badanie przedubojowe i wydaje się nowe świadectwo zdrowia
- jeżeli zwierzęta są już w drodze do rzeźni lub znajdują się w rzeźni, można zezwolić na ubój niezwłocznie po dokonaniu oceny przyczyny opóźnienia, o ile zwierzęta zostaną poddane dodatkowemu badaniu przedubojowemu zgodnie z art. 11 rozporządzenia wykonawczego komisji UE 2019/627

Badanie przedubojowe przeprowadzane jest przez:

- urzędowego lekarza weterynarii
- pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii
- lub w przypadku gdy zastosowano wystarczające zabezpieczenia, na odpowiedzialność urzędowego lekarza weterynarii.

BADANIE POUBOJOWE (2019/625)

Personel w rzeźni w zakładach dokonujących uboju zajęczaków może pomagać w wykonywaniu zadań związanych z badaniem poubojowym, pod warunkiem że:

- działa niezależnie od personelu produkcyjnego rzeźni
- został odpowiednio przeszkolony
- wykonuje te zadania w obecności urzędowego lekarza weterynarii lub urzędowego pracownika pomocniczego i zgodnie z ich poleceniami

Badaniu poubojowemu podlegają tusze i towarzyszące im podroby niezwłocznie po uboju. Właściwe organy mogą wymagać od podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze zapewnienia specjalnych urządzeń technicznych i wystarczającej powierzchni do kontroli podrobów.

Właściwe organy:

- sprawdzają wszystkie powierzchnie zewnętrzne w tym powierzchnie jam ciała tusz i podroby.
- Zwracają szczególną uwagę na wykrywanie chorób odzwierzęcych oraz chorób zwierząt, w odniesieniu do których w rozporządzeniu (UE) 429/2016 ustanowiono przepisy dotyczące zdrowia zwierząt

Szybkość przesuwu linii ubojowej i liczba obecnych pracowników przeprowadzających badanie muszą być takie, aby umożliwiać odpowiednie badanie.

Właściwe organy mogą zezwolić aby w przypadku gdy ani urzędowy lekarz weterynarii, ani urzędowy pracownik pomocniczy nie są obecni w rzeźni podczas uboju i obróbki poubojowej, badanie poubojowe było opóźnione o maksymalnie 24h od uboju pod warunkiem, że:

- Ubój przedmiotowych zwierząt odbywa się w rzeźni o niskiej wydajności, w której poddaje się ubojowi lub obróbce mniej niż 150 000 sztuk zajęczaków rocznie
- Zakład dysponuje wystarczającą infrastrukturą do przechowywania świeżego mięsa i podrobów, tak aby można było je zbadać
- Badanie poubojowe jest przeprowadzane przez urzędowego lekarza weterynarii