

Choroby bakteryjne małych przeżuwaczy: brucelloza, zakaźne zapalenie skóry, choroba Morella (powstawanie ropni w tkance podskórnej w okolicy węzłów chłonnych), gruźlica.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/627 Z DNIA 15 MARCA 2019 R. - Artykuł 20 – młode domowe owce i kozy oraz owce, u których nie wyróżniły się stałe siekacze

wiek młodych

Tusze i podroby owiec, którym nie wyróżnił się żaden stały siekacz lub które są w wieku poniżej 12 miesięcy, oraz kozy w wieku poniżej 6 miesięcy poddaje się następującym procedurom badania poubojowego:

- k) kontrola wzrokowa głowy, w tym gardła, jamy ustnej, języka oraz węzłów chłonnych przyusznicznych i zagardłowych (*Inn. parotidei et retropharyngiales*)

pp

badania te nie są konieczne jeżeli właściwe organy są w stanie zagwarantować, że głowa łącznie z językiem i mózgiem, będzie wyłączona ze spożycia przez ludzi

- l) kontrola wzrokowa płuc, tchawicy i przełyku oraz węzłów chłonnych tchawiczno-oskrzelowych i śródpiersiowych (*Inn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales*)
- m) kontrola wzrokowa osierdzia i serca
- n) kontrola wzrokowa przepony
- o) kontrola wzrokowa wątroby oraz węzłów chłonnych wątrobowych i trzustkowych (*Inn. portales*)
- p) kontrola wzrokowa przewodu pokarmowego, krezki oraz węzłów chłonnych żołądkowych i krezkowych (*Inn. gastrici, mesenterici craniales et caudales*)
- q) kontrola wzrokowa śledziony → śledziony nigdy nie nacinamy bo krew może zanieczyścić tkanki
- r) kontrola wzrokowa nerek
- s) kontrola wzrokowa opłucnej i otrzewnej
- t) kontrola wzrokowa okolicy pępkowej i stawów

Jeśli występują oznaki ewentualnego ryzyka dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dobrostanu zwierząt, wskazane zgodnie z art. 24 urzędowy lekarz weterynarii przeprowadza następujące procedury badania poubojowego przy zastosowaniu nacięć i badania dotykowego tusz i podrobów:

- a) badanie dotykowe gardła, jamy ustnej, języka oraz węzłów chłonnych przyusznicznych

O ile przepisy o wymaganiach zdrowotnych zwierząt nie przewidują inaczej, badania te nie są konieczne, jeżeli właściwe organy są w stanie zagwarantować, że głowa, łącznie z językiem i mózgiem, będzie wyłączona ze spożycia przez ludzi.

jałuc
wzrosty

- b) badanie dotykowe płuc, nacięcie płuc, tchawicy i przełyku oraz węzłów chłonnych tchawiczno-oskrzelowych i śródpiersiowych
- c) nacięcie serca
- d) badanie dotykowe wątroby i jej węzłów chłonnych, nacięcie trzewnej powierzchni wątroby w celu zbadania przewodów żółciowych
- e) badanie dotykowe śledziony
- f) nacięcie nerek i węzłów chłonnych nerkowych (*Inn. renales*)
- g) badanie dotykowe okolicy pępkowej i stawów - okolica pępkowa musi zostać nacięta, a stawy otwarte, zbadany musi zostać płyn maziowy

Artykuł 21 – inne domowe owce i kozy

1. Tusze i podroby owiec, którym wyróżnił się stały siekacz lub które są w wieku co najmniej 12 miesięcy, oraz kóz w wieku co najmniej 6 miesięcy poddaje się następującym procedurom badania poubojowego:

- a) kontrola wzrokowa głowy, w tym gardła, jamy ustnej, języka i węzłów chłonnych przyusznicznych oraz badanie dotykowe węzłów chłonnych zagardłowych

Badania te nie są konieczne, jeżeli właściwe organy są w stanie zagwarantować, że głowa, łącznie z językiem i mózgiem, będzie wyłączona ze spożycia przez ludzi.

Wątroba - dorosłe i młode

Płaca - różnica w bad. młodych i starych

- b) kontrola wzrokowa płuc, tchawicy i przełyku oraz węzłów chłonnych tchawiczno-oskrzelowych i śródpiersiowych (*Inn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales*)
- c) kontrola wzrokowa osierdza i serca
- d) kontrola wzrokowa przepony
- e) kontrola wzrokowa wątroby oraz węzłów chłonnych wątrobowych i trzustkowych (*Inn. portales*) - badanie dotykowe wątroby i jej węzłów chłonnych, nacięcie trzewnej powierzchni wątroby w celu zbadania przewodów żółciowych
- f) kontrola wzrokowa przewodu pokarmowego, krezki oraz węzłów chłonnych żołądkowych i krezkowych (*Inn. gastrici, mesenterici craniales et caudales*)
- g) kontrola wzrokowa śledziony
- h) kontrola wzrokowa nerek
- i) kontrola wzrokowa opłucnej i otrzewnej
- j) kontrola wzrokowa narządów płciowych (z wyjątkiem prącia, jeżeli już zostało usunięte)
- k) kontrola wzrokowa wymienia i jego węzłów chłonnych

Jeśli występują oznaki ewentualnego ryzyka dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dobrostanu zwierząt, wskazane zgodnie z art. 24 urzędowy lekarz weterynarii przeprowadza następujące procedury badania poubojowego przy zastosowaniu nacięć i badania dotykowego tusz i podrobów

- a) badanie dotykowe gardła, jamy ustnej, języka oraz węzłów chłonnych przyusznicznych

O ile przepisy o wymaganiach zdrowotnych zwierząt nie przewidują inaczej, badania te nie są konieczne, jeżeli właściwe organy są w stanie zagwarantować, że głowa, łącznie z językiem i mózgiem, będzie wyłączone ze spożycia przez ludzi.

- b) nacięcie płuc, tchawicy, przełyku oraz węzłów chłonnych tchawiczno-oskrzelowych i śródpiersiowych
- c) nacięcie serca
- d) badanie dotykowe śledziony
- e) nacięcie nerek i węzłów chłonnych nerkowych (*Inn. renales*)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY(WE) NR 999/2001 Z DNIA 22 MARCA 2001R. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii

Załącznik V definicja materiału szczególnego ryzyka:

Wymienione poniżej tkanki należy uznać za materiał szczególnego ryzyka, jeśli pochodzą od zwierząt pochodzących z Państwa członkowskiego lub państwa trzeciego lub jednego z ich regionów o kontrolowanym lub nieokreślonym ryzyku wystąpienia BSE + państwa członkowskie o znikomym ryzyku BSE.

W odniesieniu do owiec i kóz: czaszka, w tym mózg i oczy oraz rdzeń kręgowy zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy lub które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła

Badanie nadzwyczajne owiec i kóz - nacięcie i zbadanie następujących węzłów chłonnych

- szyjnych powierzchownych – *Inn. cervicales superficiales*
- pachowych właściwych – *Inn. axillares proprius*
- biodrowych przyśrodkowych – *Inn. iliaci mediales*
- biodrowych bocznych – *Inn. iliaci laterales*
- podbiodrowych (fałdu kolanowego) – *Inn. subiliaci*
- pachwinowych powierzchownych – *Inn. inguinales superficiales*
- podkolanowych – *Inn. poplitei*
- kulszowych – *Inn. ischiadici*

Przykłady systemu klasyfikacji zapalenia płuc:

- jeżeli zapalenie płuc obejmuje mniej niż 10% tkanki, uznaje się je za łagodne
- jeżeli zapalenie płuc obejmuje 10-20% tkanki, uznaje się je za umiarkowane
- jeżeli zapalenie płuc obejmuje ponad 20% tkanki uznaje się je za ciężkie

Zapalenie płuc u owcy wywołane są głównie przez bakterie z rodzaju *Mycoplasma* i *Pasterella*.

Makroskopowe zmiany w płucach:

- Dobrze odgraniczone obszary konsolidacji i czerwono-szare przebarwienia obejmujące doczaszkowe płaty płuc
- Dobrze odgraniczone obszary konsolidacji i czerwono-szare przebarwienia oraz ropień
- Wielogniskowe obszary konsolidacji obejmujące zarówno doczaszkowe, jak i doogonowe płaty płuc
- Podopłucnowa konsolidacja tkanki
- Zapalenie opłucnej
- Wyсіk śluzowo-ropny w drogach oddechowych
- Zapalenie zachyłkowe płuc
- Mieszane zakażenia dorosłych osobników odkryte na oskrzelach i oskrzelikach
- Guzki – wywołane tasiemczycą
- Obraz skonsolidowanych i rozdmowych plam na powierzchni płuc
- Torbiel z drobnym płynem
- Całkowicie osadzona jałowa torbiel z płynem powstałym
- Rozedma płuc
- Masywne przekrwienie płuc

TECHNOLOGIE UBOJU NIEPORZARZYSTOKOPYTNYCH

Oszałamianie koniowatych - najczęściej wykorzystywaną metodą pozbawienia koniowatych świadomości przed ubojem jest oszałamianie mechaniczne za pomocą urządzeń bolcowych penetrujących (pistolet trzpieniowy typu Radical)

Technologia uboju

- 1 ogłuszanie
- 2 wykrwawienie
- 3 odcinanie kończyn w stawie nadgarstkowym i ⁶ pęcinowym
- 5 skórowanie
- 6 oddzielenie głowy od tuszy i jej przepołowienie
- wytrzewienie
- podział tuszy

ART. 15

Jeżeli wymaga tego badanie poubojowe, urzędowy lekarz weterynarii może zażądać cięcia wzdłuż głowy lub tuszy dowolnego zwierzęcia.

Urzędowy lekarz weterynarii wymaga aby tusze zwierząt gospodarskich nieparzystokopytnych, bydła w wieku powyżej 8 miesięcy i świń domowych w wieku powyżej 5 tygodni przedstawiano mu do badania poubojowego rozcięte podłużnie na półtusze, wzdłuż kręgosłupa

Art. 22 – zwierzęta gospodarskie nieparzystokopytne

Tusze i podroby zwierząt gospodarskich nieparzystokopytnych poddaje się następującym procedurom badania poubojowego:

- a) kontrola wzrokowa głowy, oraz po uwolnieniu języka, kontrola wzrokowa gardła - język musi zostać uwolniony tak, aby umożliwić szczegółową kontrolę wzrokową jamy ustnej i cieśni gardzieli i musi zostać poddany kontroli wzrokowej

- b) kontrola wzrokowa płuc, tchawicy, przełyku oraz węzłów chłonnych tchawiczno-oskrzelowych i śródpiersiowych (*Inn. bifurcationes, eapiales et mediastinales*)
- c) kontrola wzrokowa osierdza i serca
- d) kontrola wzrokowa przepony
- e) kontrola wzrokowa wątroby oraz węzłów chłonnych wątrobowych i trzustkowych (*Inn. portales*)
- f) kontrola wzrokowa przewodu pokarmowego, krezki oraz węzłów chłonnych żołądkowych i krezkowych (*Inn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales*)
- g) kontrola wzrokowa śledziony
- h) kontrola wzrokowa nerek
- i) kontrola wzrokowa opłucnej i otrzewnej
- j) kontrola wzrokowa narządów płciowych ogierów (z wyjątkiem prącia, jeżeli już zostało usunięte) i klaczy
- k) kontrola wzrokowa wymienia i jego węzłów chłonnych (*Inn. supramammari*)
- l) kontrola wzrokowa okolicy pępkowej i stawów młodych zwierząt
- m) badanie mięśni i węzłów chłonnych (*Inn. subrhomboidei*) łopatki poniżej chrząstki łopatki po uwolnieniu przyczepu jednej łopatki u koni siwych, aby zbadać je w kierunku **melanozy oraz czerniaka**
- n) nerki muszą zostać odsłonięte → u koni siwych !

Jeśli występują oznaki ewentualnego ryzyka dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dobrostanu zwierząt, wskazane zgodnie z art. 24 urzędowy lekarz weterynarii przeprowadza następujące procedury badania poubojowego przy zastosowaniu nacięć i badania dotykowego tusz i podrobów:

- a) badanie dotykowe i nacięcie węzłów chłonnych podżuchwowych, zagardłowych i przyusznicznych (*Inn. mandibulares, retropharyngiales et parotidei*), badanie dotykowe języka
- b) badanie dotykowe płuc, badanie dotykowe i nacięcie węzłów tchawiczno-oskrzelowych i śródpiersiowych

Tchawicę i główne odgałęzienia oskrzeli otwiera się wzdłuż ich przebiegu, natomiast płuca nacina się w ich 3 płacie tylnym, prostopadle do ich głównych osi. Nacięcia nie są jednak konieczne, jeśli płuca wyłączone są ze spożycia przez ludzi

- c) podłużne serca, tak aby otworzyć komory i przeciąć przegrodę międzykomorową
- d) badanie dotykowe i nacięcie wątroby oraz węzłów chłonnych wątrobowych i trzustkowych (*Inn. portales*)
- e) nacięcie węzłów chłonnych żołądkowych i krezkowych
- f) badanie dotykowe śledziony
- g) badanie dotykowe nerek i nacięcie nerek oraz węzłów chłonnych nerkowych (*Inn. renales*)
- h) nacięcie węzłów chłonnych nadwymieniowych
- i) badanie dotykowe okolicy pępkowej i stawów młodych zwierząt - w przypadku wątpliwości okolica pępkowa musi zostać nacięta, a stawy otwarte, zbadany musi zostać płyn maziowy
- j) nacięcie przez całą nerkę u koni siwych

Art. 31 – praktyczne rozwiązania dotyczące kontroli urzędowych pod kątem włośni podczas badania poubojowego

- tusze świnowatych, nieparzystokopytnych i innych gatunków podatnych na włośnię są badane na obecność włośni (*Trichinella*) zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/1375
- mięso zwierząt zarażonych włośnią uznaje się za **niezdatne do spożycia przez ludzi**

Artykuł 32 – praktyczne rozwiązania dotyczące kontroli urzędowych pod kątem nosaczyny podczas badania poubojowego

W przypadku zwierząt nieparzystokopytnych z państwa członkowskiego lub państwa trzeciego lub jego regionu, które nie spełniają kryteriów światowej organizacji zdrowia zwierząt dotyczących państwa wolnego od nosaczyny, nieparzystokopytne bada się pod kątem nosaczyny przeprowadzając **dokładne badanie błony śluzowej tchawicy, krtani, jam i zatok nosowych oraz ich rozgałęzień, po rozcięciu głowy w płaszczyźnie środkowej i usunięciu przegrody nosowej.**

Badanie nadzwyczajne zwierząt nieparzystokopytnych - nacięcie i zbadanie następujących węzłów chłonnych

- szyjnych powierzchownych – *Inn. cervicales superficiales*
- pachowych właściwych – *Inn. axillares proprius*
- biodrowych przyśrodkowych – *Inn. iliaci mediales*
- biodrowych bocznych – *Inn. iliaci laterales*
- podbiodrowych (fałdu kolanowego) – *Inn. subiliaci*
- pachwinowych powierzchownych – *Inn. inguinales superficiales*
- podkolanowych – *Inn. poplitei*

77. U KOGO BADAMY STAWY? u młodego bydła i młode świnki, owce i kozy