

Sultan Of Oman
Ministry of Health
Royal Hospital



سلطنة عمان
وزارة الصحة
المستشفى السلطاني

Document Management System



Sultanate of Oman
Ministry of Health
The Royal Hospital
Department of Child Health

Code: CH-GI-GUD-8-Vers.1.0

Effective Date: 02/07/2024

Target Review Date: 31/08/2028

Title: Bowel preparation for colonoscopy procedures in children

Your child is booked for a colonoscopy procedure, please come to the Endoscopy Unit

On _____ **(date)** at _____ **(time).**

(The Endoscopy Unit is on the 1st floor, opposite to the outpatient clinic)

How to “clean out” your child’s bowels before the colonoscopy procedure?

1. Always take Picolax ® exactly as your doctor has told you.
2. Have your child drink plenty of clear fluids: water, clear juices, chicken or beef broth.
3. Follow the instructions in the chart for your child’s age.
4. 1 Sachet of Picolax ® powder should be dissolved in 250 ml of water or clear juice and approximately 100 ml of water or clear juice if you are measuring two spoonfuls of powder. Sometimes the solution becomes hot as Picolax ® dissolves. If this happens, wait until it cools sufficiently before drinking it.

5 and below 9 years	- Regular breakfast Clear fluids only (nothing to eat) from noon until 6 hours before the procedure - At 12:00 PM: first dose is 1 sachet of Picolax (Picolax® powder should be dissolved in 250 ml of water or clear juice) - At 04:00 PM: second dose is 2 spoonful of Picolax (Pour the powder in approximately 100 ml of water or clear juice) - At 08:00 PM: take 5 mg of Bisacodyl.	from noon before colonoscopy until 6 hours before the procedure. Bowel movements must be clear like water and no particles!
9 years and over	- Regular breakfast Clear fluids only (nothing to eat) from noon until 6 hours before the procedure - At 12:00 PM: first dose is 1 sachet of Picolax (Picolax® powder should be dissolved in 250 ml of water or clear juice) - At 04:00 PM: second dose is 1 sachet of Picolax (Same way as first sachet) - At 08:00 PM: 9 years old: take 5 mg of Bisacodyl. 10 years and over: take 10 mg of Bisacodyl.	If your child does not tolerate the clean out prep (vomits or refuses the medications) Call the Pediatric GI Doctor on-call

WHAT TO DRINK AND EAT TO PREPARE FOR COLONOSCOPY

ALLOWED	NOT ALLOWED
Everything that is clear and you can see through it	NO iron supplements
Clear soups, chicken or beef broth	NO milk or cream products
Clear drinks- no red or purple color	NO soy products
Clear fruits juices- no pulp, no red or purple color	NO nuts, seeds or salad for 48 hours
Jelly- no red or purple color	
Black tea, coffee- no milk or cream	
Water	
NO PULP= APPLE, GRAPE, CRANBERRY	

طفلك لديه موعد لإجراء تنظيف القولون , الرجاء الحضور الى قسم المناظير

اليوم _____ التاريخ _____

(وحدة المناظير في الطابق الأول, مقابل العيادات الخارجية)

ما هي التحضيرات قبل المنظار؟

نرجو منكم اتباع الخطوات التالية قبل يوم واحد من المنظار (إن التقيد بتعليمات الطبيب مهم جدا حتى يصبح القولون نظيفا, فكلما كان القولون أنظف كلما كان التنظير بحثا عن الأمراض أكثر نجاحا). في حالات نادرة يتوجب تأجيل التنظير إذا شعر الطبيب أن القولون غير نظيف الى الحد الكافي

قبل منظار القولون يتم تنظيف القولون تنظيفا شاملا بحيث تكون الرؤية أفضل ما يمكن, لذلك لتصفية القولون من الفضلات, يجب اخذ محلول بيكولاكس 1, دواء مسهلا قد يسبب لديه إسهالا شديدا ينظف القولون من كل البراز الذي فيه

بالإضافة بتناول دواء بيزوكوديل في الليل قبل بيوم المنظار

يجب ان يبدأ الطفل بإخراج فضلات ذات لون صافي و سائل كالماء 3.

إثناء التحضير يجب الامتناع عن جميع الأغذية والأطعمة الصلبة مثل الخبز و الأرز و الفواكهة 4.

يجب الحرص على ان الطفل لا يصبه الخمول و الجفاف بتشجيعه على اخذ و الاكثار من تناول السوائل 5.

العمر	التغذية	
5 إلى أقل من 9 سنوات	- اخذ الفطور العادي. - تناول السوائل الصافية فقط من الساعة الثامنة عشر ظهرا إلى 6 ساعات قبل إجراء تنظير القولون. - عند الساعة الثانية عشر ظهرا: ابدأ بتناول الطرف الأول من البيكولاكس بعد تفريره ب 250 مل من الماء (ما يعادل كوب واحد) ومن ثم تناول 8 إلى 10 أكواب من الماء خلال ساعتين، بعد ذلك بساعة إلى ثلاث ساعات سيحدث لديك إسهال مائي. - عند الساعة الرابعة مساء تناول 2 ملاعق من بودرة البيكولاكس (فرع بودرة البيكولاكس في 100 مل من الماء) - عند الساعة الثامنة مساء تناول حبة البيزاكوديل 5 مج	لا تناول الأغذية الصلبة (كالخبز و التمر...). تناول السوائل الصافية فقط طوال اليوم و حتى منتصف الليل (نظر القلعة في الأسفل). يجب التوقف عن تناول جميع السوائل عند منتصف الليل. إذا لديك أي استفسار حول تعليمات تنظيف القولون أو رفض الطفل أو عدم تحمل أخذ محلول البيكولاكس، الرجاء الاتصال بالطبيب العنايب لخدمة الجهاز الهضمي للأطفال
9 سنوات فما فوق	- اخذ الفطور العادي. - تناول السوائل الصافية فقط من الساعة الثامنة عشر ظهرا إلى 6 ساعات قبل إجراء تنظير القولون. - عند الساعة الثانية عشر ظهرا: ابدأ بتناول الطرف الأول من البيكولاكس بعد تفريره ب 250 مل من الماء (ما يعادل كوب واحد) ومن ثم تناول 8 إلى 10 أكواب من الماء خلال ساعتين، بعد ذلك بساعة إلى ثلاث ساعات سيحدث لديك إسهال مائي. - عند الساعة الرابعة مساء تناول الطرف الثاني من البيكولاكس (نفس طريقة الطرف الأول) - عند الساعة الثامنة مساء: 9 سنوات: تناول حبة البيزاكوديل 5 مج. 10 سنوات فما فوق: تناول حبة البيزاكوديل 10 مج.	
قائمة الأغذية المسموحة و الأغذية الممنوعة عند تحضير المريض لإجراء تنظير القولون		
المسموحة	الممنوعة	
- الحليب و مشتقاته كاللبن و القشطة - منتجات الصويا - مركبات و منتجات الحديد - المكسرات و الحبوب و السلطة يجب عدم تناولها قبل التنظير ب 48 ساعة على الأقل - لب التفاح و العنب و التوت	- الحساء الصافي كمرق الدجاج أو مرق اللحم البقري - المشروبات و العصائر الصافية الغير محتوية على الاصبغة الحمراء أو الأرجوانية. - الشاي الاسود، و القهوة بدون حليب أو القشطة - الماء	

Written By: Dr.Fathiya Al Harthy

Checked By: Dr.Khoula Al Said / Dr.Tawfiq Al Lawati / Ph.Wijdan Hashimani

Authorized by: KHOULA JULENDA AL SAID

Review Details

Review BY	Review Date
1 Dr.Sami Al Farsi	27/01/2021



© Copyright 2018 reserved 'Royal Hospital- Information
Technology Department'