

دائرة التخدير والعناية المركزة

الفهرس

- معلومات عن التخدير ودور طبيب التخدير

- أنواع التخدير

- الصيام قبل العملية الجراحية والاجراءات الطبية
التي تتم تحت التخدير

- توصيات مهمة قبل التخدير
بعيادة التخدير- يوم العملية- بعد الاستيقاظ من
التخدير

ودور طبيب التخدير معلومات عامة عن التخدير

من هو طبيب التخدير؟

هو الطبيب المتخصص في التخدير والسيطرة على الألم والعناية بالمرضى قبل وأثناء وبعد العمليات الجراحية أو أي إجراءات طبية تحتاج الى تخدير. طبيب التخدير هو جزء حيوي من الفريق الطبي لضمان سلامة المرضى وراحتهم أثناء العمليات الجراحية. من خلال معرفته بأنواع التخدير المختلفة واستخدامها حسب الحالة، يضمن طبيب التخدير تجربة جراحية آمنة وفعالة

ما هو دور طبيب التخدير؟

تقييم حالة المريض الصحية قبل الجراحة: يقوم طبيب التخدير بتقييم صحة المريض، معرفة التاريخ الطبي، وأي حالات مرضية مزمنة أو جراحية سابقة أو حساسية
اختيار نوع التخدير المناسب (عام- موضعي- نصفي): حسب نوع العملية، الصحة العامة للمريض، والاحتياجات الفردية للمريض
مراقبة الوظائف الحيوية للمريض أثناء العملية الجراحية: يبقى طبيب التخدير مع المريض لمراقبة التنفس، نبض القلب، وضغط الدم، وضمان استقرار الحالة الرعاية بعد العملية: يتابع طبيب التخدير حالة المريض بعد الإفاقة ويقدم التوصيات اللازمة للتحكم في الألم وإجراءات الرعاية اللاحقة

ما هي أنواع التخدير؟

التخدير العام

ما هو؟ يضع المريض في حالة نوم عميق ويفقد الوعي تماماً أثناء الجراحة
كيف يتم؟ يتم عن طريق استنشاق غازات مخدرة أو حقن مواد مخدرة عبر الوريد
متى يُستخدم؟ في العمليات الجراحية الكبرى التي تحتاج إلى عدم إحساس المريض بأي شيء طوال مدة الجراحة، مثل جراحات القلب أو البطن

التخدير الموضعي

ما هو؟ يتم تخدير منطقة صغيرة من الجسم، بينما يبقى المريض مستيقظاً
كيف يتم؟ عن طريق حقن المادة المخدرة في الأنسجة المحيطة بالمنطقة المراد تخديرها
متى يُستخدم؟ في الجراحات البسيطة مثل خلع الأسنان أو إزالة الشامات أو الخزعات الجلدية أو خياطة الجروح العميقة أو عمليات تصحيح النظر بالليزر

التخدير النصفى (الشوكي أو فوق الجافية)

ما هو؟ يتم تخدير الجزء السفلي من الجسم دون فقدان الوعي
كيف يتم؟ عن طريق حقن المخدر في منطقة العمود الفقري
متى يُستخدم؟ في العمليات الجراحية الخاصة بالبطن، الحوض، أو الأطراف السفلية، مثل الولادة القيصرية

التخدير الواعي (التهدئة)

ما هو؟ يشعر المريض بالاسترخاء والنعاس ولكنه يظل واعياً جزئياً ويمكنه الاستجابة للتوجيهات
كيف يتم؟ بإعطاء أدوية مهدئة عن طريق الفم أو الوريد
متى يُستخدم؟ في الإجراءات البسيطة أو المؤلمة نسبياً مثل تنظير القولون أو بعض إجراءات الأسنان

الصيام قبل العملية الجراحية والتخدير

يُعد الصيام قبل العملية الجراحية والتخدير من أهم التعليمات التي يجب على الطبيب تزويدها للمريض، يختلف مقدار الوقت الذي لا يُسمح للمريض بتناول الطعام والشراب خلاله قبل العملية حسب العمر وحالة المريض ونوع العملية ونوع الطعام الذي يتم تناوله قبل يوم من العملية على الأقل.

فعلى سبيل المثال: إذا تناول المريض أطعمة غنية بالبروتين والأطعمة الدهنية كوجبة أخيرة فيجب أن تكون فترة الصيام أطول لأن هذه الأطعمة تستغرق وقتاً أطول للهضم.

لماذا يجب عليّ الصيام قبل العملية؟

هناك أنواع مختلفة من العمليات الجراحية؛ حيث يتم إجراء بعضها تحت تأثير التخدير الموضعي بينما يتطلب البعض الآخر تخديراً مناعياً أو تخديراً عاماً. لا يُسمح للمريض بتناول الطعام والشراب قبل العملية التي يتم إجراؤها تحت التخدير.

تحت التخدير العام تتوقف ردود الفعل الطبيعية في الحلق وحركات الجهاز الهضمي بشكل مؤقت، فإذا كانت المعدة المريض ممتلئة وهو في هذا الوضع فهناك خطر حدوث القيء أو إرجاع الطعام إلى الحلق، وبالتالي قد تشق جزيئات الطعام طريقها بسهولة إلى الرئتين أو المسالك الهوائية وتسبب الاختناق أو إيذاء الجهاز التنفسي.

حتى في الحالات التي تتطلب تخديراً موضعياً – وبسبب احتمال حدوث مشاكل أثناء العملية مثل شعور المريض بالألم أثناء العملية أو عدم تعاونه مع الفريق الطبي – فقد يتم وضع المريض تحت التخدير العام أو المهدئ

لذلك يُطلب من جميع المرضى الصيام قبل العملية بغض النظر عن نوع التخدير الذي يخطط لإجرائه من أجلهم.

ما هي أهمية الصيام قبل العملية الجراحية أو الإجراءات التي تتم تحت التخدير؟

تجنب المضاعفات الرئوية والانتان
تقليل خطر الغثيان والقيء
تجنب استنشاق الطعام
تقليل خطر الالتهابات خصوصاً إذا كانت العملية بالجهاز الهضمي

ماذا يحدث إذا لم أصم قبل العملية؟

إذا لم تصم قبل العملية فقد يؤدي ذلك إلى مخاطر خطيرة أثناء التخدير ومن أهمها:

-الارتجاع ودخول الطعام إلى الرئتين مما قد يسبب التهاباً رئوياً حاداً قد يكون مهدداً للحياة
-انسداد مجرى الهواء والاختناق مما قد يسبب نقص الاوكسجين وتلفاً في الرئتين والدماغ

ماذا تفعل إذا أكلت أو شربت بالخطأ؟

إبلاغ الطبيب فوراً حتى يتمكن من اتخاذ الإجراء المناسب سواء بتأجيل العملية أو تعديل خطة التخدير
لا تحاول إخفاء الأمر لأن المخاطر قد تكون شديدة إذا تم إجراء التخدير دون معرفة الطبيب بذلك

ماذا لو أجريت لي عملية إسعافية طارئة؟

في حالة العمليات الطارئة حيث لا يكون هناك وقت كاف للصيام، يتخذ الأطباء إجراءات خاصة لتقليل مخاطر ارتجاع محتويات المعدة إلى الرئتين أثناء التخدير
إذا كنت في موقف طارئ لا تقلق لكن أخبر الطبيب فوراً بأخر مرة أكلت أو شربت فيها ليتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة

ما الذي يُسمح لي بتناوله قبل العملية؟

قبل العملية بعدة أيام أو أسابيع: حاول أن تتناول أطعمة صحية غنية بالألياف مثل الفاكهة والخضروات، وبالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات حيث إنها ضرورية لجسمك لخوض عملية الشفاء بعد العملية بأفضل ما يمكن. اتبع نظام غذائي قليل الدسم حيث أنه يقلل من احتمالية حدوث آثار جانبية العملية.

قبل 48 ساعة من عمليتك على الأقل: تجنب الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء و السجائر، ومن الضروري تجنب الإفراط في تناول الطعام أو تناول الأطعمة بطيئة الهضم مثل البقوليات والخضروات قبل فترة الصيام للعملية الذي يتراوح ما بين ٦ إلى ٨ ساعات؛ وبدلاً من ذلك تناول وجبة خفيفة مثل الحساء

لمدة ساعتين قبل العملية: يمكنك شرب السوائل الصافية (الماء أو الشاي الأسود الخفيف أو القهوة السوداء وليس الحليب أو منتجات الألبان) سيساعدك ترطيب الجسم – الذي من الأفضل أن يتم بالماء – على تحمل العملية بشكل أفضل، وهذا مهم بشكل خاص في الطقس الحار

ما هي المدة التي يجب عليّ أن أصومها قبل العملية الجراحية أو الإجراءات الطبية تحت التخدير؟

البالغين

الأطعمة الصلبة: يجب الامتناع عن تناول الطعام لمدة ٦-٨ ساعات قبل العملية

الحليب ومشتقات الألبان المختلفة والمشروبات التي تحتوي على الدهون أو المشروبات الغازية: يجب التوقف عن تناولها قبل ٦ ساعات على الأقل.

مضغ العلكة: يجب الامتناع عن مضغ العلكة لمدة ٦ ساعات قبل العملية
السوائل الصافية (مثل الماء، العصائر الصافية بدون لب، الشاي أو القهوة بدون حليب): يمكن تناولها حتى ساعتين قبل العملية

إذا توجب على المرضى تناول الأدوية خلال فترة الصيام وسمح لهم الطبيب بتناول تلك الأدوية: يتم تناولها مع رشفة قليلة من الماء

الأطعمة الصلبة: يجب الامتناع عن تناول الطعام لمدة ٦-٨ ساعات قبل العملية

مضغ العلكة: يجب الامتناع عن مضغ العلكة لمدة ٦ ساعات قبل العملية

الحليب الصناعي او الحليب البقري: يجب الامتناع لمدة ٦ ساعات قبل العملية

حليب الام: الصيام لمدة ٤ ساعات قبل العملية

مشتقات الالبان المختلفة والمشروبات الغازية: يجب التوقف عن تناولها قبل ٦ ساعات على الأقل

السوائل الصافية (مثل الماء، العصائر الصافية بدون لب، الشاي/قهوة بدون حليب، محلول الجلوكوز): يمكن تناولها حتى ساعتين قبل العملية

إذا توجب على الطفل تناول الأدوية خلال فترة الصيام وسمح لهم الطبيب بتناول تلك الادوية: يتم تناولها مع رشفة قليلة من الماء

تعليمات الصيام قبل العمليات الجراحية أو الإجراءات الطبية تحت التخدير	
السوائل الصافية	ساعتين الماء، العصائر الصافية بدون لب، الشاي/قهوة بدون حليب، محلول الجلوكوز
حليب الام	٤ ساعات
الحليب الصناعي والحليب الحيواني	٦ ساعات
مشتقات الالبان	٦ ساعات
المشروبات الغازية والعلكة	٦ ساعات
وجبة خفيفة	٦ ساعات عصير باللب، فواكه، حساء، خضروات
وجبة دسمة	٨ ساعات اللحم، وجبة عالية بالدهون، البطاطا المقلية

مثال	العمليات الفترة الصباحية	العمليات الفترة المسائية
آخر وجبة دسمة	قبل منتصف الليل	قبل الساعة ٦ ص
آخر وجبة خفيفة	قبل الساعة ٢ ص	قبل الساعة ٨ ص
المشروبات الغازية / العلكة	قبل الساعة ٢ ص	قبل الساعة ٨ ص
مشتقات الالبان	قبل الساعة ٢ ص	قبل الساعة ٨ ص
الحليب الصناعي/ الحيواني	قبل الساعة ٢ ص	قبل الساعة ٨ ص
حليب الام	قبل الساعة ٤ ص	قبل الساعة ١٠ ص
السوائل الصافية	قبل الساعة ٦ ص	قبل الساعة ١٢ م

توصيات مهمة قبل التخدير

بعيادة التخدير

- مناقشة الطبيب بكافة الأمراض التي تُعاني منها، وخصوصاً: السكري و الربو، وأمراض الدم، وارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والشرابين والخدران في الأطراف وإخباره في حال معاناتك من متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم
- اخبار الطبيب إذا كنت قد أجريت أي عملية جراحية بالسابق
- اخبار الطبيب في حال تعرضك لمضاعفات التخدير في السابق
- اخبار الطبيب في حال تعرض أي من افراد اسرتك لمضاعفات من التخدير العام
- في حالة وجود مضخة للأسولين او لصقه تحت الجلد لقياس السكر او لصقة دواء تحت الجلد الرجاء ابلاغ الفريق الطبي
- في حالة وجود منظم للقلب ابلاغ الفريق الطبي
- ابلاغ الطبيب إذا كنت تعاني من أي نوع من الحساسية
- ابلاغ الطبيب عن كافة الادوية التي تتناولها بما في ذلك العلاجات الشعبية والاعشاب

في يوم العملية

- الحضور الى جناح الترقيد في الوقت المحدد لك
- اتباع توصيات الصيام قبل العملية
- احظار جميع الادوية الموصوفة لك عند قدومك للمستشفى واطار الطاقم الطبي عن جميع الادوية التي تتناولها بما في ذلك العلاجات الشعبية والاعشاب
- اتباع التوصيات الخاصة بالأدوية المسموح تناولها في يوم العملية
- فقد يطلب منك الالتزام بأخذ أدويةك قبل إجراء العملية التي تحتاج تخدير عام، ولكنه يُوصيك بشربها مع رشفة قليلة جداً من الماء
- الامتناع عن تناول بعض الأدوية لمدة أسبوع قبل العملية، مثل مميعات الدم
- الامتناع عن تناول بعض الأعشاب والمكملات الغذائية، مثل: الثوم، وعشبة الجنسنج (Ginseng)، ونبته الجنكة (Ginkgo biloba)
- إخبار طبيبك في حال كنت مريض سكري، فقد يطلب منك إيقاف جميع أدوية علاج ارتفاع السكر بالدم الفموية في صباح يوم إجراء العمل
- يرجى الاستحمام في الصباح عند قدومك للمستشفى
- ارتداء ملابس مريحة وسهلة الارتداء.
- من الأفضل عدم التزين بأي نوع من المجوهرات: الخواتم، والأساور، والأقراط والقلائد.
- من الأفضل عدم وضع أي ماكياج، وخاصة طلاء الأظافر، لأنها تتداخل مع رصد الأوكسجين في الدم.
- إذا كنت تضعي اظافر صناعية/ الاكرليك فيرجى إزالة الاظافر من اصبعين على الأقل
- إزالة الرموش الصناعية
- لن تتمكن من ارتداء العدسات اللاصقة اثناء العملية، لذلك يجب ان تحضر علبة للعدسات والمحلول الخاص. من الممكن ارتداء النظارات الطبية
- في حالة الحاجة إلى آلة سمع أو طقم أسنان محمول، نبّه طاقم التمريض.
- لعمليات اليوم الواحد: الحضور للمستشفى مع شخص بالغ مسؤول لمرافقتك الى المنزل والبقاء معك لمدة ٢٤ ساعة بعد العملية

نصائح بعد الاستيقاظ من التخدير العام

- لا تستطيع قيادة السيارة لمدة ٢٤ ساعة بعد خضوعك للتخدير العام واحظر مرافق لأخذك
- لا تستطيع استخدام الآلات لمدة ٢٤ ساعة بعد خضوعك للتخدير العام
- لا تستطيع التوقيع على أوراق قانونية لمدة ٢٤-٤٨ ساعة بعد خضوعك للتخدير العام
- لا تستطيع استخدام وسائل النقل العام عن مغادرتك المستشفى بعد العملية الجراحية وسوف تحتاج ان يتم نقلك الى المنزل بالسيارة وذلك لضمان حصولك على قدر من الراحة ولضمان سرعة عودتك للمستشفى في حال تعرضك لاي مضاعفات
- مراقبة أي أعراض جانبية بعد الخروج من المستشفى وإخبار الطبيب بها
- اخذ قسط من الراحة
- الالتزام بتعليمات الطبيب بشأن الادوية والاطعمة التي يجب تناولها تبعاً لنوع العملية التي تم اجراءها.
- تجنب شرب الأعشاب المختلفة بعد اجراء العملية الجراحية لمدة يوصي بها الطبيب قد تستمر عدة اسابيع