


أنبوب التغذية عن طريق الجلد إلى المعدة بالمنظار (PEG):

ما هو PEG؟

هو إجراء يتم بموجبه إدخال أنبوب تغذية مباشرة في المعدة من خلال شق صغير في جدار البطن يسمح بتغذية الطعام مباشرة إلى المعدة.

كيف يتم الإجراء؟

يتم إدخال (المنظار) أنبوب من طويل مزود بكاميرا عبر الفم عبر المريء (أنبوب الطعام) إلى المعدة. سيسمح الضوء والهواء الموجودان في المعدة بعد ذلك بتمرير إبرة بسلك توجيه بدقة عبر الجلد إلى المعدة. سيتم إدخال أنبوب التغذية (أنبوب PEG) بأنواع السلك التوجيهي ثم يتم سحب سلك التوجيه بواسطة المنظار الداخلي.



يتم تثبيت أنبوب التغذية في مكانه في جدار المعدة بواسطة "ممتص" داخلي وخارجي لمنع انزلاق الأنبوب وإزاحته.

عادة ما يتم إجراء المنظار تحت التخدير وتستهلك حوالي 15-20 دقيقة.

المضاعفات المحتملة:

نزيف

إرتجاع السوائل للزرة

إلتهاب حول فتحة الأنبوب

تسرب حول فتحة الأنبوب

خروج الأنبوب من مكانه أو إفصاكه

طريقة استخدام الأنبوب للتغذية والأدوية

اغسل يديك بالماء والصابون

تأكد من أن رأس المريض في وضع أعلى من المعدة

إجمع المواد التي تحتاجها (حقنة فارغة، ماء، دواء، تركيبة جاهزة)

قم بتركيب الحقنة الفارغة إلى الأنبوب

إملأ الحقنة بالتركيبة الجاهزة

إنشطف الأنبوب بـ 20-30 مل من الماء

إذا كان دوائك على شكل أقراص فأسأل الصيدلي إذا كان بإمكانك طحن القرص إلى مسحوق ناعم وحلته جيدا مع الماء الدافئ

إنشطف الأنبوب بـ 20-30 مل من الماء

لا تخلط الأدوية معا



العناية بأنبوب التغذية المعدية؟

لا تدع الحقنة تفرغ تماما أثناء الإطعام

اغسل الحقنة بالماء والصابون بعد كل استخدام

تفقد الجلد حول موضع التركيب بحتا عن أي علامات للتهيج أو العدوى

تنظيف الجلد حول فتحة الأنبوب مرة إلى مرتين يوميا

إبقاء المكان جافا ونظيفا اغسل الأنبوب بالماء لمنع تراكم بقايا الأكل داخله



متى يجب زيارة الطبيب؟

تورم الجلد أو التهيج الشديد

خروج الأنبوب من مكانه

حدوث ألم قوي في مكان الأنبوب

خروج دم أو صديد من موضع الأنبوب

إسداد الأنبوب

ما هي مدة صلاحية الأنبوب داخل المعدة؟


يمكن للأنبوب أن يستقر في معدتك لعدة سنوات إذا تمت مراعاته والإعتناء به

Percutaneous endoscopic gastrostomy tube teaching

PEG Tube (percutaneous endoscopic gastrostomy) is a soft, plastic feeding tube that goes from abdominal wall into the stomach and allows nutritional support over a period of time.

How PEG tube inserted?

Under direct visualization with the endoscope a PEG tube passes through the skin of the abdomen through a very small incision and into the stomach.



Complications:

- 1- Bleeding
- 2- Peri stomal leakage
- 3- Blockage
- 4- Tube dislodgement
- 5- Pulmonary aspiration

How do I care for my PEG?

- Hand washing before and after dealing with the peg.
- If peg becomes clogged try to unclog it as soon as you can by flushing the tube with 60ml syringe filled with warm water.
- Check the tube daily (check the length of the tube from the end to where it goes into the body. If it gets longer it may be at risk for coming out.

- Always close the caps on the PEG and its adapter when not in use.
- Check the bumper (is a piece that goes around the tube) it shouldn't be too tight or too loose.
- Clean the skin around the tube 1-2 times each day and keep the area dry.


- Use topical medicines as directed by physician.

When should I seek immediate care?

- If started vomiting or coughing during or after feeding
- Blood or fluid leak from the peg tube site
- Peg tube came out
- The skin around the tube is red, swollen, draining pus and fever.
- The tube is blocked


How to give feed through PEG tube?

- Wash hands
- Gather supplies needed (formula, water medications, syringe)
- Prepare formula or medication
- Inspect the peg tube and skin around it.
- Insert the feeding syringe into connecting tube.
- Unclamp the tube
- Pour formula into syringe; raise the syringe to make the formula go in faster.
- Flush the tube with water
- Clamp the tube and close the cap.
- Clean syringe with soap and water and keep it dry



How to give medications through PEG?

- If liquid medicine can be given directly through a PEG tube
- If pills should be crushed to make powder and then mix it with water
- If capsule, open the capsule and mix the content with water.
- Make sure it dissolves completely and draw up all the mixture into a syringe
- Add water to the syringe and flush medication completely.



How long the tube last?

On an average PEG tube last up to 2yrs or more if taken care of properly.