

# Aufgabenblatt 4, Mathematik für Physiker 1

Florian Adamczyk, Finn Wagner

14.11.2021

## A 5.1

Sei  $c_n := \sqrt[n]{n} - 1$ , zu zeigen:

$$n = (1 + c_n)^n \geq 1 + \frac{n(n-1)}{2} c_n^2$$

Einsetzen der allgemeinen binomischen Formel

$$(1 + c_n)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} c_n^k$$

Ausklammern der ersten drei Terme

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} c_n^k = \binom{n}{0} 1^n c_n^0 + \binom{n}{1} 1^{n-1} c_n^1 + \binom{n}{2} 1^{n-2} c_n^2 + \sum_{k=3}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} c_n^k$$

Es gilt  $n \in \mathbb{N}$  und damit  $n \geq 1$ . Die  $n$ -te Wurzel von  $n$  ist größer gleich 1. Somit  $c_n \geq 0$ . Ein Binomialkoeffizient kann ebenfalls nicht negativ werden. Alle Terme auf der rechten Seite der Gleichung sind also positiv, als Produkt von 1 und  $c_n$ . Wir schätzen nun nach unten ab, indem wir Terme weglassen.

$$\binom{n}{0} 1^n c_n^0 + \binom{n}{1} 1^{n-1} c_n^1 + \binom{n}{2} 1^{n-2} c_n^2 + \sum_{k=3}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} c_n^k \geq \binom{n}{0} 1^n c_n^0 + \binom{n}{2} 1^{n-2} c_n^2$$

Vereinfachen:

$$\binom{n}{0} 1^n c_n^0 + \binom{n}{2} 1^{n-2} c_n^2 = 1 + \frac{n!}{(n-2)! * 2!} c_n^2 = 1 + \frac{n(n-1)}{2} c_n^2$$

Die Aussage ist bewiesen.

Nun ist zu zeigen, dass  $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$  für  $n \rightarrow \infty$ . Es gilt:

$$\begin{aligned} n &\geq 1 + \frac{n(n-1)}{2} c_n^2 \quad | -1 / n(n-1) \\ &\Leftrightarrow \frac{n-1}{n(n-1)} \geq \frac{c_n^2}{2} \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{n} \geq \frac{c_n^2}{2} \end{aligned}$$

Da  $c_n$  immer größer ist als 0, ist auch  $\frac{c_n^2}{2}$  immer größer als 0. Es gilt insgesamt:

$$\frac{1}{n} \geq \frac{c_n^2}{2} \geq 0$$

Mit dem Sandwichtheorem folgt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n^2}{2} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} 0$$

$$0 \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n^2}{2} \geq 0$$

Es folgt, dass der Grenzwert von  $c_n$  0 ist.  $\sqrt[n]{n}$  konvergiert damit gegen 1.

Zu zeigen: Für  $a > 0$  gilt  $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$  für  $n \rightarrow \infty$

Ab einem  $n$  groß genug,  $N \in \mathbb{N}$   $n \geq N$  gilt:

$a \leq n$  für alle  $n$ , daraus folgt  $\sqrt[n]{a} \leq \sqrt[n]{n}$

1. Fall  $a = 1$

Ist  $a = 1$ , so konvergiert  $\sqrt[n]{1}$  trivialerweise gegen 1.

2. Fall  $1 < a$

Da die  $n$ -te Wurzel einer Zahl  $a$  größer als 1 auch immer größer gleich 1 sein muss gilt:

$$1 \leq \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{n}$$

Mit dem Sandwichtheorem folgt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 \leq \sqrt[n]{a} < \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$$

$$1 \leq \sqrt[n]{a} \leq 1$$

Die Folge  $\sqrt[n]{a}$  konvergiert gegen 1.

3. Fall  $1 > a > 0$

Wie von Aufgabenblatt 4 bekannt, lässt sich eine reelle Zahl  $a$  beliebig nah durch eine rationale Zahl  $q$  nähern. Für alle unendlich viele, immer besser werdende Näherungen von  $a$  gilt:

$$q = \frac{x}{y} \Leftrightarrow \sqrt[n]{q} = \sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}}$$

Der Grenzwert aller Folgen  $(q_n)_n$  ist gleich 1, als Bruch aus zwei konvergenten Folgen, die beide nicht Null werden.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} = \frac{1}{1}$$

Da der Grenzwert der Folge  $\sqrt[n]{a}$  für alle Näherungen von  $a$  gleich 1 ist, konvergiert die Folge gegen 1.

Es gilt für  $a > 0$  konvergiert  $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$  wenn  $n \rightarrow \infty$

## A 5.2

Wir definieren die Folgen

$$a_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad b_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

Zu zeigen:  $(a_n)_n$  ist monoton wachsend: Es muss gelten:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$$

Definition einsetzen:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}$$

FEHLT! Macht man den Nenner kleiner, so Es gilt also insgesamt:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \geq 1$$

$(a_n)_n$  ist damit monoton wachsend

Zu zeigen:  $(b_n)_n$  ist monoton fallend: Es muss gelten:

$$\frac{b_n}{b_{n+1}} \geq 1$$

Definition einsetzen:

$$\frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2}}$$

Es gilt weitere Abschätzung:

$$\left(\frac{1}{n+1}\right) < \left(\frac{1}{n}\right) \Rightarrow \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) < \left(1 + \frac{1}{n}\right) \Rightarrow \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{n+1}}\right) > \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{n}}\right)$$

Schätzt man damit ab gilt:

$$\frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2}} > \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+2}}$$

Macht man den Nenner k, indem man die Potenz kleiner macht folgt:

$$\frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+2}} > \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}} = 1$$

Es gilt also insgesamt:

$$\frac{b_n}{b_{n+1}} > 1$$

$(b_n)_n$  ist damit monoton fallend

Zu zeigen  $(b_n)_n$  ist nach unten beschränkt: Abschätzen nach unten mit Bernoulli-Ungleichung  
 $(1+x)^n \geq 1+nx$

$$b_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n > 1 + (n+1)\frac{1}{n} = 1 + \frac{n}{n} + \frac{1}{n} = 2 + \frac{1}{n} > 2 > 0$$

Damit ist  $(b_n)_n$  nach unten beschränkt und da auch monoton fallend, konvergent.

Zu zeigen  $(a_n)_n$  ist nach unten beschränkt:  
Dafür  $a_n < b_n$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

Da  $(b_n)_n$  nach unten beschränkt und monoton fallend ist, ist  $a_n < b_0$ . Damit ist  $(a_n)_n$  nach oben beschränkt und da auch auch monoton wachsend, konvergent.

Zu zeigen  $(a_n)_n$  und  $(b_n)_n$  konvergieren gegen den gleichen Grenzwert.  
Equivalent ist: Zu zeigen die Folge  $(c_n)_n$   $c_n = a_n - b_n$  ist eine Nullfolge.

$$\begin{aligned} c_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \\ &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 - \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) \\ &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(-\frac{1}{n}\right) \\ &= -a_n \frac{1}{n} \end{aligned}$$

Da wir wissen, dass  $(a_n)_n$  konvergiert und  $\frac{1}{n}$  gegen 0 konvergiert, folgt, dass  $(c_n)_n$  eine Nullfolge ist.  $(a_n)_n$  und  $(b_n)_n$  konvergieren also gegen den gleichen Wert.

## A 5.3

- (i)  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$   
Sei  $q \in \mathbb{R}$ ,  $0 < q < 1$

$$\text{Zu zeigen: } \sqrt[n]{|x_n|} < q \Leftrightarrow \sqrt[n]{\left|\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}\right|} < q$$

Wurzel umformen:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n \cdot n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$$

Bruch umformen:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n \cdot 1 + \frac{1}{n}}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{n}}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{e} = q < 1$$

Weil  $\sqrt[n]{|x_n|} < q$  gegen  $\frac{1}{e}$  konvergiert, folgt daraus, dass es ein  $N \in \mathbb{N}$  gibt, sodass für alle  $n \geq N$   $\sqrt[n]{|x_n|} < q$  gilt. Die Voraussetzungen für das Wurzelkriterium sind also erfüllt. Die

Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$  konvergiert.

- (ii)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 - 3n + 1}{n^3 + n^2 - n}$   
Es gelte  $x_n \neq 0 \forall n \geq n_0$  Sei  $q \in \mathbb{R}$ ,  $0 < q < 1$

$$\text{Zu zeigen: } \frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} \leq q \forall n \geq N$$

Geht nicht mit dem Quotientenkriterium

- (iii)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^n}$  Sei  $q \in \mathbb{R}$ ,  $0 < q < 1$

$$\text{Zu zeigen: } \sqrt[n]{|x_n|} < q \Leftrightarrow \sqrt[n]{\left|\frac{2^n}{n^n}\right|} < q$$

Wurzel umformen,  $x_n$  ist immer positiv:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left|\frac{2^n}{n^n}\right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{2^n}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} = 0 < q$$

Weil  $\sqrt[n]{|x_n|} < q$  gegen 0 konvergiert, folgt daraus, dass es ein  $N \in \mathbb{N}$  gibt, sodass für alle  $n \geq N$   $\sqrt[n]{|x_n|} < q$  gilt. Die Voraussetzungen für das Wurzelkriterium sind also erfüllt. Die Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^n}$  konvergiert.

- (iv)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$   
Sei  $q \in \mathbb{R}$ ,  $0 < q < 1$

$$\text{Zu zeigen: } \frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} < q \Leftrightarrow \frac{\left|\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\right|}{\left|\frac{n!}{n^n}\right|} < q$$

Betragsstriche weglassen, da alle Terme immer positiv sind und vereinfachen:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left|\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\right|}{\left|\frac{n!}{n^n}\right|} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! n^n}{(n+1)^{n+1} n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{n!} \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{n!} \frac{n^n}{(n+1)^n (n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)}{(n+1)} \frac{n^n}{(n+1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \end{aligned}$$

Bruch umformen

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n \cdot 1 + \frac{1}{n}}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{n}}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{e} = q < 1$$