

# Aufgabenblatt 3, Mathematik für Physiker 1

Florian Adamczyk, Finn Wagner

28.10.2021

## A 3.1

Seien  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$

(a)

$$\begin{aligned} ab &\leq \frac{1}{2}\left(a^2x^2 + \frac{b^2}{x^2}\right) \text{ für alle } x \in \mathbb{R} \quad | \cdot 2 \\ \Leftrightarrow ab &\leq \frac{a^2x^2}{2} + \frac{b^2}{2x^2} \quad | \cdot 2 \\ \Leftrightarrow 2ab &\leq a^2x^2 + \frac{b^2}{x^2} \quad | - 2ab \\ \Leftrightarrow 0 &\leq a^2x^2 + \frac{b^2}{x^2} - 2ab \quad | \text{ mit } x^2 \text{ erweitert} \\ \Leftrightarrow 0 &\leq \frac{a^2x^4}{x^2} + \frac{-2abx^2}{x^2} + \frac{b^2}{x^2} \\ \Leftrightarrow 0 &\leq \frac{1}{x^2}(a^2x^4 - 2abx^2 + b^2) \quad | \cdot x^2 \text{ Binomische Formel} \\ \Leftrightarrow 0 &\leq (ax^2 - b)^2 \end{aligned}$$

Ein Quadrat ist immer größer gleich Null

(b)

$$\begin{aligned} ab + bc + ac &\leq a^2 + b^2 + c^2 \quad | \cdot 2 \\ \Leftrightarrow 2ab + 2bc + 2ac &\leq 2a^2 + 2b^2 + 2c^2 \\ \text{Umformen mit: } -2ab - 2bc - 2ac &\text{ und Umsortieren} \\ \Leftrightarrow 0 &\leq (a^2 - 2ab + b^2) + (a^2 - 2ac + c^2) + (b^2 - 2bc + c^2) \\ &\text{2.te Binomische Formel anwenden:} \\ \Leftrightarrow 0 &\leq (a - b)^2 + (a - c)^2 + (b - c)^2 \end{aligned}$$

Ein Quadrat ist immer größer gleich Null.

Eine Summe aus Quadrate ist ebenfalls immer größer gleich Null

(c)

$$\frac{a}{b} < \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$$

1. Richtung

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} &\Leftrightarrow a * (b+d) < b * (a+c) \\ &\Leftrightarrow ab + ad < ba + bc \quad | -ab \\ &\Leftrightarrow ad < bc \quad | /b /d \\ &\Leftrightarrow \frac{a}{b} < \frac{c}{d} \end{aligned}$$

2. Richtung

$$\begin{aligned} \frac{a+c}{b+d} < \frac{ad}{cb} &\Leftrightarrow (a+c) * d < (b+d) * c \\ &\Leftrightarrow ad + cd < bc + dc \quad | -cd \\ &\Leftrightarrow ad < bc \quad | /b /d \\ &\Leftrightarrow \frac{a}{b} < \frac{c}{d} \end{aligned}$$

(d) Summe macht Flo

## A 3.2

(a)

Für  $n \in \mathbb{N}$  und  $x > -1$  gilt die Bernoulische Ungleichung:

$$(1+x)^n \geq 1+nx$$

**Induktionsanfang mit  $n = 0$ :**

$$1+x^0 \geq 1 \geq 1+0x$$

**Induktionsschritt**

$$(1+x)^n \geq 1+nx \Rightarrow (1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$$

$$(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$$

$$\Rightarrow (1+x)^n * (1+x) \geq 1+nx+x$$

Anwenden der Induktionsvoraussetzung

$$\Rightarrow (1+x)^n * (1+x) \geq (1+nx) * (1+x)$$

Ausmultiplizieren

$$\Rightarrow (1+nx) * (1+x) = 1+nx+nx^2$$

$$\Rightarrow 1+nx+x+nx^2 \geq 1+nx+x \quad | -x -nx -1$$

$$\Rightarrow nx^2 \geq 0$$

Ein Quadrat ist immer größer gleich Null

**Da Induktionsanfang und Schritt gelten,**  
**ist die Aussage für alle natürlichen Zahlen gültig**

(b)

$$q \in \mathbb{R}, q \neq 1; \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

**Induktionsanfang mit  $n = 0$  :**

$$\sum_{k=0}^0 q^k = q^0 = 1 = \frac{1 - q^{0+1}}{1 - q} = \frac{1 - q}{1 - q} = 1$$

**Induktionsschritt**

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n q^k &= \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \Rightarrow \sum_{k=0}^{n+1} q^k = \frac{1 - q^{n+2}}{1 - q} \\ \sum_{k=0}^{n+1} q^k &= \frac{1 - q^{n+2}}{1 - q} \\ \Leftrightarrow q^{n+1} + \sum_{k=0}^n q^k &= \frac{1 - q^{n+1} * q}{1 - q} \mid - q^{n+1} \\ \Leftrightarrow \sum_{k=0}^n q^k &= \frac{1 - q^{n+1} * q}{1 - q} - q^{n+1} \mid \text{Letzten Summand erweitern} \\ \Leftrightarrow \sum_{k=0}^n q^k &= \frac{1 - q^{n+1} * q}{1 - q} - \frac{q^{n+1} * (1 - q)}{1 - q} \\ \Leftrightarrow \sum_{k=0}^n q^k &= \frac{1 - q^{n+1} * q}{1 - q} - \frac{q^{n+1} - q^{n+1} * q}{1 - q} \\ \Leftrightarrow \sum_{k=0}^n q^k &= \frac{1 - q^{n+1} * q - q^{n+1} + q^{n+1} * q}{1 - q} \\ \Leftrightarrow \sum_{k=0}^n q^k &= \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \end{aligned}$$

**Da Induktionsanfang und Schritt gelten,  
ist die Aussage für alle natürlichen Zahlen gültig**

(c)

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \quad n! \leq 4 * \left(\frac{n}{2}\right)^{n+1}$$

**Induktionsanfang mit  $n = 1$  :**

$$1! = 1 = 4 * \left(\frac{1}{2}\right)^{1+1} = 4 * \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1$$

**Induktionsschritt**

$$n! \leq 4 * \left(\frac{n}{2}\right)^{n+1} \Rightarrow (n+1)! \leq 4 * \left(\frac{n+1}{2}\right)^{n+2}$$

$$(n+1)! = n! * (n+1)$$

Verwenden der Induktionsannahme

$$\Rightarrow n! * (n+1) \leq 4 * \left(\frac{n}{2}\right)^{n+1} * (n+1)$$

$$\text{Als Hilfstern: } \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \geq 2 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\text{Da gilt: } \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \xRightarrow{\text{Bernoulli Ungleichung}} 1 + \frac{n+1}{n}$$

$\frac{n+1}{n}$  ist immer größer gleich 1 für  $n \in \mathbb{N}$ . Dieser Wert  $+1$  ist also größer als 2

$$\Rightarrow \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}}{2} \geq 1$$

Abschätzen nach oben mit Faktor größer gleich 1

$$4 * \left(\frac{n}{2}\right)^{n+1} * (n+1) \leq 4 * \left(\frac{n}{2}\right)^{n+1} * (n+1) * \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}}{2}$$

Vereinfachen

$$= 4 * \left(\frac{n}{2}\right)^{n+1} * \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} * \frac{(n+1)}{2}$$

Vereinfachen

$$= 4 * \left(\frac{n}{2} * \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)^{n+1} * \frac{(n+1)}{2}$$

Ausmultiplizieren

$$= 4 * \left(\frac{n}{2} + \frac{1}{2}\right)^{n+1} * \frac{(n+1)}{2}$$

Vereinfachen

$$= 4 * \left(\frac{n+1}{2}\right)^{n+1} * \frac{(n+1)}{2}$$

Faktor einklammern

$$= 4 * \left(\frac{n+1}{2}\right)^{n+2}$$

Damit gilt der Induktionsschritt

**Da Induktionsanfang und Schritt gelten,  
ist die Aussage für alle natürlichen Zahlen gültig**

## A 3.3

(a)

$$M_1 = \{1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$$

Zu zeigen: 1 ist eine obere Schranke von  $M_1$

$$1 - \frac{1}{n} \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \text{Es folgt } 0 \leq \frac{1}{n} \\ \Rightarrow 1 \text{ ist eine obere Schranke von } M_1$$

Zu zeigen: 1 ist die kleinste obere Schranke von  $M_1$

Angenommen 1 wäre nicht die kleinste obere Schranke,

so gäbe es eine kleinere im Abstand  $\epsilon$

Sei  $\epsilon > 0 \in \mathbb{R}$

$$1 - \frac{1}{n} \leq 1 - \epsilon \Rightarrow \epsilon \leq \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Nach Lemma 2.18 gilt aber  $\epsilon \leq 0$  Das ist aber ein Widerspruch, da  $\epsilon > 0$

$\Rightarrow$  Somit war die Annahme falsch, es gibt keine kleinere obere Schranke.

1 ist das Supremum von  $M_1$

Zu zeigen: 1 ist Maximum von  $M_1$

$$1 - \frac{1}{n} = 1 \Rightarrow \frac{1}{n} = 0 \Rightarrow 1 = 0$$

Die Annahme war falsch  $M_1$  hat kein Maximum

Zu zeigen: 0 ist eine untere Schranke von  $M_1$

$$0 \leq 1 - \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{1}{n} \leq 1 \Rightarrow 1 \leq n$$

Alle natürliche Zahlen sind größer gleich 1

0 ist eine untere Schranke von  $M_1$

Zu zeigen: 0 ist die größte untere Schranke von  $M_1$

Angenommen 0 wäre nicht die größte untere Schranke,

so gäbe es eine größere im Abstand  $\epsilon$

Sei  $\epsilon > 0 \in \mathbb{R}$

$$0 + \epsilon \leq 1 - \frac{1}{n} \Rightarrow \epsilon + \frac{1}{n} \leq 1$$

Sei  $n = 1$

$$\Rightarrow \epsilon + 1 = 1 \Rightarrow \epsilon = 0$$

Da  $\epsilon$  größer als Null sein muss ist dies ein Widerspruch

$\Rightarrow$  Somit war die Annahme falsch, es gibt keine größere untere Schranke.

0 ist das Infimum von  $M_1$

Zu zeigen: 0 ist Minimum von  $M_1$

$$0 = 1 - \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{1}{n} = 1 \Rightarrow n = 1$$

0 ist Minimum von  $M_1$

Die Menge  $M_1$  ist nach oben beschränkt und hat in 1 ein Supremum, jedoch kein Maximum.

Die Menge ist außerdem nach unten beschränkt und hat in 0 ein Infimum und Minimum

(b)

$$M_2 = \{t \in \mathbb{R}, t \text{ ist obere Schranke von } M_1\}$$

In (a) haben wir das Supremum von  $M_1$  als 1 festgestellt. Jede weitere obere Schranke muss also größer sein als 1. Die Menge lässt sich umschreiben als:

$$M_2 = \{x \geq 1, x \in \mathbb{R}\}$$

Und das wiederum als:

$$[1, \infty)$$

Die Menge  $M_2$  ist also nach Definition nach unten beschränkt mit dem Supremum von  $M_1$ , 1 ist damit Infimum und da es in der Menge liegt auch Minimum von  $M_2$ .  $M_2$  ist aber nicht nach oben beschränkt, da eine obere Schranke beliebig viel größer sein kann als das Supremum. Oder trivial abzulesen aus der Intervallschreibweise.

(c)

$$M_3 = \left\{ \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n : n \in \mathbb{N} \right\}$$

Zu zeigen: 1 ist eine obere Schranke von  $M_3$

$$\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow 1 - \frac{1}{n^2} \leq 1$$

$$\Rightarrow 0 \leq \frac{1}{n^2} \Rightarrow 0 < 1$$

$\Rightarrow$  1 ist eine obere Schranke von  $M_3$

Zu zeigen: 1 ist die kleinste obere Schranke von  $M_3$

Angenommen 1 wäre nicht die kleinste obere Schranke,

so gäbe es eine kleinere im Abstand  $\epsilon$

Sei  $\epsilon > 0 \in \mathbb{R}$

$$\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \leq 1 - \epsilon$$

Anwenden der Bernoulli-Ungleichung

$$1 - \epsilon \geq \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \geq 1 - n * \frac{1}{n^2} = 1 - \frac{1}{n}$$

$$\Rightarrow 1 - \epsilon \geq 1 - \frac{1}{n}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{n} \geq \epsilon \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Nach Lemma 2.18 gilt aber  $\epsilon \leq 0$ . Das ist aber ein Widerspruch, da  $\epsilon > 0$

$\Rightarrow$  Somit war die Annahme falsch, es gibt keine kleinere obere Schranke.

1 ist das Supremum von  $M_3$

Zu zeigen: 1 ist Maximum von  $M_3$

$$\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n = 1 \Rightarrow 1 - \frac{1}{n^2} = 1$$

$$\Rightarrow 0 = \frac{1}{n^2} \Rightarrow n^2 = 0 \Rightarrow n = 0$$

$n$  kann nicht null sein da in der Definition von  $M_3$  durch  $n$  geteilt wird.

Die Annahme war falsch  $M_3$  hat kein Maximum

Zu zeigen: 0 ist eine untere Schranke von  $M_3$

$$0 \leq \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \Rightarrow 0 \leq 1 - \frac{1}{n^2}$$

$$\frac{1}{n^2} \leq 1 \Rightarrow 1 \leq n^2 \Rightarrow 1 \leq n$$

Alle natürliche Zahlen sind größer gleich 1

0 ist eine untere Schranke von  $M_1$

Zu zeigen: 0 ist die größte untere Schranke von  $M_3$

Angenommen 0 wäre nicht die größte untere Schranke,

so gäbe es eine größere im Abstand  $\epsilon$

Sei  $\epsilon > 0 \in \mathbb{R}$

$$0 + \epsilon \leq \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \text{ Sei } n = 1$$

$$\Rightarrow 0 + \epsilon \leq \left(1 - \frac{1}{1^2}\right)^1$$

$$\Rightarrow \epsilon \leq 0^1 \Rightarrow \epsilon \leq 0$$

Da  $\epsilon$  größer als Null sein muss ist dies ein Widerspruch

$\Rightarrow$  Somit war die Annahme falsch, es gibt keine größere untere Schranke.

0 ist das Infimum von  $M_3$

Zu zeigen: 0 ist Minimum von  $M_3$

$$0 = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \Rightarrow 0 = 1 - \frac{1}{n^2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{n^2} = 1 \Rightarrow 1 = n^2 \Rightarrow n = 1 \text{ ist Minimum von } M_3$$

Die Menge  $M_3$  ist nach oben beschränkt und hat in 1 ein Supremum, jedoch kein Maximum.  
Die Menge ist außerdem nach unten beschränkt und hat in 0 ein Infimum und Minimum