**UNIVERSIDAD DEL NORTE SANTO TOMÁS DE AQUINO**
**Facultad de Ciencias de la Salud — Licenciatura en Nutrición**
**CÁTEDRA DE NUTRICIÓN INFANTIL — EVALUACIÓN PARCIAL**

# RECUPERATORIO 2° PARCIAL

**Apellido y Nombre:** _____ **UP :** _____

| Pregunta | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| **Pregunta 1** | [ ] A | [ ] B | [ ] C | [ ] D |
| **Pregunta 2** | [ ] A | [ ] B | [ ] C | [ ] D |
| **Pregunta 3** | [ ] A | [ ] B | [ ] C | [ ] D |
| **Pregunta 4** | [ ] A | [ ] B | [ ] C | [ ] D |
| **Pregunta 5** | [ ] A | [ ] B | [ ] C | [ ] D |

**INSTRUCCIONES**

- Marque con una X una sola opción por pregunta.
- Las respuestas con más de una marca se considerarán incorrectas.
- No se aceptan tachaduras ni uso de corrector.

**NOTA FINAL**

**/ 10 PUNTOS**

*(Cada pregunta vale 2 puntos)*

---

**1. De acuerdo con el protocolo estandarizado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ¿cuál es el sitio anatómico exacto de referencia para la medición de la circunferencia de cintura?**

**a)** Inmediatamente por encima de la espina ilíaca anterosuperior derecha.
**b)** Tres centímetros por debajo del centro de la cicatriz umbilical.
**c)** En el punto medio equidistante entre el borde inferior de la última costilla palpable y la cresta ilíaca.
**d)** Sobre el reborde costal anterior a nivel de la apófisis xifoides del esternón.

**2. Para ubicar y marcar el punto mesobraquial (punto medio del brazo), ¿cuáles son los dos puntos óseos de referencia anatómica que se deben palpar con el codo flexionado a 90°?**

**a)** El extremo distal de la clavícula y la apófisis estiloides del radio en la muñeca.
**b)** El ángulo inferior de la escápula y la fosa antecubital del pliegue del codo.
**c)** El borde superolateral del acromion y el punto más distal del olécranon.
**d)** La tuberosidad mayor del húmero y la apófisis coronoides del cúbito.

**3. En la evaluación antropométrica de la circunferencia de cintura (sea por protocolo CDC u OMS), ¿en qué momento del ciclo respiratorio debe efectuarse la lectura de la cinta métrica?**

**a)** En el momento de máxima inspiración pulmonar conteniendo el aire durante tres segundos.
**b)** En cualquier instante indistinto mientras el paciente conversa activamente con el evaluador.
**c)** Al final de una espiración normal y no forzada, con el abdomen suave y relajado.
**d)** Inmediatamente después de pedirle al niño que hunda y contraiga activamente la pared abdominal.

**4. ¿Por qué las algas como la espirulina, nori o chlorella NO deben utilizarse como fuente de Vitamina B12 en la alimentación de niños y adolescentes?**

**a)** Porque aportan concentraciones tóxicas de cobalamina que sobrecargan la función renal pediátrica.
**b)** Porque contienen pseudovitamina B12 (análogos inactivos que bloquean los receptores ileales y falsean los análisis en sangre).
**c)** Porque requieren hervirse durante un período continuo de más de 8 horas para activarse biológicamente.
**d)** Porque inhiben la proliferación de glóbulos blancos durante el proceso digestivo entérico.

**5. ¿Qué combinación alimentaria en el almuerzo permite optimizar y hasta triplicar la absorción del hierro vegetal (no hemínico) aportado por las legumbres?**

**a)** Consumir el plato junto con un vaso de leche entera de vaca o yogur bebible.
**b)** Acompañar la comida con una fuente de Vitamina C fresca (como pimiento morrón crudo, tomate fresco o frutas cítricas).
**c)** Tomar una taza de té negro concentrado o mate cocido caliente junto con la comida.
**d)** Espolvorear salvado de trigo seco sin remojar sobre la preparación caliente.