



微分方程式 総まとめ

にやにゃん



目次

第1章	はじめに	1
第2章	執筆方針	3
第3章	解析的に常微分方程式を解く	4
3.1	微分の逆操作	4
3.2	変数分離形	4
3.3	同次形	5
3.3.1	発展版同次形	6
3.4	一階線形微分方程式	7
3.4.1	特殊解を見つける	8
3.4.2	定数変化法	8
3.4.3	積分因子	9
3.5	完全形	10
3.5.1	積分因子	12
3.6	ベルヌーイの微分方程式	12
3.7	リカッチの微分方程式	13
3.8	ダランベールの微分方程式	13
3.8.1	クレローの微分方程式	14
3.9	二階線形微分方程式	14
3.9.1	定数係数の二階斉次線形微分方程式	15
3.9.2	定数係数の二階非斉次線形微分方程式	18
3.9.3	標準形	20
3.10	オイラーの微分方程式	23
3.11	定数係数連立微分方程式	25
3.12	高階斉次線形微分方程式	26
3.13	級数展開法	28
3.13.1	正則点と特異点・フロベニウスの方法	29
3.13.2	エルミートの微分方程式	30
3.13.3	ルジャンドルの微分方程式	31
3.13.4	ベッセルの微分方程式	32
3.14	演算子法	33
3.15	ラプラス変換	34
第4章	解析的に偏微分方程式を解く	37
4.1	変数分離形	37
4.2	一階線形偏微分方程式	38
4.3	演算子の因数分解	39

第5章	数值的に常微分方程式を解く	40
5.1	オイラー法	40
5.2	修正オイラー法 (中点法)	41
5.3	ルンゲ・クッタ法	43
5.3.1	一般的なルンゲ・クッタ法	46
5.4	連立微分方程式	46
5.5	高階微分方程式	47
5.6	予測子修正子法	48
5.7	有限差分法	49
第6章	数值的に偏微分方程式を解く	56
6.1	差分近似	56
6.2	陽的有限差分法	57
6.2.1	フォン・ノイマンの安定性解析	59
6.3	陰的有限差分法	61
6.3.1	フォン・ノイマンの安定性解析	62
6.4	連立偏微分方程式	63
第7章	解析的に常微分方程式を解く (例題)	65
7.1	微分の逆操作	65
7.2	変数分離形	65
7.3	同次形	67
7.4	一階線形微分方程式	67
7.4.1	特殊解を見つける	68
7.4.2	定数変化法	68
7.4.3	積分因子	69
7.5	完全形	70
7.6	ベルヌーイの微分方程式	72
7.7	リカッチの微分方程式	73
7.8	ダランベールの微分方程式	74
7.8.1	クレローの微分方程式	76
7.9	定数係数の二階非斉次線形微分方程式	76
7.10	連立微分方程式	78
7.11	級数展開法 (確定特異点)	79
第8章	解析的に偏微分方程式を解く (例題)	81
8.1	変数分離形	81
8.2	一階線形偏微分方程式	83
第9章	数值的に常微分方程式を解く (例題)	86
9.1	オイラー法	86
9.2	改良オイラー法 (中点法)	88
9.3	ルンゲ・クッタ法	89
9.4	連立微分方程式	90
9.5	予測子修正子法	93

9.6 有限差分法	94
---------------------	----

第 10 章 数值的に偏微分方程式を解く (例題)	97
----------------------------------	-----------

10.1 陽的有限差分法	97
------------------------	----

10.2 陰的有限差分法	98
------------------------	----

10.3 連立偏微分方程式	99
-------------------------	----

第1章 はじめに

これは私が微分方程式の解き方を学んでいく中で「この知識を一度体系的にまとめたい」と思って書いたものです。私の持つ知識の範疇で微分方程式の解き方をできる限り体系的にまとめました。

微分方程式を「解く」作業には大きく分けて2つの種類があります。

- 解析的に解く
- 数值的に解く

「解析的に解く」とはつまり、図 1.1¹のように式変形を使用して解くことを言います。ですが世の中に存在する微分方程式のほとんどは今の人類には解析的に解くことができません。そんな中でも様々な工夫をすることで、「この形の微分方程式なら解ける」ということを増やすことができます。




図 1.1: 解析的に解く

「数值的に解く」とは、計算機を用いて微分方程式を近似的に「解く」ことを言います。ここでの「解く」は、何も答えの式が出てくるわけではありません。例えばある x における何かの値 y の数値が、まさに数値として出てくるのです。また、数值的に微分方程式を解いた場合には、求められる解は図 1.2 のように離散的 (図 1.2 ならある決められた値 Δx ごとに y が求まります) です。この図についてはこのあと詳しく解説します。

本書では微分方程式の解き方についてこの2つの全く異なる方法を解説します。この2つの方法は全く異なるため、便宜上解析的に解く方を先に解説しますが、どちらを先に読んでいただいても構いません。

さて、ここでもう一度図 1.2 をご覧ください。これが微分方程式の真髄です。例として出した微分方程式

¹ここでは簡単のため任意定数は1として考えています。




図 1.2: 数値的に解く

$$\frac{dy}{dx} = y$$

をもう一度よく睨んでみると……そうです。これは、

$$(y \text{ の傾き}) = (y \text{ の関数})$$

という形をしています。「そんなの当たり前じゃないか」と思われる方が大半でしょう。でもよく考えてみてください。ある時点 x における y とそのときの傾きがわかれば、嬉しいことがあります。

$$y(x + \Delta x) = y(x) + \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x} \Delta x$$

右辺には既知の値 (y 、 dy/dx 、 Δx) しかありません。そして左辺を見ると、これまでわからなかった $y(x + \Delta x)$ が現れています。既知の値を使って未知の値 (しかもちょっとだけ x が進んだ値) を求める…漸化式みたいですね (実際漸化式的一种だと思います)。

ここで微分方程式の真髄 (だと私が思っていること) について一般的な言葉で解説しましょう。

「微分方程式はわかっている値を使って「ちょっと先の未来」を知るための方程式である。」

実は解析的に微分方程式を解く場合にはこの真髄が直接役立つことはほぼありません。ですが、「私は今何を解いているのだろう…」と思った時はぜひ思い出してください。「私は未来を知るために微分方程式を解いているのだ」と。

なお、数値的に微分方程式を解くやり方は根本的にこの真髄に従っています。ぜひ覚えておいてください。

第2章 執筆方針

本書の執筆方針を先に提示しておきます。

一般的に、でもわかりやすさは失わず

本書では汎用的に使える知識をつけるという目的で、なるべく一般的に微分方程式の解法を記述します。ですが、それだけだとあまりにも具体的にイメージしにくいいため、後半の章ではそれぞれの解法について具体的な例題を解いていきます。

式変形を丁寧に

本書では、著者が学術書を読むにあたって式変形を追うのが得意ではないことを背景に、なるべく式変形を丁寧に書きました。ですが、紙面の都合上少し省略した箇所もあります。

なるべく誤魔化さず

市販の学術書では面倒な証明や式変形を省いていることが多いですが、著者がそのような点で躓くことが多いこともあり、本書ではなるべく全てのことがらの証明や式変形を書きました。

PDF で読みやすく

PDF ファイルでの目次や数式、章、節の参照部分には該当部分へのリンクを貼ってあります。いちいち該当部分を探す手間を省けます。

第3章 解析的に常微分方程式を解く

第1章でも触れた通り、「解析的に微分方程式を解く」とは、式変形を利用して微分方程式を解くことを言います。ですが、世の中にあるほとんどの微分方程式は解析的に解くことができません。でもできれば解析的に微分方程式が解けたほうが様々な考察がしやすく便利ですね。ということで人類はできるだけ多くの微分方程式を解析的に解くために様々な技法を考えました。ここでは初歩から込み入った話まで、微分方程式を解析的に解く解き方についてお話しします。

3.1 微分の逆操作

まず一番単純な微分方程式を解いてみましょう。

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

右辺が x のみの関数ですので、両辺を x で積分することで、

$$y = \int f(x)dx + C$$

このように答えが求められます。

ここで、明示的に書いた積分定数 C を「任意定数」と言います。任意定数が微分の階数だけ現れた解を「一般解」、そうでない解を「特殊解」と言います。任意定数を一意の定数として定めるには「初期条件」が必要です。これは例えば $x = x_0$ で $y = y_0$ だといったものです¹。

3.2 変数分離形

次にこちらの微分方程式を考えてみましょう。

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y) \tag{3.1}$$

右辺に y が現れているので簡単には解けそうにありません。しかし、

$$\frac{1}{g(y)}dy = f(x)dx$$

¹「初期」とは言っても必ずしも $x = 0$ のときの条件とは限りません。

と変形し²、「変数を分離」すると、そのまま積分できます。

$$\int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx$$

これで微分形式を含まない形で y と x の関係が導けました。 $y =$ の形にせずともこれでこの微分方程式が解けたことになります。

このとき、 $g(y)$ が恒等的に 0 でなければ変数分離が使えます³。そもそも右辺自体が恒等的に 0 になってしまうので全く別の微分方程式になってしまいますね。

3.3 同次形

「同次形」という形の微分方程式の一般形は以下です。

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

$u = y/x$ として du/dx を計算してみると、

$$\frac{du}{dx} = -\frac{y}{x^2} + \frac{1}{x} \frac{dy}{dx}$$

となります。ここから後の式変形のために dy/dx を取り出すと、

$$\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx}x + u$$

となります。これを元の微分方程式の左辺に代入して少し変形してみましょう。右辺は y/x を u に置換します。

$$\begin{aligned} \frac{du}{dx}x + u &= f(u) \\ \frac{du}{dx} &= \frac{1}{x}(f(u) - u) \end{aligned}$$

² 「 dy/dx は分数ではないのにこんなに軽々しく移動させて良いのか」と疑問の方もいらっしゃるでしょう。実はこれは本来置換積分の式です。 dx を右辺に移動させずに両辺 x で積分してみましょう。

$$\int \frac{1}{ky} \frac{dy}{dx} dx = \int dx$$

左辺は見慣れた置換積分の式になりましたね。これを形式的に「 dx を右辺に移動させてインテグラルをつける」としています

³ 「 $g(y)$ が一瞬でも 0 を通る場合はどうなんだ」という鋭いツッコミをされる方もいらっしゃるでしょう。結論から言えば大丈夫です。 $g(y_0) = 0$ となる y_0 が存在するとしましょう。

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot 0$$

となり、右辺が 0 なので定数関数 $y = y_0$ は明らかにこの微分方程式の解ですね。ではそれ以外の解を考えてみましょう。定数関数 $y = y_0$ 以外の解で、ある値 $y = y_0$ を通ることがあるとまずいです。一瞬 $g(y) = 0$ となる関数 $g(y)$ で除算していることになります。しかし、「解の一意性」を考えるとこのようなことはありません。定数関数 $y = y_0$ 以外の関数 y である値 $y = y_0$ を通るとすると、この 2 つの関数 y は xy 座標で描いた際に交差、または接していることになります。ここで初期条件 $x = x_0$ で $y = y_0$ を考えてみましょう。あれれ、どちらの関数を解として良いかわからなくなってしまいましたね。どちらの関数も (x_0, y_0) を通ります。このようなことがないことを保証するのが「解の一意性」です。微分方程式の解である関数 y は互いに交差や接触をしないのです。ですので、ある点 $y = y_0$ で $g(y_0) = 0$ となる $g(y)$ があっても、定数関数 $y = y_0$ だけ別に考えれば良いというわけです。しかも、この定数関数 $y = y_0$ は、導いた一般解の関数 y に含まれます。例えば $y = Ae^{kx}$ であれば $k = 0$ の場合ですね。ですので、結論としては恒等的に 0 となる関数 g 以外であれば何も考えずに割ってしまっても良いのです。

これは変数分離形ではないでしょうか。変数分離形の基本形は式3.1の通りでした。これの y を u に置換して見ると、右辺は x の関数と u の関数の積で書いてあることがわかるでしょう。実際に変数分離で解いてみます。

$$\int \frac{du}{f(u) - u} = \int \frac{dx}{x}$$

このように積分を実行することで、 u が求められます。 $u = y/x$ でしたから、求まった u に x を掛けてやれば求めたい関数 y が無事求められます。

3.3.1 発展版同次形

次に以下の形を考えてみましょう。

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{a'x + b'y + c'}\right)$$

これも実は同次形に帰着して解くことができます。やってみましょう。

天下りのですが、

$$\begin{aligned} c &= -a\alpha - b\beta \\ c' &= -a'\alpha - b'\beta \end{aligned}$$

を満たす α と β を見つけます。式変形すれば、

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{b'c - bc'}{a'b + ab'} \\ \beta &= \frac{-a'c - ac'}{a'b + ab'} \end{aligned}$$

ということがわかると思います。

ここで、 $x = X + \alpha$ 、 $y = Y + \beta$ と置換します。関数 f の中の分子は、 c と α 、 β の変換式を使えば、

$$\begin{aligned} ax + by + c &= a(X + \alpha) + b(Y + \beta) + c \\ &= (aX + bY) + (a\alpha + b\beta) + (-a\alpha - b\beta) \\ &= aX + bY \end{aligned}$$

とすっきりした形になります。分母も同様に、

$$a'x + b'y + c' = a'X + b'Y$$

となります。

微分方程式の左辺については、

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dY}{dX}$$

ですから、結局すべてをまとめると

$$\frac{dY}{dX} = f\left(\frac{aX + bY}{a'X + b'Y}\right)$$

となります。大分見通しが良くなりましたね。この分子分母をそれぞれ X で割ってみましょう。

$$\frac{dY}{dX} = f\left(\frac{a + b\frac{Y}{X}}{a' + b'\frac{Y}{X}}\right)$$

出てきました、 Y/X 。これで同次形に帰着できました。あとは3.3節の同次形として解けます。

3.4 一階線形微分方程式

「一階線形微分方程式」とは、以下の形をした微分方程式のことです。

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y + Q(x) = 0 \quad (3.2)$$

「一階」とは、微分項の最大階数が1であるという意味、「線形」とは、 dy/dx と y の線形結合で書かれた方程式であるということを意味します。

このとき、 $Q(x)$ の状態によってさらに2通りに分けられます。

- $Q(x) = 0$: 一階斉次線形微分方程式
- $Q(x) \neq 0$: 一階非斉次線形微分方程式

斉次のときは

$$\frac{dy}{dx} = -P(x)y$$

ですから、変数分離形 (3.2 節) として解くことができます。解は、

$$\int \frac{dy}{y} = - \int P(x) dx$$

$$y = Ce^{-\int P(x) dx} \quad (3.3)$$

と与えられます。

問題は非斉次のときです。非斉次の場合は2通りの解き方があります。

3.4.1 特殊解を見つける

この微分方程式を満たす特殊解を発見できれば、あっさりと解くことができます。なお、特殊解の発見には式を睨むほか、3.4.2節の定数変化法、そして3.14節の演算子法がよく使われます。 $y = y_1(x)$ はこの微分方程式を満たす特殊解であるとしましょう。

$$\frac{dy_1}{dx} + P(x)y_1 + Q(x) = 0 \quad (3.4)$$

です。ここで、関数 $Y(x)$ を使って $y = Y + y_1$ と置換してみましょう。

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(Y + y_1) + P(x)(Y + y_1) + Q(x) &= 0 \\ \frac{dY}{dx} + P(x)Y + \left(\frac{dy_1}{dx} + P(x)y_1 + Q(x) \right) &= 0 \\ \frac{dY}{dx} + P(x)Y &= 0 \end{aligned}$$

式3.4を使うことで、 $Q(x)$ の項を消すことができます。これで斉次に帰着できました。変数分離形(3.2節)として解くことができます。解は、

$$y = y_1(x) + Ce^{-\int P(x)dx} \quad (3.5)$$

です。

3.4.2 定数変化法

微分方程式が簡単な形をしている場合には特殊解をすぐに見つけられることがありますが、そう簡単にはいかない場合もあります。そんなときには定数変化法を使って特殊解を求めましょう。定数変化法は、式3.3の任意定数 C を x の関数であると見て、

$$y_1 = C(x)e^{-\int P(x)dx} \quad (3.6)$$

と特殊解を置いて、元の微分方程式に代入して解を探します⁴。

$$\frac{d}{dx} \left(C(x)e^{-\int P(x)dx} \right) + P(x)C(x)e^{-\int P(x)dx} + Q(x) = 0$$

左辺第一項を実際に微分してみましょう。

$$\begin{aligned} \left(\frac{d}{dx}C(x) \cdot e^{-\int P(x)dx} - P(x)C(x)e^{-\int P(x)dx} \right) + P(x)C(x)e^{-\int P(x)dx} + Q(x) &= 0 \\ \frac{d}{dx}C(x) \cdot e^{-\int P(x)dx} + Q(x) &= 0 \end{aligned}$$

⁴ 「そんな身勝手なことをして良いのか」という話ですが、これは特殊解を探す一つの手段です。特殊解はどんな関数であれこの微分方程式を満たしてくれさえすれば良いのです。今回はこのような形で特殊解があることを仮定して探します。

鮮やかに $P(x)C(x)e^{-\int P(x)dx}$ が打ち消し合って消えてくれました。しかも $Q(x)$ は x のみの関数で、 $C(x)$ の関数ではありません。これで $C(x)$ を求められそうです。

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}C(x) \cdot e^{-\int P(x)dx} &= -Q(x) \\ C(x) &= -\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx\end{aligned}\quad (3.7)$$

これで特殊解が求められました。特殊解 y_1 は、

$$y_1 = -e^{-\int P(x)dx} \int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx$$

です。では 3.4.1 節の方法を使って一般解を求めてみましょう。一般解は式 3.5 を使って、

$$\begin{aligned}y &= -e^{-\int P(x)dx} \int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx + Ce^{-\int P(x)dx} \\ &= \left(C - \int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx\right)e^{-\int P(x)dx}\end{aligned}\quad (3.8)$$

です。なお、ここで出てきた C は、紛らわしいですが特殊解を探す上で使用した $C(x)$ とは別物で、任意定数です。

ここで、式 3.7 をもう一度見てみましょう。この積分定数 (これも一種の微分方程式 (3.1 節で紹介したものにあたります) なので任意定数と言えます) はどこへ行ったのでしょうか。「特殊解を探す」という目的なら積分定数は何でも良いのですが、仮にこれを明示的に C と置いてみましょう。ここでも積分定数 (任意定数) C と関数 $C(x)$ は別物です。

$$C(x) = -\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx + C$$

これを式 3.6 に代入すると、

$$y = \left(C - \int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx\right)e^{-\int P(x)dx}$$

式 3.8 (定数変化法を使って求めた一般解) と一致しましたね。実は左辺を特殊解を表す y_1 でなく一般解を表す y にさりげなく置き換えておきました。

一般解はその微分方程式の階数だけの任意定数を含んだものを言います。今回は $C(x)$ を求めたときに明示的に積分定数を C としたことで、これが任意定数となってしまったのです。

定数変化法は「特殊解を見つける」手段ではありますが、このように任意定数を途中で置いてしまうことで一般解の導出まで一気にできてしまいます。

3.4.3 積分因子

突然ですが問題の式 3.2 の両辺に $e^{\int P(x)dx}$ を掛けてみましょう。すると、

$$e^{\int P(x)dx} \frac{dy}{dx} + P(x)e^{\int P(x)dx} y + e^{\int P(x)dx} Q(x) = 0$$

となります。左辺第一項、第二項をよく見ると、この2つはまとめて $y e^{\int P(x)dx}$ の微分の形になっていることに気づきます。

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(y e^{\int P(x)dx} \right) + Q(x) e^{\int P(x)dx} &= 0 \\ \frac{d}{dx} \left(y e^{\int P(x)dx} \right) &= -Q(x) e^{\int P(x)dx} \end{aligned}$$

右辺は x だけの式です。3.1 節のように両辺を x で積分してみましょう。

$$\begin{aligned} y e^{\int P(x)dx} &= - \int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx + C \\ y &= \left(C - \int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx \right) e^{-\int P(x)dx} \end{aligned}$$

狐につままれたような感覚ですが、なんと答えが求まってしまいました。

このように、微分方程式全体にある因子を掛けることで呆気なく微分方程式が解けてしまうことがあります。このような因子を「積分因子」と言います。

3.5 完全形

完全形とは、

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{f(x, y)}{g(x, y)} \quad (3.9)$$

という形の微分方程式において、

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x} \quad (3.10)$$

を満たす微分方程式を言います。

これを少し変形してみましょう。式 3.9 の分母を払って移項すると、

$$f(x, y)dx + g(x, y)dy = 0 \quad (3.11)$$

となります。ここで関数 $u(x, y)$ を

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = g(x, y) \quad (3.12)$$

と定義して導入します。すると、式 3.11 は、

$$\frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy = 0 = du$$

となります。関数 u の全微分の形ですね。これが完全形の正体です⁵。これを満たす関数 u を求めれば、それは x と y の関係が求められたことになるので、「微分方程式が解けた」と言えます⁶。

では具体的に関数 u を求めていきましょう。まずは式 3.12 の関数 f に関する式を積分します。

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= f(x, y) \\ u &= \int f(x, y)dx + h(y)\end{aligned}\tag{3.13}$$

元々 x で偏微分した形で書かれた式を積分したので、関数 $h(y)$ が出てきます。 $\int f(x, y)dx$ は与えられた式を積分するだけなので良いとして、問題はこの関数 h です。とりあえず式 3.12 の関数 g に関する式に代入して関数 h について整理してみましょう。

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial y}\left(\int f(x, y)dx + h(y)\right) &= g(x, y) \\ \frac{d}{dy}h(y) &= g(x, y) - \frac{\partial}{\partial y}\int f(x, y)dx\end{aligned}\tag{3.14}$$

両辺を y で積分してみると、

$$h(y) = \int \left(g(x, y) - \frac{\partial}{\partial y}\int f(x, y)dx\right)dy$$

となります。ここで両辺をよく睨むと、左辺の関数 h は y のみの関数なのに、右辺には x の関数が 2 つ出てくることに気づくでしょう。つまり、右辺の x を含む項は互いに打ち消し合っているのです。少し寄り道して、この $g(x, y) - \frac{\partial}{\partial y}\int f(x, y)dx$ を x で偏微分して値が本当に 0 になるか (x を含む項が打ち消し合っているか) を見てみましょう。

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(g(x, y) - \frac{\partial}{\partial y}\int f(x, y)dx\right) = \frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y}$$

式 3.10 の条件を考えると、確かに右辺は 0 になります。

さて、では本筋に戻りましょう。 $\partial/\partial y \int f(x, y)dx$ についてよく考えてみましょう。式 3.14 で積分定数 (定数ではなく関数ですが) を $h(y)$ と置いたので、 $\int f(x, y)dx$ 単体には今積分定数 (関数) がありません。つまり、この全ての項には x が何らかの形でつきます。これを y で偏微分したところで、全ての項に x が関わることに変わりはありません。つまり上の議論の通り、 $\partial/\partial y \int f(x, y)dx$ に出てくる項は全て $g(x, y)$ と打ち消し合ってしまうのです。

ここから以下が言えます。

$$h(y) = \left(\int g(x, y)dy \text{ に出てくる } x \text{ を含まない項}\right)$$

⁵この関数 u が存在する条件が式 3.10 です

⁶微分方程式は必ずしも解が $y =$ の形にならないといけないわけではありません。 $y =$ の形になればすっきりしますが、とにかく x と y の関係が微分項を含まずに記述できれば OK なのです。

さて、 $g(x, y)$ は与えられた式ですので、これを y で積分して適宜 y を含む項を抜き去れば $h(y)$ が求められるということになります。なんとこれを式 3.13 に代入すれば、目的の関数 u は求まってしまう。数式としてこれを記述し直すと、

$$u(x, y) = \int f(x, y) dx + \int \left(g(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\int g(x, y) dx \right) \right) dy \quad (3.15)$$

となります。

3.5.1 積分因子

積分因子、再登場です。

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{f(x, y)}{g(x, y)}$$

という形の微分方程式があっても

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}$$

を満たさなければ完全形とは言えません。ですが、右辺の分子分母に $\lambda(x, y)$ を掛けることで微分方程式が完全形になる場合があります。この積分因子を見つける系統的な手法はありませんが、積分因子に $x^m y^n$ を仮定して

$$\frac{\partial \lambda f}{\partial y} = \frac{\partial \lambda g}{\partial x}$$

に代入して m と n を求められる場合があります。

3.6 ベルヌーイの微分方程式

ここから人名のついた微分方程式が連続します。まずはベルヌーイの微分方程式です。これは、

$$\frac{dy}{dx} + f(x)y = g(x)y^n$$

という形をしたものです。 $n = 0, 1$ であれば一階線形微分方程式ですが、ここでは $n \geq 2$ の場合を考えてみましょう。 $z = y^{1-n}$ として、まず dz/dx を計算します。

$$\frac{dz}{dx} = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx}$$

微分方程式全体に $(1-n)y^{-n}$ を掛けると、

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} (1-n)y^{-n} + f(x)(1-n)y^{1-n} &= (1-n)g(x) \\ \frac{dz}{dx} + (1-n)f(x)z &= (1-n)g(x) \end{aligned}$$

となります。これは一階線形微分方程式ですね。3.4 節の通りに解くことができます。 z について解を求めて、 $y = {}^{1-n}\sqrt{z}$ と置換すれば答えが求まります。

3.7 リカッチの微分方程式

リカッチの微分方程式は

$$\frac{dy}{dx} = f(x) + g(x)y + h(x)y^2$$

の形をしたものです。 $f(x) = 0$ でベルヌーイの微分方程式 (3.6 節) です。これは頑張って特殊解 $y = y_1(x)$ を見つけて、3.4.1 節と同じように関数 $Y(x)$ を使って $y = Y + y_1$ と置きます。まず特殊解の条件を書いておきましょう。

$$\frac{dy_1}{dx} = f(x) + g(x)y_1 + h(x)y_1^2 \quad (3.16)$$

それでは実際に置換してみましょう。

$$\begin{aligned} \frac{dY}{dx} + \frac{dy_1}{dx} &= f(x) + g(x)(Y + y_1) + h(x)(Y + y_1)^2 \\ \frac{dY}{dx} + \frac{dy_1}{dx} &= (f(x) + g(x)y_1 + h(x)y_1^2) + g(x)Y + h(x)Y^2 + 2h(x)Yy_1 \end{aligned}$$

式 3.16 を使って左辺第二項と右辺のカッコの中を消しましょう。

$$\begin{aligned} \frac{dY}{dx} &= g(x)Y + h(x)Y^2 + 2h(x)Yy_1 \\ &= (g(x) + 2h(x)y_1)Y + h(x)Y^2 \end{aligned}$$

これはベルヌーイの微分方程式 ($n = 2$) です。 $z = Y^{-1}$ として式全体に $-Y^{-2}$ を掛けると、

$$\begin{aligned} -Y^{-2} \frac{dY}{dx} &= -(g(x) + 2h(x)y_1)Y^{-1} - h(x) \\ \frac{dz}{dx} &= -(g(x) + 2h(x)y_1)z - h(x) \end{aligned}$$

これで一階線形微分方程式に帰着できました。3.4 節の方法を使って解くことができます。 z について解いて $y = y_1 + 1/z$ と置換すれば答えが求まります。

3.8 ダランベールの微分方程式

ダランベールの微分方程式はこんな形をしています。

$$y = xf\left(\frac{dy}{dx}\right) + g\left(\frac{dy}{dx}\right)$$

dy/dx を p と置いて両辺を x で微分してみましょう。

$$\begin{aligned} y &= xf(p) + g(p) \\ p &= f(p) + x \frac{dp}{dx} \frac{d}{dp} f(p) + \frac{dp}{dx} \frac{d}{dp} g(p) \end{aligned} \quad (3.17)$$

少しトリッキーですが、ここで dx/dp についてまとめてみましょう。つまり、 x を p の関数と見るということです。

$$\begin{aligned} \left(x \frac{d}{dp} f(p) + \frac{d}{dp} g(p) \right) \frac{dp}{dx} &= p - f(p) \\ \frac{dx}{dp} &= \frac{\frac{d}{dp} f(p)}{p - f(p)} x + \frac{\frac{d}{dp} g(p)}{p - f(p)} \end{aligned}$$

これは x と p の一階線形微分方程式です。 x を $p = dy/dx$ について解きます。すると、

$$x = h(p)$$

という関数 $h(p)$ を伴った式が現れます。これと式 3.17 を連立することで p を消去します。言わば p を媒介変数として y と x の関係を求めるわけですね。

3.8.1 クレローの微分方程式

クレローの微分方程式はダランベールの微分方程式の特殊な場合です。

$$y = x \frac{dy}{dx} + g\left(\frac{dy}{dx}\right)$$

ダランベールの微分方程式で $f(dy/dx) = dy/dx$ となったものですね。ダランベールの微分方程式と同じように $p = dy/dx$ を導入して両辺を x で微分してみましょう。

$$\begin{aligned} y &= xp + g(p) \\ p &= p + x \frac{dp}{dx} + \frac{dp}{dx} \frac{d}{dp} g(p) \\ 0 &= \frac{dp}{dx} \left(x + \frac{d}{dp} g(p) \right) \end{aligned} \tag{3.18}$$

かなりすっきりしましたね。左辺が0ですので、右辺のどちらが0になるかで場合分けしましょう。

- $dp/dx = 0$ のとき、 $p = C$ より $y = Cx + g(C)$ です。この解を一般解と言います。
- $x + dg(p)/dp = 0$ のとき、これと式 3.18 を連立して p を消去して解となります。この解を特異解と言います。

3.9 二階線形微分方程式

二階の微分項が入った形の微分方程式です。

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + P(x) \frac{dy}{dx} + Q(x)y + R(x) = 0$$

これについて、一階線形微分方程式と同様に斉次・非斉次の場合の大まかな解き方をご説明しましょう。

$R(x) = 0$ 、つまり斉次の場合は、階数である2つの線形独立な解 ($y = y_2, y = y_3$ ⁷とします。これらを基本解と言います。)⁸の重ね合わせ (線形結合)

$$y = c_2 y_2 + c_3 y_3$$

が一般解です。なお、 c_2 と c_3 は任意定数です。

この重ね合わせの原理はなぜ成り立つのでしょうか。実際に $y = c_2 y_2 + c_3 y_3$ を微分方程式に代入してみましょう。

$$\begin{aligned} & c_2 \frac{d^2 y_2}{dx^2} + c_3 \frac{d^2 y_3}{dx^2} + c_2 P(x) \frac{dy_2}{dx} + c_3 P(x) \frac{dy_3}{dx} + c_2 Q(x) y_2 + c_3 Q(x) y_3 \\ = & c_2 \left(\frac{d^2 y_2}{dx^2} + P(x) \frac{dy_2}{dx} + Q(x) y_2 \right) + c_3 \left(\frac{d^2 y_3}{dx^2} + P(x) \frac{dy_3}{dx} + Q(x) y_3 \right) \\ = & 0 \end{aligned}$$

y_2 と y_3 がこの微分方程式を満たすことを利用すれば、確かに $y = c_2 y_2 + c_3 y_3$ も解でした。式をよく睨むと、この重ね合わせの原理は微分方程式の線形性⁹から来る性質だということがわかります。

ところが、 $R(x) \neq 0$ 、つまり非斉次の場合には重ね合わせの原理は成り立ちません。実際に微分方程式に代入して確かめてみてください。非斉次の場合は頑張って特殊解 $y = y_1$ を見つけ、 $y = Y + y_1$ と置換して Y についての線形独立な2つの基本解 $Y = Y_2, Y = Y_3$ を見つけます。これらの重ね合わせと y_1 との和

$$y = y_1 + c_2 Y_2 + c_3 Y_3$$

が解となります。

もしかしたらお気づきかもしれませんが、一般の n 階線形微分方程式については n 個の線形独立な基本解を見つければ、その全ての解を重ね合わせたものが一般解になります。

3.9.1 定数係数の二階斉次線形微分方程式

定数係数なので、このような形をした微分方程式です。

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + a \frac{dy}{dx} + by = 0 \quad (3.19)$$

右辺が0でないときは非斉次です。特殊解 $y = y_1$ を探して斉次に持ち込みましょう。このとき、定数変化法が使えます。3.9.2 節でお話しします。

⁷本書では y_1 を特殊解の意味で使っているので y_2 から始まるようにしました。少し見にくいですが許してください。

⁸線形独立でない解とは、ここでは k を定数として、 $y_2 = k y_3$ のように片方がもう片方の定数倍で表すことができる解のことです。つまり、線形独立な解とは片方が片方の定数倍で表せない解のことを言います。

⁹ y^2 のように n 乗された項や $y dy/dx$ のように y にまつわる関数同士が掛けられた項がないということです。

斉次式 (右辺 = 0) の場合は解に

$$y = e^{\lambda x} \quad (3.20)$$

の形を仮定して微分方程式に代入してみます¹⁰。すると、

$$\begin{aligned} \lambda^2 e^{\lambda x} + a\lambda e^{\lambda x} + b e^{\lambda x} &= 0 \\ \lambda^2 + a\lambda + b &= 0 \end{aligned} \quad (3.21)$$

という二次方程式になります。これを特性方程式と言います。なんだかとてもすっきりしましたね。この判別式の正負で場合分けをしましょう。

判別式が正の場合

判別式が正とは、

$$a^2 - 4b > 0$$

のときのことを言います。この場合、 λ について、2つの実数解 λ_2, λ_3 ¹¹ が求まります。この場合、それぞれの λ を式 3.20 に代入すると、線形独立な2つの基本解が求まります。片方がもう片方の定数倍で表せることはありません。よって、一般解は

$$y = c_2 e^{\lambda_2 x} + c_3 e^{\lambda_3 x}$$

です。

判別式が負の場合

判別式が負なので、

$$a^2 - 4b < 0$$

の場合です。こちらも λ について2つの複素数解 λ_2, λ_3 が求まります。このままこの λ を式 3.20 に代入すれば2つの基本解が求まります。よって、一般解は判別式が正の場合と同じく

$$y = c_2 e^{\lambda_2 x} + c_3 e^{\lambda_3 x}$$

です。

¹⁰ 「解を仮定なんてして良いのか」と思われるかもしれませんが、私たちがやるべきことはどんな形の解であれ線形独立な基本解を2つ見つけることです。仮定した解がうまく本当の解になってくれたら嬉しくありませんか？

¹¹ ここも特殊解との区別、およびインデックスを揃えるために2で始まるようにしています

判別式が0の場合

問題は判別式が0の場合です。

$$a^2 - 4b = 0 \quad (3.22)$$

二次方程式の解 λ_2 が重解となって1つしか現れません。そこで、定数変化法を使ってみましょう。2つの基本解を以下のように置いてみます。 y_2 は出てきた λ_2 をそのまま式 3.20 に入れた形です。

$$\begin{aligned} y_2 &= e^{\lambda_2 x} \\ y_3 &= C(x)e^{\lambda_2 x} \end{aligned} \quad (3.23)$$

これがもし解になれば、 $C(x)$ は x の関数なので、線形独立な基本解が求められることになります。これを元の微分方程式 3.19 に代入してみるのですが、その前に dy_3/dx と d^2y_3/dx^2 を求めておきましょう。

$$\begin{aligned} \frac{dy_3}{dx} &= e^{\lambda_2 x} \left(\frac{d}{dx} C(x) + \lambda_2 C(x) \right) \\ \frac{d^2 y_3}{dx^2} &= \lambda_2 e^{\lambda_2 x} \left(\frac{d}{dx} C(x) + \lambda_2 C(x) \right) + e^{\lambda_2 x} \left(\frac{d^2}{dx^2} C(x) + \lambda_2 \frac{d}{dx} C(x) \right) \\ &= e^{\lambda_2 x} \left(\frac{d^2}{dx^2} C(x) + 2\lambda_2 \frac{d}{dx} C(x) + \lambda_2^2 C(x) \right) \end{aligned}$$

では式 3.19 に代入しましょう。

$$\begin{aligned} e^{\lambda_2 x} \left(\frac{d^2}{dx^2} C(x) + 2\lambda_2 \frac{d}{dx} C(x) + \lambda_2^2 C(x) \right) + a e^{\lambda_2 x} \left(\frac{d}{dx} C(x) + \lambda_2 C(x) \right) + b C(x) e^{\lambda_2 x} &= 0 \\ \left(\frac{d^2}{dx^2} C(x) + 2\lambda_2 \frac{d}{dx} C(x) + \lambda_2^2 C(x) \right) + a \left(\frac{d}{dx} C(x) + \lambda_2 C(x) \right) + b C(x) &= 0 \\ \frac{d^2}{dx^2} C(x) + (2\lambda_2 + a) \frac{d}{dx} C(x) + (\lambda_2^2 + a\lambda_2 + b) C(x) &= 0 \end{aligned}$$

左辺が恒等的に0でなくてははいけないのです。 $C(x)$ の項は、式 3.21 より、 $C(x)$ の係数が0になります。

次に $dC(x)/dx$ の項を考えますが、ここで重解 λ を a を使って表しましょう。判別式の条件式 3.22 と λ の特性方程式 3.21 より、

$$\lambda = -\frac{1}{2}a \quad (3.24)$$

です。よって、

$$(2\lambda + a) \frac{d}{dx} C(x) = 0$$

です (左辺第一項が0になります)。

残ったのは $dC(x)/dx$ だけです。よって、

$$\frac{d^2}{dx^2}C(x) = 0$$

が成り立ちます。

定数変化法の根本的な条件 $C(x) \neq 0$ を考えれば、

$$C(x) = kx$$

ということが導けます。ここでは定数 k は何でも良いので、1 として、

$$C(x) = x$$

としておきましょう。

元の話に戻ると、結局 2 つの線形独立な基本解は式 3.23 に $C(x) = x$ を代入すれば、

$$\begin{aligned} y_2 &= e^{\lambda_2 x} \\ y_3 &= xe^{\lambda_2 x} \end{aligned}$$

となります。よって、一般解 y は、

$$y = (c_2 + c_3 x)e^{\lambda_2 x}$$

です。

3.9.2 定数係数の二階非斉次線形微分方程式

非斉次なので、式 3.19 の右辺を $f(x)$ とします。

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + a \frac{dy}{dx} + by = f(x) \quad (3.25)$$

方針としては、特殊解 $y = y_1$ を見つけ、 $y = Y + y_1$ と置換して Y を求めるのですが、今回は先に斉次式を解きます。斉次式

$$\frac{d^2 Y}{dx^2} + a \frac{dY}{dx} + bY = 0$$

の一般解 $Y = C_2 Y_2 + C_3 Y_3$ を求めたとします。ここで定数変化法です。特殊解 y_1 もこの一般解と似ているだろうと仮定して、

$$y_1 = c_2(x)Y_2 + c_3(x)Y_3$$

と置いてみます。では実際に微分方程式に代入するために、 dy_1/dx と d^2y_2/dx^2 を求めてみましょう。

$$\frac{dy_1}{dx} = \left(\frac{d}{dx} c_2(x) \right) Y_2 + c_2(x) \frac{dY_2}{dx} + \left(\frac{d}{dx} c_3(x) \right) Y_3 + c_3(x) \frac{dY_3}{dx}$$

ちょっと待ってください。これをもう一度微分したい気持ちにはなれませんね。ということで都合よくこんな条件を付け加えてみましょう。

$$\left(\frac{d}{dx} c_2(x) \right) Y_2 + \left(\frac{d}{dx} c_3(x) \right) Y_3 = 0 \quad (3.26)$$

どんな都合の良い条件を加えようと、とにかく特殊解が見つければ良いのです。今回の微分方程式だとこのようにして特殊解を見つけられます。

この条件によって、

$$\begin{aligned} \frac{dy_1}{dx} &= c_2(x) \frac{dY_2}{dx} + c_3(x) \frac{dY_3}{dx} \\ \frac{d^2y_1}{dx^2} &= \left(\frac{d}{dx} c_2(x) \right) \frac{dY_2}{dx} + c_2(x) \frac{d^2Y_2}{dx^2} + \left(\frac{d}{dx} c_3(x) \right) \frac{dY_3}{dx} + c_3(x) \frac{d^2Y_3}{dx^2} \end{aligned}$$

となります。では元の微分方程式 3.25 に代入してみましょう。

$$\begin{aligned} &\left(\frac{d}{dx} c_2(x) \right) \frac{dY_2}{dx} + c_2(x) \frac{d^2Y_2}{dx^2} + \left(\frac{d}{dx} c_3(x) \right) \frac{dY_3}{dx} + c_3(x) \frac{d^2Y_3}{dx^2} \\ &+ a \left(c_2(x) \frac{dY_2}{dx} + c_3(x) \frac{dY_3}{dx} \right) + b(c_2(x)Y_2 + c_3(x)Y_3) = f(x) \end{aligned}$$

2行に渡る式になってしまいましたが怯まずに整理しましょう。

$$\begin{aligned} c_2(x) \left(\frac{d^2Y_2}{dx^2} + a \frac{dY_2}{dx} + bY_2 \right) + c_3(x) \left(\frac{d^2Y_3}{dx^2} + a \frac{dY_3}{dx} + bY_3 \right) \\ + \left(\frac{d}{dx} c_2(x) \right) \frac{dY_2}{dx} + \left(\frac{d}{dx} c_3(x) \right) \frac{dY_3}{dx} = f(x) \end{aligned}$$

Y_1, Y_2 はそれぞれ斉次方程式の解だったので、上段がぼっさり 0 になり、

$$\left(\frac{d}{dx} c_2(x) \right) \frac{dY_2}{dx} + \left(\frac{d}{dx} c_3(x) \right) \frac{dY_3}{dx} = f(x)$$

となります。これとさきほどの都合よくつけた成約条件式 3.26 をあわせて連立方程式を解きます。その際、行列を使うとこんな風書けます。

$$\begin{pmatrix} Y_2 & Y_3 \\ \frac{dY_2}{dx} & \frac{dY_3}{dx} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{d}{dx} c_2(x) \\ \frac{d}{dx} c_3(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ f(x) \end{pmatrix}$$

随分すっきりしましたね。この行列の両辺に左から左辺第一項の行列 (W とします) の逆行列を掛ければ答えが求まりそうです。逆行列の存在確認のために行列 W の行列式が0でないことを確認しなくてはならないのですが、実はこの行列 W には「ロンスキー行列」という名前がついていて、この場合だと Y_2 と Y_3 が線形独立であれば行列式は x の値によらず絶対に0にはなりません¹²。では逆行列を両辺に左から掛けましょう。

$$\begin{pmatrix} \frac{d}{dx}c_2(x) \\ \frac{d}{dx}c_3(x) \end{pmatrix} = \frac{1}{Y_2 \frac{dY_3}{dx} - Y_3 \frac{dY_2}{dx}} \begin{pmatrix} \frac{dY_3}{dx} & -Y_3 \\ -\frac{dY_2}{dx} & Y_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ f(x) \end{pmatrix}$$

これを $dc_2(x)/dx$ と $dc_3(x)/dx$ のそれぞれについて整理すると、

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}c_2(x) &= -\frac{Y_3 f(x)}{Y_2 \frac{dY_3}{dx} - Y_3 \frac{dY_2}{dx}} \\ \frac{d}{dx}c_3(x) &= \frac{Y_2 f(x)}{Y_2 \frac{dY_3}{dx} - Y_3 \frac{dY_2}{dx}} \end{aligned}$$

となります。これでやっと $c_2(x)$ と $c_3(x)$ がわかります。それらは、

$$\begin{aligned} c_2(x) &= -\int \frac{Y_3 f(x)}{Y_2 \frac{dY_3}{dx} - Y_3 \frac{dY_2}{dx}} dx \\ c_3(x) &= \int \frac{Y_2 f(x)}{Y_2 \frac{dY_3}{dx} - Y_3 \frac{dY_2}{dx}} dx \end{aligned}$$

です。今は特殊解を求めているので積分定数は考えなくて大丈夫です。

これで特殊解が求まりました。よって全体の解は、

$$y = -Y_2 \int \frac{Y_3 f(x)}{Y_2 \frac{dY_3}{dx} - Y_3 \frac{dY_2}{dx}} dx + Y_3 \int \frac{Y_2 f(x)}{Y_2 \frac{dY_3}{dx} - Y_3 \frac{dY_2}{dx}} dx + C_2 Y_2 + C_3 Y_3$$

です。

3.9.3 標準形

標準形の微分方程式とは、定数 k を使って

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + ky = 0 \quad (3.27)$$

と書ける微分方程式のことです。これは比較的簡単に解くことができます。これを解くのは後に回して、実は一般的な二階斉次線形微分方程式を標準形に帰着することができます。

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + P(x) \frac{dy}{dx} + Q(x)y = 0 \quad (3.28)$$

¹²ロンスキー行列は一般的に n 個の関数とその微分が入ったものでもそれぞれが全て線形独立であれば $\det(W) \neq 0$ です。

について、

$$y = u(x)e^{-\frac{1}{2} \int P(x) dx}$$

と置いてみましょう。

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \left(\frac{d}{dx}u(x) - \frac{1}{2}P(x)u(x) \right) e^{-\frac{1}{2} \int P(x) dx} \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \left(\frac{d^2}{dx^2}u(x) - \frac{1}{2}u(x)\frac{d}{dx}P(x) - \frac{1}{2}P(x)\frac{d}{dx}u(x) \right) e^{-\frac{1}{2} \int P(x) dx} \\ &\quad - \frac{1}{2} \left(\frac{d}{dx}u(x) - \frac{1}{2}P(x)u(x) \right) P(x) e^{-\frac{1}{2} \int P(x) dx} \\ &= \left(\frac{d^2}{dx^2}u(x) - P(x)\frac{d}{dx}u(x) + \left(\frac{1}{4}P^2(x) - \frac{1}{2}\frac{d}{dx}P(x) \right) u(x) \right) e^{-\frac{1}{2} \int P(x) dx} \end{aligned}$$

これを元の微分方程式 3.28 に代入してみます。

$$\begin{aligned} &\left(\frac{d^2}{dx^2}u(x) - P(x)\frac{d}{dx}u(x) + \left(\frac{1}{4}P^2(x) - \frac{1}{2}\frac{d}{dx}P(x) \right) u(x) \right) e^{-\frac{1}{2} \int P(x) dx} \\ &+ P(x) \left(\frac{d}{dx}u(x) - \frac{1}{2}P(x)u(x) \right) e^{-\frac{1}{2} \int P(x) dx} + Q(x)u(x)e^{-\frac{1}{2} \int P(x) dx} = 0 \end{aligned}$$

整理すると、

$$\frac{d^2}{dx^2}u(x) + \left(Q(x) - \frac{1}{2}\frac{d}{dx}P(x) - \frac{1}{4}P^2(x) \right) u(x) = 0$$

となります。これで一般的な二階斉次線形微分方程式が標準形になりました。

では実際に標準形の微分方程式 3.27 を解いていきましょう。 k の値によって場合分けができます。

$k = 0$ の場合

微分方程式 3.27 を書き直すと

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 0$$

となるので、 y の最大の次数は 1 です。よって、2 つの線形独立な基本解を

$$y_2 = x$$

$$y_3 = 1$$

と置くことができます。よって、これらの重ね合わせを一般解として、一般解は

$$y = c_2x + c_3$$

です。

$k < 0$ の場合

微分方程式 3.27 を書き直すと、

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -ky$$

となりますが、 k が負なので右辺の係数は正になります。

これは定数係数の二階斉次線形微分方程式ですから、解に $y = e^{\lambda x}$ を仮定すると、

$$\begin{aligned}\lambda^2 e^{\lambda x} &= -k e^{\lambda x} \\ \lambda &= \pm \sqrt{-k}\end{aligned}$$

となり、2つの λ が現れます。これで基本解が2つ作れそうです。基本解 y_2, y_3 は、

$$\begin{aligned}y_2 &= e^{\sqrt{-k}x} \\ y_3 &= e^{-\sqrt{-k}x}\end{aligned}$$

ですので、一般解 y は

$$y = c_2 e^{\sqrt{-k}x} + c_3 e^{-\sqrt{-k}x}$$

です。

 $k > 0$ の場合

微分方程式 3.27 を書き直すと、

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -ky$$

となります。今回は $k > 0$ なので右辺の係数は負です。これは見慣れた単振動型の微分方程式ですが一度真面目に解いてみましょう。

これは定数係数の二階斉次線形微分方程式ですから、先ほどと同じように解に $y = e^{\lambda x}$ を仮定すると、

$$\begin{aligned}\lambda^2 e^{\lambda x} &= -k e^{\lambda x} \\ \lambda &= \pm i\sqrt{k}\end{aligned}$$

となります。先ほどと同じく2つの λ が現れたので、線形独立な基本解が2つ作れます。基本解 y_2, y_3 は、

$$\begin{aligned}y_2 &= e^{i\sqrt{k}x} \\ y_3 &= e^{-i\sqrt{k}x}\end{aligned}$$

ですので、一般解 y は

$$y = c_2 e^{i\sqrt{k}x} + c_3 e^{-i\sqrt{k}x}$$

です。オイラーの公式

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

を使えば、

$$\begin{aligned} y &= c_2 (\cos \sqrt{k}x + i \sin \sqrt{k}x) + c_3 (\cos \sqrt{k}x - i \sin \sqrt{k}x) \\ &= (c_2 + c_3) \cos \sqrt{k}x + i(c_2 - c_3) \sin \sqrt{k}x \end{aligned}$$

となり、 y が物理量など、解が実数のみを取るという成約があれば、

$$\begin{aligned} c_1 &= \frac{A_1 + iA_2}{2} \\ c_2 &= \frac{A_1 - iA_2}{2} \end{aligned}$$

として、

$$y = A_1 \cos \sqrt{k}x + A_2 \sin \sqrt{k}x$$

です。

3.10 オイラーの微分方程式

オイラーの微分方程式は、

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + ax \frac{dy}{dx} + by = 0 \quad (3.29)$$

の形をしたものです。解に $y = x^\lambda$ を仮定すると、

$$\begin{aligned} x^2 \lambda(\lambda - 1) x^{\lambda-2} + ax \lambda x^{\lambda-1} + bx^\lambda &= 0 \\ \lambda(\lambda - 1) + a\lambda + b &= 0 \\ \lambda^2 + (a - 1)\lambda + b &= 0 \end{aligned} \quad (3.30)$$

と、すっきりした形になります。二次方程式が出てきたのでまた決まって判別式で場合分けをします。

判別式が0でない場合

判別式に関する条件は

$$(a-1)^2 - 4b \neq 0$$

です。この場合は λ について2つの解 λ_2 と λ_3 が求まるため、これらを使った基本解を重ね合わせて

$$y = c_2 x^{\lambda_2} + c_3 x^{\lambda_3}$$

が解です。

判別式が0の場合

判別式に関する条件は

$$(a-1)^2 - 4b = 0$$

です。この場合、 λ は1つの重解 λ_2 のみを持ちます。2つの基本解がなくてはならないのに困りましたね。こんなときには定数変化法です。2つの基本解を

$$\begin{aligned} y_2 &= x^{\lambda_2} \\ y_3 &= c(x)x^{\lambda_2} \end{aligned}$$

と置きます。まず y_3 の微分したものを求めておきます。

$$\begin{aligned} \frac{dy_3}{dx} &= x^{\lambda_2} \frac{d}{dx} c(x) + \lambda_2 x^{\lambda_2-1} c(x) \\ \frac{d^2 y_3}{dx^2} &= x^{\lambda_2} \frac{d^2}{dx^2} c(x) + 2\lambda_2 x^{\lambda_2-1} \frac{d}{dx} c(x) + \lambda_2(\lambda_2-1)x^{\lambda_2-2} c(x) \end{aligned}$$

では元の微分方程式 3.29 に代入してみましょう。

$$\begin{aligned} x^2 \left(x^{\lambda_2} \frac{d^2}{dx^2} c(x) + 2\lambda_2 x^{\lambda_2-1} \frac{d}{dx} c(x) + \lambda_2(\lambda_2-1)x^{\lambda_2-2} c(x) \right) \\ + ax \left(x^{\lambda_2} \frac{d}{dx} c(x) + \lambda_2 x^{\lambda_2-1} c(x) \right) + bc(x)x^{\lambda_2} = 0 \end{aligned}$$

また2行になってしまいましたが頑張って整理します。定数変化法は総じて計算が煩雑になるので、できればエスパーで求めたいものです…。

$$x^{\lambda_2+2} \frac{d^2}{dx^2} c(x) + (2\lambda_2 + a)x^{\lambda_2+1} \frac{d}{dx} c(x) + (\lambda_2^2 + (a-1)\lambda_2 + b)x^{\lambda_2} c(x) = 0$$

なんだか3.9.1節で見た展開ですが、まず $c(x)$ の項の係数が式 3.30 より 0 になります。そして、実際に λ_2 を a を使った式で求めてみると、

$$\lambda_2 = \frac{1-a}{2}$$

となるので、式を整理すると、

$$\begin{aligned} x^{\lambda_2+2} \frac{d^2}{dx^2} c(x) + x^{\lambda_2+1} \frac{d}{dx} c(x) &= 0 \\ \frac{d^2}{dx^2} c(x) &= -\frac{1}{x} \frac{d}{dx} c(x) \end{aligned}$$

となります。この微分方程式は比較的簡単に解けそうです。まず $dc(x)/dx = c'(x)$ を求めることを考えると、これは変数分離形です。

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} c'(x) &= -\frac{1}{x} c'(x) \\ \int \frac{1}{c'(x)} dc'(x) &= -\int \frac{1}{x} dx \\ \ln |c'(x)| &= -\ln |x| \\ c'(x) &= \pm \frac{1}{x} \end{aligned}$$

これを x で積分すれば、

$$c(x) = \ln |x|$$

このように $c(x)$ が求まります。よって2つの線形独立な基本解は、

$$\begin{aligned} y_2 &= x^{\lambda_2} \\ y_3 &= x^{\lambda_2} \ln |x| \end{aligned}$$

一般解は、

$$y = x^{\lambda_2} (c_2 + c_3 \ln |x|)$$

です。

3.11 定数係数連立微分方程式

こんな微分方程式が与えられたとします。

$$\begin{aligned}
y_1 &= y \\
\frac{dy_1}{dx} &= y_2 \\
\frac{dy_2}{dx} &= y_3 \\
&\vdots \\
\frac{dy_n}{dx} &= f(x, y_1, \dots, y_{n-1})
\end{aligned}$$

これを行列を使った式にしてみましょう。

$$\begin{aligned}
\mathbf{y} &= (y_1, y_2, \dots, y_n) \\
A &= \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{3.31}$$

を導入して、行列 A の要素を適当に決めると微分方程式が

$$\frac{d\mathbf{y}}{dx} = A\mathbf{y} \tag{3.32}$$

と表せます。この \mathbf{y} がベクトルではなかった場合は、解が何になったでしょうか。 $y = e^{\lambda x}$ でしたね。今回は \mathbf{c} を任意定数で構成された定ベクトルとして、

$$\mathbf{y} = \mathbf{c}e^{Ax}$$

と解を置いてみましょう。

行列 A の n 個の固有値を $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 、固有ベクトルを $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$ とすると、解は

$$\mathbf{y} = c_1 e^{\lambda_1 x} \mathbf{p}_1 + c_2 e^{\lambda_2 x} \mathbf{p}_2 + \dots + c_n e^{\lambda_n x} \mathbf{p}_n$$

です。

3.12 高階斉次線形微分方程式

ここでは高階の斉次線形微分方程式を考えてみましょう。斉次なので、

$$\frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + a_{n-2} \frac{d^{n-2} y}{dx^{n-2}} + \dots + a_0 y = 0$$

という微分方程式になります。なお、非斉次の場合は3.14節で解説する演算子法を使うことで特殊解 y_1 を求めることができ、 $y = Y + y_1$ と置換することで斉次に帰着できます。

二階の場合と同様に、解として $y = e^{\lambda x}$ を仮定してみましょう。これを微分方程式に代入すると、二階のときと同様にして、特性方程式

$$\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + a_{n-2}\lambda^{n-2} + \cdots + a_0 = 0 \quad (3.33)$$

が得られます。これが n 個の解を持てば、各 λ_i に対応する解 y_i を使って、

$$y = c_2 y_2 + c_3 y_3 + \cdots + c_{n+1} y_{n+1}$$

が解です。

λ について解が n 重解 (つまり λ が 1 つしか計算できなかったとき) となったときにはどうすれば良いでしょうか。二階のときと同じように定数変化法を使いましょう。 n 重解を λ_0 と置き、解を

$$y = C(x)e^{\lambda_0 x}$$

とします。微分方程式に代入します。すると、

$$\begin{aligned} & a_0 C(x)e^{\lambda_0 x} + \left(a_1 \lambda_0 C(x)e^{\lambda_0 x} + a_1 e^{\lambda_0 x} \frac{d}{dx} C(x) \right) \\ & + \left(a_2 \lambda_0^2 C(x)e^{\lambda_0 x} + 2a_2 \lambda_0 e^{\lambda_0 x} \frac{d}{dx} C(x) + a_2 e^{\lambda_0 x} \frac{d^2}{dx^2} C(x) \right) + \cdots = 0 \end{aligned}$$

という式が出てきます。これの全体を $e^{\lambda_0 x}$ で割り、 $C(x)$ の階数で整理すると、

$$\begin{aligned} & C(x)(a_0 + a_1 \lambda_0 + a_2 \lambda_0^2 + \cdots) + \frac{d}{dx} C(x)(a_1 + 2a_2 \lambda_0 + 3a_3 \lambda_0^2 + \cdots) \\ & + \frac{d^2}{dx^2} C(x)(a_2 + 3a_3 \lambda_0 + 6a_4 \lambda_0^2 + \cdots) + \cdots + \frac{d^n}{dx^n} C(x) = 0 \end{aligned} \quad (3.34)$$

となります。この式に出てくる係数はパスカルの三角形を上から斜めに見たときの数字に対応しています。気になる方は調べてみてください。

ここで、式 3.33 を n 重解 λ を使って書き直すと、

$$(\lambda - \lambda_0)^n = 0$$

です。これを展開して式 3.33 と λ の係数を比較すると、各 i に対して

$$a_i = (-1)^i {}_n C_i$$

とわかります。ここで、先ほど式 3.34 に出てくる係数がパスカルの三角形を斜めに見た数字であると書きました。よって、 $C(x)$ の k 階微分の係数は

$$\sum_{i=k}^n {}_i C_k (-1)^i {}_n C_i$$

となります。階乗を使って書き直すと、

$$\begin{aligned} & \sum_{i=k}^n \frac{i!}{k!(i-k)!} (-1)^i \frac{n!}{(n-i)!i!} \\ &= \sum_{i=k}^n (-1)^i \frac{n!}{(n-i)!(i-k)!k!} \end{aligned}$$

です。 $n-k$ が偶数の場合、任意の $0 \leq a \leq (n-k)/2$ について、 $i = k+a$ と $i = n-a$ で項が打ち消し合い、全体が0になります。また、 $n-k \geq 1$ が奇数のときは、 i が奇数の項の和と i が偶数の項の和が打ち消し合い、全体が0になります。

つまり、式 3.34 は結局、最後の d^n/dx^n の項のみが残り、

$$\frac{d^n}{dx^n} C(x) = 0$$

となります。

これを n 回積分すると、 $C(x)$ は

$$C(x) = c_2 + c_3x + c_4x^2 + \cdots + c_{n+1}x^{n-1}$$

となり、それぞれの c_i について線形独立な基本解が n 個求まりました。これでこの微分方程式の解は

$$y = (c_2 + c_3x + c_4x^2 + \cdots + c_{n+1}x^{n-1})e^{\lambda x}$$

となります。

では、解が m ($m < n$) 重解となったときのことを考えましょう。ある λ_i について解が m 重解になったとき、その λ_i に対する m 個の独立な基本解は n 重解のときと同じように、

$$e^{\lambda_i x}, xe^{\lambda_i x}, x^2e^{\lambda_i x}, \dots, x^{m-1}e^{\lambda_i x}$$

となります。

3.13 級数展開法

微分方程式の解として級数解が求まる場合があります。与えられた微分方程式に

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$$

を仮定して代入します。テイラー展開の形ですね。例として一階の微分方程式 3.2

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y + Q(x) = 0$$

を考えると、

$$\sum_{n=0}^{\infty} n c_n (x-a)^{n-1} + P(x) \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n + Q(x) = 0$$

となり、 x の次数に注目して両辺の係数を比較することで i 番目の c_i が求まる場合があります。この方法を整級数展開法と言います。

「求まる場合がある」と書いたのは、例えば 0 でない定数 α を使って

$$c_i = c_i + \alpha$$

となるなど、 c_i が求まらない場合があるのです。この場合は求める関数 y が $x = a$ 周りでテイラー展開できません。

具体的な級数解の求め方は本節の小節で紹介します。

3.13.1 正則点と特異点・フロベニウスの方法

二階斉次線形微分方程式

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + P(x) \frac{dy}{dx} + Q(x)y = 0$$

について、場合分けをします。

- $P(x), Q(x)$ が $x = a$ でなめらか: $x = a$ は正則点
- 上でなく、 $(x-a)P(x), (x-a)^2 Q(x)$ が $x = a$ でなめらか: $x = a$ は確定特異点
- それ以外: $x = a$ は不確定特異点

正則点周りの展開は整級数展開で答えが得られます。

確定特異点周りは $c_0 \neq 0$ として、解を

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^{n+\lambda}$$

と置きます。微分すると、

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+\lambda) (x-a)^{n+\lambda-1} \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+\lambda)(n+\lambda-1) (x-a)^{n+\lambda-2} \end{aligned}$$

です。また、 $P(x)$ と $Q(x)$ について、

$$(x-a)P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n(x-a)^n$$

$$(x-a)^2Q(x) = \sum_{n=0}^{\infty} q_n(x-a)^n$$

と展開することにします。すると、与えられた微分方程式は

$$(x-a)^2 \frac{d^2y}{dx^2} + (x-a)P(x) \cdot (x-a) \frac{dy}{dx} + (x-a)^2Q(x)y = 0$$

と書き直せます。

これらを書き直した微分方程式に代入して x^λ の項の係数に注目すると、

$$c_0\lambda(\lambda-1) + p_0\lambda c_0 + q_0c_0 = 0$$

$$\lambda(\lambda-1) + p_0\lambda + q_0 = 0$$

という式が出てきます。これを「決定方程式」と言います。なお、微分方程式の右辺が0より決定方程式の右辺は0になります。

決定方程式の解 λ_1, λ_2 について考えてみましょう。このとき、

- $\lambda_1 - \lambda_2 \in \mathbb{Z}$: $\max(\lambda_1, \lambda_2)$ に対応する級数解が求まります。
- $\lambda_1 - \lambda_2 \notin \mathbb{Z}$: λ_1, λ_2 の両方に対応する級数解が求まります。

この方法を「フロベニウスの方法」と言います。

3.13.2 エルミートの微分方程式

エルミートの微分方程式は、

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + 2\nu y = 0$$

の形をしたものです。

正則点 $x = 0$ で級数展開してみます。

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

微分すると、

$$\frac{dy}{dx} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n n x^{n-1}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n n(n-1) x^{n-2}$$

となります。これらを代入してみましょう。

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} c_n n(n-1)x^{n-2} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} c_n n x^n + 2\nu \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n &= 0 \\ \sum_{n=-2}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 2c_n(n-\nu)x^n &= 0 \end{aligned} \quad (3.35)$$

ここで式 3.35 の左辺第一項を見てみましょう。 n の回る範囲をずらして書いたのですが、なんと $n = -1, -2$ のときは $(n+2)(n+1)$ のどちらかが 0 になるので \sum の中も 0 になります。よって、この式は

$$\sum_{n=0}^{\infty} (c_{n+2}(n+2)(n+1) - 2c_n(n-\nu))x^n = 0$$

とすっきり書くことができます。右辺が 0 なので全ての n について \sum の中が 0 になります。よって、

$$\begin{aligned} c_{n+2}(n+2)(n+1) - 2c_n(n-\nu) &= 0 \\ c_{n+2} &= \frac{2(n-\nu)}{(n+1)(n+2)} c_n \end{aligned} \quad (3.36)$$

という漸化式が立ちます。 c_0 と c_1 を任意定数 (微分方程式の階数である 2 つあります) としてこの微分方程式が解けました。

ところで、漸化式 3.36 の分子を見ると、 $\nu \in \mathbb{N}$ (0 を含む) のとき、 $n - \nu$ がどこかで 0 になるので、そこで c_n が 0 になることがわかんと思います。漸化式は c_0 始まりのものと c_1 始まりのものの 2 つがあり、どちらか 1 つが途中で 0 になります。

具体的に書くと、 $c_{\nu+2}$ 以降の、 n と ν の偶奇の同じ c_n が 0 になります。よって、解の関数は $\nu+1$ の偶/奇によって偶関数/奇関数となります。

3.13.3 ルジャンドルの微分方程式

ルジャンドルの微分方程式は

$$(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + \nu(\nu+1)y = 0$$

の形をした微分方程式です。

正則点 $x = 0$ で 3.13.2 節と同じように展開すると、

$$\begin{aligned} (1-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} c_n n(n-1)x^{n-2} - 2x \sum_{n=0}^{\infty} c_n n x^{n-1} + \nu(\nu+1) \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n &= 0 \\ \sum_{n=0}^{\infty} c_n n(n-1)x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n(n+1) - \nu(\nu+1))x^n &= 0 \end{aligned}$$

左辺第一項について、 n をずらしましょう。

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{\infty} c_n n(n-1)x^{n-2} &= \sum_{n=-2}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n
\end{aligned}$$

ではまとめてみます。

$$\sum_{n=0}^{\infty} (c_{n+2}(n+2)(n+1) - c_n(n(n+1) - \nu(\nu+1)))x^n = 0$$

右辺が0なので、

$$c_{n+2} = \frac{n(n+1) - \nu(\nu+1)}{(n+1)(n+2)} c_n$$

です。これもまた $\nu \in \mathbb{N}$ (0を含む) の場合は $c_{\nu+2}$ から先の n と ν の偶奇の同じ c_n が0になります。よって、解の関数は $\nu+1$ の偶/奇によって偶関数/奇関数となります。

3.13.4 ベッセルの微分方程式

ベッセルの微分方程式は

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{1}{x} \frac{dy}{dx} + \left(1 - \frac{\nu^2}{x^2}\right) y = 0$$

の形をしたものです。これは $x=0$ が確定特異点ですので、 $c_0 \neq 0$ を条件に

$$y = x^\lambda \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

として級数解を探します。決定方程式

$$\lambda(\lambda-1) + \lambda - \nu^2 = 0$$

より、

$$\lambda = \pm \nu$$

とわかります。

では解の形を微分方程式 (全体に x^2 を掛けたもの) に代入してみましょう。

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{\infty} c_n(n \pm \nu)(n \pm \nu - 1)x^{n \pm \nu} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n(n \pm \nu)x^{n \pm \nu} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n \pm \nu + 2} - \nu^2 \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n \pm \nu} &= 0 \\
\sum_{n=0}^{\infty} c_n((n \pm \nu)^2 - \nu^2)x^{n \pm \nu} + \sum_{n=2}^{\infty} c_{n-2}x^{n \pm \nu} &= 0 \\
c_0(\nu^2 - \nu^2)x^{\pm \nu} + c_1(1 \pm 2\nu)x^{1 \pm \nu} + \sum_{n=2}^{\infty} (c_n(n^2 \pm 2n\nu) + c_{n-2})x^{n \pm \nu} &= 0
\end{aligned}$$

$n = 0, 1$ の場合のみ分けて、 \sum の始まりを 2 に揃えました。

このとき、

- $n = 1$ のとき $(\pm 2\nu + 1)c_1 = 0$ であるから、 $\nu = \pm 1/2$ であれば $c_1 = 0$
- $n \geq 2$ のとき $(n \pm \nu)^2 - \nu^2 \neq 0$ であれば

$$c_n = \frac{1}{\pm 2\nu n - n^2} c_{n-2}$$

として級数解が求まります。

3.14 演算子法

演算子法は非斉次の線形微分方程式の特殊解を求める方法です。

微分演算子 d/dx を簡単に D と書くことにします。

$$\begin{aligned}
Dy &= \frac{dy}{dx} \\
(3D + D^2)y &= 3\frac{dy}{dx} + \frac{d^2y}{dx^2}
\end{aligned}$$

と表記します。

また、例えば

$$Dy = f(x)$$

という微分方程式があった際にはどう解いたでしょうか。3.1 節で紹介したように、両辺 x で積分しますね。これを、 D を数字のように扱って、

$$y = \frac{1}{D}f(x)$$

と表してしまいます。つまり、 $1/D$ は積分を表す記号になります¹³。

ここで、定数 a を使った $Y = f(x)/(D + a)$ について考えてみましょう。

¹³ 「こんな適当なことをして良いのか」と思われる方がいらっしゃると思いますが、この方法は発明された後にラプラス変換 (3.15 節) と等価であるとわかりました。結論から言ってしまうと数学的に正しいです。

$$\begin{aligned}
Y &= \frac{1}{D+a} f(x) \\
(D+a)Y &= f(x) \\
DY + aY &= f(x) \\
Y &= e^{-ax} \int e^{ax} f(x) dx
\end{aligned}$$

最後の式変形は Y についての一階非斉次微分方程式 (3.4 節) として処理しました。例として微分方程式を一つ解いてみましょう。

$$(D^2 + (a+b)D + ab)y = f(x)$$

という微分方程式があったとすると、これは

$$\begin{aligned}
(D+a)(D+b)y &= f(x) \\
y &= \frac{1}{D+a} \frac{1}{D+b} f(x)
\end{aligned}$$

となり、先ほど紹介した公式に従って計算すれば特殊解を求めることができます。また、

$$\frac{1}{D+a} \frac{1}{D+b} = \frac{1}{b-a} \left(\frac{1}{D+a} - \frac{1}{D+b} \right)$$

としても計算できます。

3.15 ラプラス変換

ラプラス変換は、

$$\mathcal{L}(f(x)) = \int_0^\infty f(x) e^{-sx} dx$$

という変換で、 $f(x)$ をラプラス変換すると $\mathcal{L}(f(x))$ となり、 s の関数となります。

様々な関数のラプラス変換をまとめると以下になります。基本的にはこれらの変換表を使って変換することになりますが、この証明は本書の目的から外れるので割愛します。

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}(1) &= \frac{1}{s} \\
\mathcal{L}(e^{kx}) &= \frac{1}{s-k} \\
\mathcal{L}(\sin kx) &= \frac{k}{s^2 + k^2} \\
\mathcal{L}(\cos kx) &= \frac{s}{s^2 + k^2} \\
\mathcal{L}(x^n) &= \frac{n!}{s^{n+1}}
\end{aligned}$$

重要なのはラプラス変換における微分・積分の性質です。実際に関数 $f(x)$ を x で微分してラプラス変換してみましょう。

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left(\frac{d}{dx}f(x)\right) &= \int_0^\infty \left(\frac{d}{dx}f(x)\right)e^{-sx}dx \\ &= [f(x)e^{-sx}]_{x=0}^\infty + s \int_0^\infty f(x)e^{-sx}dx \\ &= s\mathcal{L}(f(x)) - f(0)\end{aligned}$$

元の関数 $f(x)$ のラプラス変換に s が掛けられた形 (と $-f(0)$ の和) になりました。次に $f(x)$ を積分してラプラス変換してみましょう。

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left(\int f(x)dx\right) &= \int_0^\infty \left(\int f(x)dx\right)e^{-sx}dx \\ &= \left[-\left(\int f(x)dx\right)\frac{1}{s}e^{-sx}\right]_{x=0}^\infty + \frac{1}{s} \int_0^\infty f(x)e^{-sx}dx \\ &= \frac{1}{s}\mathcal{L}(f(x)) - \frac{1}{s} \int f(x)dx \Big|_{x=0}\end{aligned}$$

元の関数 $f(x)$ のラプラス変換を s で割った形 (と $\int f(x)dx|_{x=0}/s$ の和) になりました。簡単にまとめると、ラプラス変換後の世界では

- 微分は s を掛ける操作
- 積分は s で割る操作

となります。演算子法に似ていますね。
演算子法と同じ

$$\frac{d^2y}{dx^2} + (a+b)\frac{dy}{dx} + aby = f(x)$$

を考えてみましょう。両辺をラプラス変換して、

$$\begin{aligned}\left(s^2\mathcal{L}(y(x)) - sy(0) - \frac{dy}{dx}\Big|_{x=0}\right) - (a+b)(s\mathcal{L}(y(x)) - y(0)) + ab\mathcal{L}(y(x)) &= \mathcal{L}(f(x)) \\ (s^2 + (a+b)s + ab)\mathcal{L}(y(x)) + ((a+b) - s)y(0) - \frac{dy}{dx}\Big|_{x=0} &= \mathcal{L}f(x)\end{aligned}$$

計算の簡略化のため、初期条件 $y(0) = 0$ および y の微分 $y'(0) = 0$ であるとする、

$$\begin{aligned}(s^2 + (a+b)s + ab)\mathcal{L}(y(x)) &= \mathcal{L}(f(x)) \\ \mathcal{L}(y(x)) &= \frac{1}{s^2 + (a+b)s + ab}\mathcal{L}(f(x))\end{aligned}\tag{3.37}$$

となります。これを演算子法と同様に積分すれば、 $\mathcal{L}(y(x))$ が求まります。最後にラプラス逆変換

$$f(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \mathcal{L}(f(x)) e^{sx} ds$$

をすれば答えが求まります。

ところで、演算子法 (3.14 節) で、「演算子法はラプラス変換と等価である」と少しお話ししました。ここでもう一度式 3.37 を見てみましょう。この式を解けばラプラス変換された $y(x)$ が求まります。これを最後に逆ラプラス変換して最終的な答え $y(x)$ を求めるのですが、最初からラプラス変換しないことにしてみるとどうでしょう。これは演算子法と等価になります。演算子法はラプラス変換を使った微分方程式の解法からラプラス変換を省いたものであると言えます。

第4章 解析的に偏微分方程式を解く

さて、常微分方程式の次は偏微分方程式です。偏微分方程式はその名の通り式に偏微分した関数が出てくる形の微分方程式です。これはあまりにも複雑で、人間が解けることはほとんどありません。しかし、一部の場合において解析的に解くことが可能です。本章では解析的に解ける偏微分方程式を解説していきます。

4.1 変数分離形

偏微分方程式でも変数分離が使える場合があります。関数 u を求める微分方程式

$$f(x)\frac{\partial u}{\partial x} = g(y)\frac{\partial u}{\partial y} \quad (4.1)$$

を考えてみましょう。この微分方程式について、もし

$$u(x, y) = P(x)Q(y)$$

と解が書けると仮定するとどうでしょうか。

準備として u を x と y のそれぞれで微分してみましょう。

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= Q(y) \frac{d}{dx} P(x) \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= P(x) \frac{d}{dy} Q(y) \end{aligned}$$

これらを元の微分方程式 4.1 に代入します。

$$f(x)Q(y)\frac{d}{dx}P(x) = g(y)P(x)\frac{d}{dy}Q(y)$$

左辺には x 、右辺には y のみを出現させるように移項してみましょう。

$$\frac{f(x)}{P(x)} \frac{d}{dx} P(x) = \frac{g(y)}{Q(y)} \frac{d}{dy} Q(y)$$

左辺は x の関数、右辺は y の関数で、それらが等号で結ばれています。つまり、この式の値は定数 K になります。この K を「変数分離定数」と言います。すると、この偏微分方程式は

$$\begin{aligned}\frac{f(x)}{P(x)} \frac{d}{dx} P(x) &= K \\ \frac{g(y)}{Q(y)} \frac{d}{dy} Q(y) &= K\end{aligned}\tag{4.2}$$

という2つの常微分方程式に帰着できます。この2つの式の具体的な解き方はほとんど同じですので、式4.2を実際に解いてみましょう。式4.2は

$$\frac{1}{P(x)} dP(x) = K f(x) dx$$

と変形できます。これは常微分方程式の変数分離形ですね。以下のように積分しましょう。

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{P} dP &= \int K f(x) dx \\ \ln P(x) &= K \int f(x) dx + C \\ P(x) &= A e^{K \int f(x) dx}\end{aligned}$$

このようにして $P(x)$ と $Q(y)$ を求めることができます。ただし、式4.2のように常微分方程式に帰着した際に変数分離定数 K の正負、および0かどうかで場合分けが必要な場合があります。

4.2 一階線形偏微分方程式

次に、このような一階線形偏微分方程式を考えてみましょう。

$$f(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial x} + g(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial y} = h(x, y, u)$$

いきなりですが、 u の全微分

$$\frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = du$$

を考えます。この両式を見比べると、

$$f(x, y, u) = dx, \quad g(x, y, u) = dy, \quad h(x, y, u) = du$$

が導け、それぞれ移項すると

$$\frac{dx}{f(x, y, u)} = \frac{dy}{g(x, y, u)} = \frac{du}{h(x, y, u)}$$

となります。これは連立常微分方程式で、「特性微分方程式」と言います。これを解くと x, y, u の関係式が2つ導けます。それらが C_1, C_2 を定数として

$$v(x, y, u) = C_1, \quad w(x, y, u) = C_2$$

だったとします。これらを「特性曲線」と言い、この特性曲線を任意の関数 $F(t_1, t_2) = 0$ の t_1, t_2 に入れたものが元の偏微分方程式の解となります。

$$F(v, w) = 0$$

一般に u が n 個の変数 x_1, x_2, \dots, x_n による関数であるとき、一階線形偏微分方程式

$$f_1 \frac{\partial u}{\partial x_1} + f_2 \frac{\partial u}{\partial x_2} + \dots + f_n \frac{\partial u}{\partial x_n} = f$$

の特性微分方程式は

$$\frac{dx_1}{f_1} = \frac{dx_2}{f_2} = \dots = \frac{dx_n}{f_n} = \frac{du}{f}$$

です。

4.3 演算子の因数分解

高階の微分方程式では、演算子を因数分解できる場合があります。

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + (a+b) \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + ab \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) u(x, y) = 0$$

という微分方程式を

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} + a \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(\frac{\partial}{\partial y} + b \frac{\partial}{\partial x} \right) u(x, y) = 0$$

と因数分解してみましょう。

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} + a \frac{\partial}{\partial y} \right) u = 0 \quad \text{または} \quad \left(\frac{\partial}{\partial y} + b \frac{\partial}{\partial x} \right) u = 0$$

として一階の偏微分方程式に分解できます。

第5章 数値的に常微分方程式を解く

第1章で触れたように、世の中にある大半の微分方程式は解析的に解くことができません。そこで登場するのが数値解析です。計算機の力で微分方程式を数値的に解きます。具体的に関数 $y(x)$ を求めるのであれば、離散的な (飛び飛びの) 値 x_i に対して、各 y_i を精度良く求めます。この y_i を精度良く求めるために、様々な手法が考案されました。それらを紹介します。

本書では数値解析の手法を紹介することに重点を置きます。よって、数値解析にまつわる丸め誤差や桁落ちなどについては触れません。なお、具体的なアルゴリズムの紹介には疑似コードを使います。具体的な問題とコードは第9章で紹介します。

5.1 オイラー法

オイラー法は最も簡単な数値解析の手法です。問題とする微分方程式を

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (5.1)$$

とします。また、初期条件を

$$y(x_0) = Y_0 \quad (5.2)$$

とします。

h を十分小さい定数として、 $y(x+h)$ をテイラー展開します。

$$y(x+h) = y(x) + h \frac{d}{dx} y(x) + \frac{h^2}{2!} \frac{d^2}{dx^2} y(x) + \cdots \quad (5.3)$$

ここで、 h は十分小さいので h の次数が2以上の項を無視します。すると、式5.1より $dy(x)/dx$ を $f(x, y)$ に置換して、

$$y(x+h) = y(x) + hf(x, y(x)) + O(h^2)$$

となります¹。この式は何を意味するのでしょうか。右辺は $y(x)$ と x 、および与えられた関数 f で構成された式、左辺は $y(x+h)$ です。そうです。第1章で少しお話しした、「今 ($y(x)$) の状態から少し先の未来 ($y(x+h)$) を知る」方程式です。図5.1を参照してください。

¹ $O(h^2)$ の項は、 O 記法 (Order の O) と言い、カッコの中身程度の量を表します。今回は h^2 以降の項を無視したので h^2 程度の量がこれに追加されます、という意味です。なお、この $O(h^2)$ は微小量として無視する量ですので、後に誤差の話としてもう一度現れます。




図 5.1: オイラー法のイメージ

図 5.1 のように、 h ごとに取られた各点 x_i に対して、それぞれに対応する正しい y の値 y_i 、および計算機で計算した近似値 Y_i を考えます。このとき、 h を「刻み幅」と言います。刻み幅は一定である必要はありませんが、ここでは一定としておきます。

この考え方をを使うと、 Y_{i+1} は漸化式のように、

$$Y_{i+1} = Y_i + hf(x_i, Y_i)$$

と書けます。この式を使って初期条件 x_0 で Y_0 から順番に x を進めていくことで、関数 y の近似を求めることができます。

擬似コードを以下に示します。

アルゴリズム 5.1 オイラー法

Input: x_0, Y_0, h, N

Output: Y_N

```

for  $i = 0$  to  $N - 1$  do
   $x_i \leftarrow x_{i-1} + h$ 
   $Y_{i+1} \leftarrow Y_i + hf(x_i, Y_i)$ 
end for
return  $Y_N$ 

```

h の 2 乗以上の項を無視したので、局所誤差²は $O(h^2)$ です。

また、誤差の蓄積を考えれば、最終的に得られる計算結果に含まれる誤差³は

$$O(h^2) \times \frac{x_N - x_0}{h} = O(h)$$

となり、 $O(h)$ の誤差が含まれていると言えます。

5.2 修正オイラー法 (中点法)

オイラー法は計算が軽い反面、言ってしまうえば精度がいまいちでした。そこで、簡単に精度を上げる方法として図 5.2 の方法を考えます。

²一回の計算につき生じうる誤差のことです

³計算を繰り返し、最終的に生じうる誤差のことです




図 5.2: 修正オイラー法のイメージ

これは、

1. 通常のエuler法を使って $Y_{i+1/2}$ を求める
2. 微分方程式から $Y_{i+1/2}$ での勾配 k を求める
3. $Y_{i+1} = Y_i + hk$ として Y_{i+1} を定める

という手順を踏んでいます。修正オイラー法は勾配として点 $Y_{i+1/2}$ での傾きを使うことに特徴があります。これを擬似コードにすると以下になります。解く微分方程式はオイラー法と同じ式 5.1 とします。

アルゴリズム 5.2 修正オイラー法

Input: x_0, Y_0, h, N

Output: Y_N

for $i = 0$ **to** $N - 1$ **do**

$$x_{i+1/2} \leftarrow x_i + \frac{h}{2}$$

$$Y_{i+1/2} \leftarrow Y_i + \frac{h}{2} f(x_i, Y_i)$$

$$Y_{i+1} \leftarrow Y_i + h f(x_{i+1/2}, Y_{i+1/2})$$

end for

return Y_N

計算はオイラー法よりも多少重くなってしまいました（とは言っても定数倍です）が、精度はかなり良くなりました。実際に誤差を見積もってみましょう。修正オイラー法は、擬似コードを1つの式にすれば、

$$Y_{i+1} = Y_i + hf\left(x_{i+1/2}, Y_i + \frac{h}{2}f(x_i, Y_i)\right)$$

です。 $f(x, y) = dy/dx$ とオイラー法で出てきたテイラー展開式 5.3 を使って展開してみましょう。

$$\begin{aligned}
Y_{i+1} &= Y_i + h \left(\frac{d}{dx} y \left(x_i + \frac{h}{2} \right) \right) \\
&= Y_i + h \frac{d}{dx} \left(y(x_i) + \frac{h}{2} \frac{d}{dx} y(x_i) \right) \\
&= Y_i + h \frac{d}{dx} y(x_i) + \frac{h^2}{2} \frac{d^2}{dx^2} y(x_i)
\end{aligned} \tag{5.4}$$

テイラー展開式 5.3 と比べると、2 次の項まで一致しています。よって局所誤差は $O(h^3)$ です。よって、最終的に生じうる誤差は

$$O(h^3) \times \frac{x_N - x_0}{h} = O(h^2)$$

です。オイラー法は $O(h)$ でしたので、ぐんと誤差が小さくなりましたね。

5.3 ルンゲ・クッタ法

ここではまず狭義のルンゲ・クッタ法を紹介し、その後一般化されたルンゲ・クッタ法を紹介します。

オイラー法や修正オイラー法は

$$Y_{i+1} = Y_i + h\Phi(x_i, Y_i)$$

という形の式をしていました。ルンゲ・クッタ法ではこの式について Φ を工夫することで精度を高める試みをしています。オイラー法や修正オイラー法では勾配を 1 つだけ求め、それを採用していましたが、ルンゲ・クッタ法では勾配を複数求め、その重みつき平均を勾配とします。

狭義のルンゲ・クッタ法は、「4 段 4 次のルンゲ・クッタ法」と呼ばれ、

$$\begin{aligned}
k_1 &= f(x_i, Y_i) \\
k_2 &= f\left(x_i + \frac{h}{2}, Y_i + \frac{k_1}{2}\right) \\
k_3 &= f\left(x_i + \frac{h}{2}, Y_i + \frac{k_2}{2}\right) \\
k_4 &= f(x_i + h, Y_i + hk_3)
\end{aligned}$$

として勾配 k_1 から k_4 を定義して、

$$Y_{i+1} = Y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \tag{5.5}$$

として Y_{i+1} を求めます。たくさん k が出てきましたが、これらは、

- k_1 は x_i での勾配 (通常のオイラー法で使う勾配)
- k_2 は $x_{i+1/2}$ での勾配 (修正オイラー法で使う勾配)
- k_3 は k_2 の値から推測した $Y_{i+1/2}$ を使用した、 $x_{i+1/2}$ での勾配
- k_4 は k_3 の値から推測した Y_{i+1} を使用した、 x_{i+1} での勾配

という意味を持ちます。 k を図にすると図 5.3 となります。




図 5.3: 4 段 4 次ルンゲ・クッタ法のイメージ

これらの k を重みをつけて平均し、 Y_{i+1} を求めるときに使う勾配とします。
擬似コードにすると以下です。

アルゴリズム 5.3 4 段 4 次ルンゲ・クッタ法

Input: x_0, Y_0, h, N

Output: Y_N

for $i = 0$ **to** $N - 1$ **do**

$x_i \leftarrow x_{i-1} + h$

$k_1 \leftarrow f(x_i, Y_i)$

$k_2 \leftarrow f(x_i + \frac{h}{2}, Y_i + \frac{k_1}{2})$

$k_3 \leftarrow f(x_i + \frac{h}{2}, Y_i + \frac{k_2}{2})$

$k_4 \leftarrow f(x_i + h, Y_i + hk_3)$

$Y_{i+1} \leftarrow Y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$

end for

return Y_N

4 段 4 次のルンゲ・クッタ法の誤差を見積もってみましょう。各 k について dy/dx を使った形に書き換え、最後にルンゲ・クッタ法の式 5.5 に代入します。

まずは k_1 についてです。

$$k_1 = \frac{d}{dx}y(x_i)$$

k_2 については、

$$\begin{aligned} k_2 &= \frac{d}{dx}y\left(x_i + \frac{h}{2}\right) \\ &= \frac{d}{dx}\left(y(x_i) + \frac{h}{2}\frac{d}{dx}y(x_i)\right) \\ &= \frac{d}{dx}y(x_i) + \frac{h}{2}\frac{d^2}{dx^2}y(x_i) \end{aligned}$$

k_3 は、

$$\begin{aligned} k_3 &= \frac{d}{dx}y\left(x_i + \frac{h}{2}\right) \\ &= \frac{d}{dx}\left(y(x_i) + \frac{h}{2}\frac{d}{dx}y\left(x_i + \frac{h}{2}\right)\right) \quad (k_2 \text{ の傾きを使う}) \\ &= \frac{d}{dx}\left(y(x_i) + \frac{h}{2}\left(\frac{d}{dx}y(x_i) + \frac{h}{2}\frac{d^2}{dx^2}y(x_i)\right)\right) \\ &= \frac{d}{dx}y(x_i) + \frac{h}{2}\frac{d^2}{dx^2}y(x_i) + \frac{h^2}{4}\frac{d^3}{dx^3}y(x_i) \end{aligned}$$

最後に k_4 です。

$$\begin{aligned} k_4 &= \frac{d}{dx}y(x_i + h) \\ &= \frac{d}{dx}\left(y(x_i) + h\frac{d}{dx}y\left(x_i + \frac{h}{2}\right)\right) \quad (k_3 \text{ の傾きを使う}) \\ &= \frac{d}{dx}\left(y(x_i) + h\left(\frac{d}{dx}y(x_i) + \frac{h}{2}\frac{d^2}{dx^2}y(x_i) + \frac{h^2}{4}\frac{d^3}{dx^3}y(x_i)\right)\right) \\ &= \frac{d}{dx}y(x_i) + h\frac{d^2}{dx^2}y(x_i) + \frac{h^2}{2}\frac{d^3}{dx^3}y(x_i) + \frac{h^3}{4}\frac{d^4}{dx^4}y(x_i) \end{aligned}$$

さて、では4段4次のルンゲ・クッタ法の式5.5に代入しましょう。

$$\begin{aligned} Y_{i+1} &= Y_i + \frac{h}{6}\frac{d}{dx}y(x_i) + \frac{h}{3}\left(\frac{d}{dx}y(x_i) + \frac{h}{2}\frac{d^2}{dx^2}y(x_i)\right) \\ &\quad + \frac{h}{3}\left(\frac{d}{dx}y(x_i) + \frac{h}{2}\frac{d^2}{dx^2}y(x_i) + \frac{h^2}{4}\frac{d^3}{dx^3}y(x_i)\right) \\ &\quad + \frac{h}{6}\left(\frac{d}{dx}y(x_i) + h\frac{d^2}{dx^2}y(x_i) + \frac{h^2}{2}\frac{d^3}{dx^3}y(x_i) + \frac{h^3}{4}\frac{d^4}{dx^4}y(x_i)\right) \\ &= Y_i + h\frac{d}{dx}y(x_i) + \frac{h^2}{2}\frac{d^2}{dx^2}y(x_i) + \frac{h^3}{6}\frac{d^3}{dx^3}y(x_i) + \frac{h^4}{24}\frac{d^4}{dx^4}y(x_i) \end{aligned}$$

綺麗にテイラー展開の式5.3と4次の項まで一致しました。よって、4段4次ルンゲ・クッタ法の局所誤差は $O(h^5)$ 、最終的に生じうる誤差は $O(h^4)$ です。実は「4段」は k の数である4つ、「4次」は最終的な誤差の次数 $O(h^4)$ の4です。

5.3.1 一般的なルンゲ・クッタ法

n 段のルンゲ・クッタ法は、

$$k_i = f\left(x_i + hc, Y_i + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j\right)$$

として、

$$Y_{i+1} = Y_i + \sum_{i=1}^n b_i k_i$$

と書けます。なお、 m 次の精度を出すために必要な最低段数は

表 5.1: m 次のルンゲ・クッタ法に必要な最低の段数 n

m 次	1	2	3	4	5	6	7	8
n 段	1	2	3	4	6	7	9	11

です。

ちなみにオイラー法は「1 段 1 次ルンゲ・クッタ法」、修正オイラー法は「2 段 2 次ルンゲ・クッタ法」です。

5.4 連立微分方程式

これまでは一つの微分方程式を解いてきました、ここでは連立微分方程式を解きます。連立微分方程式は全て 1 階で⁴、 n 個あるとします。それぞれの微分方程式は

$$\frac{dy_i}{dx} = f_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$$

と表せるとします。すると、ベクトル

$$\begin{aligned} \mathbf{y} &= (y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \mathbf{f}(x, \mathbf{y}) &= \begin{pmatrix} f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \vdots \\ f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

を使って、

$$\frac{d\mathbf{y}}{dx} = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}) \quad (5.6)$$

⁴高階の微分方程式も連立微分方程式へと帰着できるため、実は構成する微分方程式は高階であっても良いのです。高階微分方程式は次節で扱います。

というように微分方程式をすっきり表すことができます。このとき、初期条件を $x = x_0$ で、

$$\mathbf{Y}_0 = (y_{1\ 0}, y_{2\ 0}, \dots, y_{n\ 0})$$

と定めます。

式 5.6 は一階の微分方程式 5.1 が単にベクトルになったものではないでしょうか。というわけで、連立微分方程式も難しいことはありません。一階の微分方程式と同様に解くことができます。オイラー法を使った場合の擬似コードを以下に示します。

アルゴリズム 5.4 連立微分方程式でのオイラー法

Input: x_0, \mathbf{Y}_0, h, N

Output: \mathbf{Y}_N

```

for  $i = 0$  to  $N - 1$  do
   $x_i \leftarrow x_{i-1} + h$ 
  for  $j = 0$  to  $n - 1$  do
     $\mathbf{Y}_{i+1}[j] \leftarrow \mathbf{Y}_i[j] + h\mathbf{f}(x_i, \mathbf{Y}_i)[j]$ 
  end for
end for
return  $\mathbf{Y}_N$ 
```

5.5 高階微分方程式

高階微分方程式

$$\frac{d^n y}{dx^n} = f\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \frac{d^2 y}{dx^2}, \dots, \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}}\right)$$

を考えましょう。また、初期条件を $x = x_0$ において

$$\begin{aligned} y &= y_{1\ 0} \\ \frac{dy}{dx} &= y_{2\ 0} \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= y_{3\ 0} \\ &\vdots \\ \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} &= y_{n\ 0} \end{aligned}$$

とします。ここで、見やすくするために

$$\begin{aligned}
y &= y_1 \\
\frac{dy}{dx} &= y_2 \\
\frac{d^2y}{dx^2} &= y_3 \\
&\vdots \\
\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} &= y_n
\end{aligned}$$

を導入すると、 y_i 同士の関係として全ての $i < n$ について

$$\frac{dy_i}{dx} = y_{i+1} \quad (5.7)$$

が導かれ、元の微分方程式は

$$\frac{dy_n}{dx} = f(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \quad (5.8)$$

と表せます。式 5.7 と式 5.8 を合わせるとなんと一階の連立微分方程式になってしまいました。これで 5.4 節の方法で解くことができます。擬似コードはアルゴリズム 5.4 とほぼ同じなので割愛します。

5.6 予測子修正子法

微分方程式 5.1 を解くとして、 x_i 、 x_{i+1} に対応する値 y_i と y_{i+1} は

$$y_{i+1} - y_i = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, y) dx \quad (5.9)$$

という関係を持っています。この右辺をどう精度よく近似するかが問題です。 x_i に対応する Y_i がすでにわかっているとして、右辺の $f(x, y)$ を $f(x_i, Y_i)$ と近似すると、刻み幅を h として

$$Y_{i+1} = Y_i + hf(x_i, Y_i)$$

となります。これはまさにオイラー法です。

では次に式 5.9 の右辺にある積分を、台形公式⁵

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, y) dx \doteq \frac{x_{i+1} - x_i}{2} (f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}))$$

を使うと、

⁵定積分を数値的に計算する手法の一つです。

$$Y_{i+1} = Y_i + \frac{h}{2}(f(x_i, Y_i) + f(x_{i+1}, Y_{i+1})) \quad (5.10)$$

となります。ちょっと待って下さい。右辺に Y_{i+1} があります。このままでは計算できません。

このように、未知の値を求めるために未知の値を必要とする解法を「陰解法」と言います。対してこれまで解説してきたように、未知の値を求めるのに既知の値のみを必要とする解法を「陽解法」と言います。

陰解法は少し面倒ですが、以下の手順で解くことができます。

1. Y_{i+1} の近似値 $Y_{i+1}^{(0)}$ を適当に決める。
2. 式 5.10 の右辺の Y_{i+1} に $Y_{i+1}^{(j)}$ を代入し、左辺 $Y_{i+1}^{(j+1)}$ を求める。
3. 十分小さな正の値 ϵ を使って $|Y_{i+1}^{(j)} - Y_{i+1}^{(j+1)}| < \epsilon$ となるまで 2 を繰り返す。

最初に $Y_{i+1}^{(0)}$ を決めるときにはオイラー法を使うのが良いでしょう。最初に $Y_{i+1}^{(0)}$ を決める演算を「予測子」、その後に繰り返し式 5.10 を使って $Y_{i+1}^{(j)}$ を更新する演算を「修正子」と言います。そしてこのように繰り返し演算して精度良く Y_{i+1} を求める手法を「予測子修正子法」と言います。

通常は修正子の反復回数が 1 回または 2 回となるくらいに刻み幅 h を小さくします。

擬似コードはこちらです。

アルゴリズム 5.6 予測子修正子法

Input: x_0, Y_0, h, N, ϵ

Output: Y_N

```

for  $i = 0$  to  $N - 1$  do
   $x_i \leftarrow x_{i-1} + h$ 
   $x_{i+1} \leftarrow x_i + h$ 
  while  $|Y'_{i+1} - Y_{i+1}| \geq \epsilon$  do
     $Y'_{i+1} \leftarrow Y_{i+1}$ 
     $Y_{i+1} \leftarrow Y_i + \frac{h}{2}(f(x_i, Y_i) + f(x_{i+1}, Y'_{i+1}))$ 
  end while
end for
return  $Y_N$ 

```

5.7 有限差分法

ここまで解いてきた微分方程式は、ある初期値 $x = x_0$ で $y = Y_0$ がわかっていて、そこから x を少しずつ進めていく方法を取っていました。これを初期値問題と言います。一方で、 x の定義域の端での値が求まっている微分方程式が存在します。これが境界値問題です。本節ではこの境界値問題を扱います。

境界値問題の例として、二階の微分方程式

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = f\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right)$$

$$y(x_0) = y_0, \quad y(x_N) = y_N$$

を用いることにしましょう。ここで、 x_0, x_N は定義域の端にあるとします。

境界値問題を解くために、まずは関数 $y(x)$ の導関数を近似的に表すことから始めましょう。微分の定義は

$$\frac{d}{dx}y(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(x+h) - y(x)}{h}$$

でした。計算機は極限を扱うことができないので、数値解析では微分をある有限の小さな値 h を使って

$$\frac{d}{dx}y(x) = \frac{y(x+h) - y(x)}{h} \quad (5.11)$$

と表すことにします。ここで、導関数の導出をもう一つ考えてみましょう。

$$\frac{d}{dx}y(x) = \frac{y(x) - y(x-h)}{h} \quad (5.12)$$

こちらでも導関数の近似として使えないでしょうか。

これらの式にある $y(x+h) - y(x)$ のような量を「差分」と言います。そして、式 5.11 の差分を「前進差分」、式 5.12 の差分を「後退差分」と言います。このように差分を用いて導関数を近似することを「差分近似」と言います。特に式 5.11 を「前進差分近似」、式 5.12 を「後退差分近似」と言います。

では前進差分近似の誤差を考えてみましょう。 $y(x+h)$ をテイラー展開すると、

$$y(x+h) = y(x) + h \frac{d}{dx}y(x) + \frac{h^2}{2!} \frac{d^2}{dx^2}y(x) + \frac{h^3}{3!} \frac{d^3}{dx^3}y(x) + \cdots \quad (5.13)$$

となります。この式を変形すると、

$$\frac{y(x+h) - y(x)}{h} = \frac{d}{dx}y(x) + \frac{h}{2!} \frac{d^2}{dx^2}y(x) + \cdots$$

となり、式 5.11 と比べると誤差が $O(h)$ だとわかります。

後退差分近似についても同じように考えると、

$$\begin{aligned} y(x-h) &= y(x) - h \frac{d}{dx}y(x) + \frac{h^2}{2!} \frac{d^2}{dx^2}y(x) - \frac{h^3}{3!} \frac{d^3}{dx^3}y(x) + \cdots \\ \frac{y(x) - y(x-h)}{h} &= \frac{d}{dx}y(x) - \frac{h}{2!} \frac{d^2}{dx^2}y(x) + \cdots \end{aligned} \quad (5.14)$$

となり、前進差分近似と同じく誤差は $O(h)$ です。

前進差分近似と後退差分近似よりも誤差の少ない方法を考えてみましょう。式 5.13 と式 5.14 を辺々引くと、

$$\begin{aligned} y(x+h) - y(x-h) &= 2h \frac{d}{dx}y(x) + 2 \frac{h^3}{3!} \frac{d^3}{dx^3}y(x) + \cdots \\ \frac{y(x+h) - y(x-h)}{2h} &= \frac{d}{dx}y(x) + \frac{h^2}{3!} \frac{d^3}{dx^3}y(x) + \cdots \end{aligned}$$

となり、別の近似を考えられます。この左辺を $dy(x)/dx$ の近似として用いれば、誤差は $O(h^2)$ となり、前進差分近似、後退差分近似よりも精度の良い近似となりました。これを「中心差分近似」と言います。

前進差分近似、後退差分近似、中心差分近似をまとめて図にすると図 5.4 になります。

なお、 $y(x+2h), y(x+h), y(x-h), y(x-2h)$ のテイラー展開も使って作った中心差分近似を 4 次中心差分近似と言います。この差分近似も時々紹介されます。




図 5.4: 差分近似のイメージ

次に二階の導関数を考えましょう。式 5.13 と式 5.14 を辺々足すと、

$$\begin{aligned} y(x+h) + y(x-h) &= 2y(x) + 2\frac{h^2}{2!} \frac{d^2}{dx^2} y(x) + 2\frac{h^4}{4!} \frac{d^4}{dx^4} y(x) + \cdots \\ \frac{y(x+h) - 2y(x) + y(x-h)}{h^2} &= \frac{d^2}{dx^2} y(x) + 2\frac{h^2}{4!} \frac{d^4}{dx^4} y(x) \end{aligned}$$

となり、誤差が $O(h^2)$ の二階導関数ができました。これは「二階導関数の中心差分近似」と言います。

では微分方程式を解きましょう。微分方程式を $x_i, Y_{i-1}, Y_i, Y_{i+1}$ を使って書き直すと、これまでの近似から、

$$\frac{Y_{i+1} - 2Y_i + Y_{i-1}}{h^2} = f\left(x_i, Y_i, \frac{Y_{i+1} - Y_{i-1}}{2h}\right) \quad (5.15)$$

となります。このように、差分近似を用いて導いた式を「差分方程式」と言います。また、その解を「差分解」と言います。

少し具体的な方程式として二階線形微分方程式

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = P(x) \frac{dy}{dx} + Q(x)y + R(x)$$

を考えてみましょう。ここで、 $P(x), Q(x), R(x)$ は既知の関数です。この問題を式 5.15 を使って書き直すと、

$$\frac{Y_{i+1} - 2Y_i + Y_{i-1}}{h^2} = P(x_i) \frac{Y_{i+1} - Y_{i-1}}{2h} + Q(x_i)Y_i + R(x_i)$$

となります。これを整理して、

$$\left(1 - \frac{1}{2}hP(x_i)\right)Y_{i+1} - (2 + h^2Q(x_i))Y_i + \left(1 + \frac{1}{2}hP(x_i)\right)Y_{i-1} = h^2R(x_i)$$

を得ます。これを、

$$\begin{aligned} a_i &= 1 + \frac{1}{2}hP(x_i) \\ b_i &= -(2 + h^2Q(x_i)) \\ c_i &= 1 - \frac{1}{2}hP(x_i) \end{aligned}$$

と置いて、

$$c_i Y_{i+1} + b_i Y_i + a_i Y_{i-1} = h^2 R(x_i)$$

と書き換えます。この式を $i = 1$ から $i = N - 1$ まで並べて書いてみましょう。

$$\begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & 0 & \dots \\ a_2 & b_2 & c_2 & 0 & \dots \\ 0 & a_3 & b_3 & c_3 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \dots & 0 & a_{N-2} & b_{N-2} & c_{N-2} \\ \dots & 0 & 0 & a_{N-1} & b_{N-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \\ \vdots \\ Y_{N-2} \\ Y_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h^2 R(x_1) - a_1 y_0 \\ h^2 R(x_2) \\ h^2 R(x_3) \\ \vdots \\ h^2 R(x_{N-2}) \\ h^2 R(x_{N-1}) - c_{N-1} y_N \end{pmatrix} \quad (5.16)$$

一番上と一番下の行はそれぞれ定義域の境界なので、境界値を使って

$$\begin{aligned} c_1 Y_2 + b_1 Y_1 &= h^2 R(x_1) - a_1 y_0 \\ b_{N-1} Y_{N-1} + a_{N-1} Y_{N-2} &= h^2 R(x_{N-1}) - c_{N-1} Y_N \end{aligned}$$

の式を用います。

これは単なる連立一次方程式ですね。ここで連立一次方程式の解き方を考えてみましょう。連立一次方程式の数値的な解き方には様々なものがありますが、ここでは式 5.16 に現れる行列が疎である⁶性質を利用して効率的に解く方法 (反復法) を 2 つ紹介します。

⁶0 が多いという意味です

ヤコビ法

式 5.16 の行列は常に対角成分 b_i が 0 でないとしましょう。すると、 a_i を含む項と c_i を含む項を右辺に移項して、

$$\begin{pmatrix} b_1 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & b_2 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & b_3 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \dots & 0 & 0 & b_{N-2} & 0 \\ \dots & 0 & 0 & 0 & b_{N-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \\ \vdots \\ Y_{N-2} \\ Y_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h^2 R(x_1) - a_1 y_0 - c_1 Y_2 \\ h^2 R(x_2) - a_2 Y_1 - c_2 Y_3 \\ h^2 R(x_3) - a_3 Y_2 - c_3 Y_4 \\ \vdots \\ h^2 R(x_{N-2}) - a_{N-2} Y_{N-3} - c_{N-2} Y_{N-1} \\ h^2 R(x_{N-1}) - a_{N-1} Y_{N-2} - c_{N-1} y_N \end{pmatrix}$$

と書き直すことができます。この中から 1 つ式を取り出すと、

$$b_n Y_n = h^2 R(x_n) - a_n Y_{n-1} - c_n Y_{n+1}$$

という式になります。これを、

$$b_i Y_i^{(j+1)} = h^2 R(x_i) - a_i Y_{i-1}^{(j)} - c_i Y_{i+1}^{(j)}$$

と読みかえるとどうでしょう。右辺は j 回目に計算した Y の値、左辺は $j+1$ 回目に計算した Y の値になります。初期値 $Y_1^{(0)}$ から $Y_{N-1}^{(0)}$ を適当に (全部 0 で OK です) 設定してこの式を使って反復的に計算し、十分小さい正の ϵ をによって $|Y_i^{(j)} - Y_i^{(j+1)}| < \epsilon$ となったら計算を打ち切りましょう。

このようにして連立一次方程式を数値的に解くことができます。擬似コードを示します。

アルゴリズム 5.7 有限差分法 (ヤコビ法を使用)

Input: $x_0, Y_0, Y_N, h, N, \epsilon$

Output: Y

for $i = 1$ **to** $N - 1$ **do**

$x_i \leftarrow x_{i-1} + h$

$a_i \leftarrow 1 + \frac{1}{2}hP(x_i)$

$b_i \leftarrow -(2 + h^2Q(x_i))$

$c_i \leftarrow 1 - \frac{1}{2}hP(x_i)$

end for

while at least one $|Y_{i+1}'' - Y_{i+1}| \geq \epsilon$ **do**

for $i = 1$ **to** $N - 1$ **do**

$Y_i' \leftarrow Y_i$

$Y_i \leftarrow \frac{1}{b_i}(h^2 R(x_i) - a_i Y_{i-1}'' - c_i Y_{i+1}'')$

end for

for $i = 1$ **to** $N - 1$ **do**

$Y_i'' \leftarrow Y_i'$

end for

end while

return Y

もう少し一般的に書きましょう。式 5.16 を、行列 A 、ベクトル \mathbf{Y} および \mathbf{b} を用いて書き直すと、

$$A\mathbf{Y} = \mathbf{b} \quad (5.17)$$

となります。ここで、 A を一般的に

$$A = \begin{pmatrix} a_{1\ 1} & a_{1\ 2} & \cdots & a_{1\ N} \\ a_{2\ 1} & a_{2\ 2} & \cdots & a_{2\ N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N\ 1} & a_{N\ 2} & \cdots & a_{N\ N} \end{pmatrix}$$

と置いて、 $A = D + M$ として A を以下の 2 つの行列に分けましょう。

$$D = \begin{pmatrix} a_{1\ 1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{2\ 2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{N\ N} \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} 0 & a_{1\ 2} & \cdots & a_{1\ N} \\ a_{2\ 1} & 0 & \cdots & a_{2\ N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N\ 1} & a_{N\ 2} & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

すると、

$$\begin{aligned} (D + M)\mathbf{Y} &= \mathbf{b} \\ D\mathbf{Y} &= -M\mathbf{Y} + \mathbf{b} \\ \mathbf{Y} &= -D^{-1}M\mathbf{Y} + D^{-1}\mathbf{b} \end{aligned}$$

ここで、左辺を $i + 1$ 回目の計算、右辺を i 回目の計算とすると、

$$\mathbf{Y}^{(i+1)} = -D^{-1}M\mathbf{Y}^{(i)} + D^{-1}\mathbf{b}$$

となり、 i 回目の計算で使った \mathbf{Y} を再利用して $i + 1$ 回目の計算を行えます。この計算手法の良いところは、単純に A の逆行列を求めるのは大変ですが、対角行列 D の逆行列は形式的にすぐに求まることにあります。

ガウス・ザイデル法

ヤコビ法の収束を早めた方法として、ガウス・ザイデル法があります。ヤコビ法では $Y_i^{(j+1)}$ の値を求めるのに $Y_{i+1}^{(j)}$ と $Y_{i-1}^{(j)}$ の値を使っていましたが、ここで少し考えてみましょう。アルゴリズム 5.7 を見ると、 $Y_i^{(j+1)}$ を求める時点で $Y_{i-1}^{(j+1)}$ が求まっています。 $Y_{i-1}^{(j)}$ よりも $Y_{i-1}^{(j+1)}$ を使った方が収束が早くなります。このように、 $j + 1$ 回目の計算をするときになるべく $j + 1$ 回目に行った計算結果を使う手法をガウス・ザイデル法と言います。これを擬似コードにするとヤコビ法より簡潔になります (アルゴリズム 5.7)。

ガウス・ザイデル法も行列演算を使って表しましょう。行列 A を $A = D + L + U$ として分解します。ここで D はヤコビ法のものと同じで、 L と U はそれぞれ下三角行列と上三角行列で、

アルゴリズム 5.7 有限差分法 (ガウス・ザイデル法を使用)

Input: $x_0, Y_0, Y_N, h, N, \epsilon$ **Output:** \mathbf{Y}

```

for  $i = 1$  to  $N - 1$  do
   $\mathbf{x}_i \leftarrow \mathbf{x}_{i-1} + h$ 
   $\mathbf{a}_i \leftarrow 1 + \frac{1}{2}hP(\mathbf{x}_i)$ 
   $\mathbf{b}_i \leftarrow -(2 + h^2Q(\mathbf{x}_i))$ 
   $\mathbf{c}_i \leftarrow 1 - \frac{1}{2}hP(\mathbf{x}_i)$ 
end for
while at least one  $|Y'_{i+1} - Y_{i+1}| \geq \epsilon$  do
  for  $i = 1$  to  $N - 1$  do
     $Y'_i \leftarrow Y_i$ 
     $Y_i \leftarrow \frac{1}{b_i}(h^2R(\mathbf{x}_i) - \mathbf{a}_iY''_{i-1} - \mathbf{c}_iY''_{i+1})$ 
  end for
end while
return  $\mathbf{Y}$ 

```

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{2\ 1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N\ 1} & a_{N\ 2} & \cdots & 0 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 0 & a_{1\ 2} & \cdots & a_{1\ N} \\ 0 & 0 & \cdots & a_{2\ N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

です。これらを使って元の連立方程式 5.17 を書き直すと、

$$\begin{aligned}
(D + L + U)\mathbf{Y} &= \mathbf{b} \\
D\mathbf{Y} &= -L\mathbf{Y} - U\mathbf{Y} + \mathbf{b} \\
\mathbf{Y} &= -D^{-1}L\mathbf{Y} - D^{-1}U\mathbf{Y} + D^{-1}\mathbf{b}
\end{aligned}$$

となります。ここで、計算回数を明記すると

$$\mathbf{Y}^{(i+1)} = -D^{-1}L\mathbf{Y}^{(i+1)} - D^{-1}U\mathbf{Y}^{(i)} + D^{-1}\mathbf{b}$$

です。右辺第一項は、下三角行列に \mathbf{Y} が掛かっているので、 \mathbf{Y} の $i+1$ 回目の計算が完了している部分です。よって、ここにかかる \mathbf{Y} は $i+1$ 回目の計算結果を使用します。

第6章 数値的に偏微分方程式を解く

第4章でも少しお話ししましたが、偏微分方程式は複雑です。数値的に解くとしても統一的な方法はありません。ですので、ここでは基本的な偏微分方程式の形に絞ってその解き方を紹介します。

ここでは基本的な偏微分方程式として、関数 $u(x, y)$ について、

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D \frac{\partial u}{\partial x} + E \frac{\partial u}{\partial y} + Fu = f(x, y) \quad (6.1)$$

を考えます。ここで、 A, B, C, D, E, F は定数、 $f(x, y)$ は既知の関数だとします。

なお、具体的な問題とコードは第10章で紹介します。

6.1 差分近似

常微分方程式の場合と同様に、2変数関数 u の差分近似を考えます。まずは $u(x+h, y)$ と $u(x-h, y)$ についてテイラー展開します。

$$u(x+h, y) = u(x, y) + h \frac{\partial}{\partial x} u(x, y) + \frac{h^2}{2!} \frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x, y) + \frac{h^3}{3!} \frac{\partial^3}{\partial x^3} u(x, y) + \cdots \quad (6.2)$$

$$u(x-h, y) = u(x, y) - h \frac{\partial}{\partial x} u(x, y) + \frac{h^2}{2!} \frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x, y) - \frac{h^3}{3!} \frac{\partial^3}{\partial x^3} u(x, y) + \cdots \quad (6.3)$$

準備は完了です。まずは $\partial u(x, y)/\partial x$ の前進差分近似を求めます。5.1節の式を書き直すと、

$$\frac{\partial}{\partial x} u(x, y) = \frac{u(x+h, y) - u(x, y)}{h} + O(h)$$

となります。これは式6.2を移項した形をしています。同様にして y に関する微分は、

$$\frac{\partial}{\partial y} u(x, y) = \frac{u(x, y+k) - u(x, y)}{k} + O(k)$$

です。

また、式6.2と式6.3を辺々足すと、

$$\begin{aligned} u(x+h, y) + u(x-h, y) &= 2u(x, y) + 2 \frac{h^2}{2!} \frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x, y) + 2 \frac{h^4}{4!} \frac{\partial^4}{\partial x^4} u(x, y) + \cdots \\ \frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x, y) &= \frac{u(x+h, y) - 2u(x, y) + u(x-h, y)}{h^2} + O(h^2) \end{aligned}$$

二階微分の局所誤差は $O(h^2)$ です。 y についての微分も同様に、

$$\frac{\partial^2}{\partial y^2} u(x, y) = \frac{u(x, y+k) - 2u(x, y) + u(x, y-k)}{k^2} + O(k^2)$$

最後に $u(x+h, y+k)$ をテイラー展開して $\partial^2 u / (\partial x \partial y)$ を求めましょう。

$$\begin{aligned} u(x+h, y+k) &= u(x, y) + h \frac{\partial}{\partial x} u(x, y) + k \frac{\partial}{\partial y} u(x, y) \\ &\quad + \frac{h^2}{2!} \frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x, y) + \frac{hk}{2!} 2 \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} u(x, y) + \frac{k^2}{2!} \frac{\partial^2}{\partial y^2} u(x, y) + \cdots \end{aligned}$$

$u(x+h, y+k)$ から $u(x+h, y)$, $u(x, y+k)$ をそれぞれ引いて、

$$\begin{aligned} u(x+h, y+k) - u(x+h, y) - u(x, y+k) &= -u(x, y) + hk \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} u(x, y) + O(hk(h+k)) \\ \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} u(x, y) &= \frac{u(x+h, y+h) - u(x+h, y) - u(x, y+h) + u(x, y)}{hk} + O(hk(h+k)) \end{aligned}$$

とすることで目的の偏導関数が求まりました。局所誤差は $O(hk(h+k))$ です。

6.2 陽的有限差分法

実際に式 6.1 に 6.1 節での偏導関数を代入し、 $u(x, y) = U_{i,j}$, $u(x+h, y) = U_{i+1,j}$, $u(x, y+k) = U_{i,j+1}$, $u(x+h, y+k) = U_{i+1,j+1}$ と置き、係数を適宜置いて、

$$\begin{aligned} 2BhkU_{i+1,j+1} + (Ak^2 - 2Bhk + Dhk^2)U_{i+1,j} + (Ch^2 - 2Bhk + Eh^2k)U_{i,j+1} \\ + (-2Ak^2 + 2Bhk - 2Ch^2 - Dhk^2 - Eh^2k + h^2k^2F)U_{i,j} \\ + Ak^2U_{i-1,j} + Ch^2U_{i,j-1} = h^2k^2f(x_i, y_j) \\ \alpha U_{i+1,j+1} + \beta U_{i+1,j} + \gamma U_{i,j+1} + \delta U_{i,j} + \epsilon U_{i-1,j} + \zeta U_{i,j-1} = \eta f(x_i, y_j) \end{aligned} \quad (6.4)$$

としておきましょう。これを行列を使った式として書いてみます。空白は 0 です。

陽的有限差分法の場合、 $\alpha = 0$ である必要があります(そうでない場合は6.3節でお話しします)。これは一見、巨大な連立一次方程式です。しかし、式6.4を見ると未知の量が $U_{i+1,j}$ 、 X を任意として既知の量が $U_{i,X}$ です。未知の量が一つしかないため、連立一次方程式ではなく個々の一次方程式を i が小さいものから順番に解くだけで済みます。

では実際に後の議論のため、拡散方程式

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

を陽的有限差分法で解いてみましょう。問題にする領域は $0 < x < 1$ かつ $0 < t$ とします。初期条件

$$t = 0 \text{ で } u = \phi(x)$$

および、境界条件

$$x = 0, 1 \text{ で } u = 0$$

が与えられているとします。

式6.1において、拡散方程式は $C = 1, D = -1$ (t には x, h 、 x には y, k を対応させます)とし、残りを0とした方程式と見ることができます。よって、これは式6.4において、 $\beta = -hk^2, \gamma = h^2, \delta = -2h^2 + hk^2, \zeta = h^2$ とし、残りを0とした方程式です。式6.4を書き直すと、

$$-hk^2 U_{i+1,j} + h^2 U_{i,j+1} + (-2h^2 + hk^2) U_{i,j} + h^2 U_{i,j-1} = 0$$

となります。これを整理して、

$$\begin{aligned} U_{i+1,j} - U_{i,j} &= \frac{h}{k^2} (U_{i,j+1} - 2U_{i,j} + U_{i,j-1}) \\ U_{i+1,j} &= \frac{h}{k^2} U_{i,j+1} + \left(1 - 2\frac{h}{k^2}\right) U_{i,j} + \frac{h}{k^2} U_{i,j-1} \end{aligned} \quad (6.6)$$

として、未知の $U_{i+1,j}$ を既知の $U_{i,X}$ (X は任意)のみで表せました。初期条件 $U_{0,X}$ 、および境界条件 $U_{X,0}, U_{X,N}$ ($kN = 1$)は既知なので、これで初期条件と境界条件を使ってこの偏微分方程式が数値的に解けます。

陽的有限差分法は h と k の条件によってはどれだけ h や k を小さくしても、解が厳密解から大きく外れることがあります。実際に拡散方程式について、「解の安定性」を議論しましょう。

6.2.1 フォン・ノイマンの安定性解析

陽的有限差分法で解いた拡散方程式の解の安定性を確かめましょう。ここでは、「フォン・ノイマンの安定性解析」を用います。まず関数 $U(t_i, x)$ が x の区間 $(0, 1)$ でフーリエ級数展開可能だとしましょう¹。

¹偏微分方程式を扱うときは大抵フーリエ級数展開可能ですが、もし不可能な場合には式6.5の固有値の収束性を議論します。

関数 $U_{i,j}$ を、 i を虚数単位、 $C_{l,i}$ を未知定数として、

$$U_{i,j} = \sum_{l=-\infty}^{\infty} C_{l,i} e^{i2\pi l x_j}$$

と書くことにします。これを 6.6 に代入し、 $0 < x_j < 1$ なので $x_j = jk$ と置きます。すると \sum を外すことができ、それぞれの l について、

$$\begin{aligned} C_{l,i+1} e^{i2\pi l jk} &= \frac{h}{k^2} C_{l,i} e^{i2\pi l (j+1)k} + \left(1 - 2\frac{h}{k^2}\right) C_{l,i} e^{i2\pi l jk} + \frac{h}{k^2} C_{l,i} e^{i2\pi l (j-1)k} \\ C_{l,i+1} &= \left(\frac{h}{k^2} e^{i2\pi l k} + 1 - 2\frac{h}{k^2} + \frac{h}{k^2} e^{-i2\pi l k}\right) C_{l,i} \end{aligned}$$

オイラーの公式 $e^{i\theta} = i \sin \theta + \cos \theta$ を使うと、

$$\begin{aligned} C_{l,i+1} &= \left(1 - 2\frac{h}{k^2} + 2\frac{h}{k^2} \cos(2\pi l k)\right) C_{l,i} \\ C_{l,i+1} &= \left(1 - 4\frac{h}{k^2} \sin^2(\pi l k)\right) C_{l,i} \end{aligned} \quad (6.7)$$

となり、すっきりしました。

ここで、今後の理解に必要な「ラックスの同等定理」を紹介します。ラックスの同等定理は、偏微分方程式の解の収束性を議論するときに使われます。まさに今必要な定理ですね。式 6.7 を一般化した

$$C_{l,i+1} = g C_{l,i} \quad (6.8)$$

という式において、どんな $C_{l,i}$ の i 乗についても

$$|C_{l,i}^i| < B$$

を満たす正の定数 B が必ず存在するなら、微分方程式を数値的に解いた解は $(h, k) \rightarrow (0, 0)$ で厳密解に収束します。このことを「解が安定する」と言います。

式 6.8 は等比数列を表す漸化式と見ることができます。よって、解が安定する条件は、

$$-1 \leq g \leq 1$$

です。

さて、元の議論に戻しましょう。ラックスの同等定理から、式 6.7 において、

$$-1 \leq 1 - 4\frac{h}{k^2} \sin^2(\pi l k) \leq 1$$

なら解が安定します。これを変形して、

$$0 \leq \frac{h}{k^2} \sin^2(\pi l k) \leq \frac{1}{2}$$

を得ます。任意の θ において $0 \leq \sin^2 \theta \leq 1$ で、 $0 < h, k$ なので、結局 h と k が満たすべき条件は、

$$\frac{h}{k^2} \leq \frac{1}{2}$$

が、解が安定する条件です。

実際に $h = 0.004, k = 0.1$ のとき ($h/k^2 = 0.4$) で計算した結果を図 6.1 に、 $h = 0.0052, k = 0.1$ のとき ($h/k^2 = 0.52$) で計算した結果を図 6.2 に示します。




図 6.1: 安定している解




図 6.2: 安定していない解

6.3 陰的有限差分法

陽的有限差分法では解が安定するために h と k に条件がありました。それに対し陰的有限差分法では条件が緩くなったり、完全になくなってしまったりします。

6.2 節で「陽的有限差分法で解くには式 6.4 の α が 0 である必要がある」と書きました。 $\alpha \neq 0$ のときは $U_{i+1, j+1}$ と $U_{i+1, j}$ の 2 つの数未知として 1 つの式に出てしまうからです。 $\alpha \neq 0$ の場合は連立一次方程式 6.5 を解くことになります。この行列は疎なので、5.7 節で紹介したガウス・ザイデル法などを使って解くことができます。

また、式 6.4 で $\alpha = 0$ である場合にも、差分近似を別のものにしたり、適当に i と j をずらしたりすることで陰解法に帰着できる場合があります。実際に拡散方程式を解いて確認してみましょう。

陰的有限差分法で拡散方程式を解くには $\partial u(x, y)/\partial x$ および $\partial u(x, y)/\partial y$ を後退差分近似に置き換えます。

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} u(x, y) &= \frac{u(x, y) - u(x - h, y)}{h} + O(h) \\ \frac{\partial}{\partial y} u(x, y) &= \frac{u(x, y) - u(x, y - k)}{h} + O(k) \end{aligned}$$

これと 6.1 節で紹介した差分近似を代入して、拡散方程式は

$$\frac{u(t, x) - u(t - h, x)}{h} = \frac{u(t, x + k) - 2u(t, x) + u(t, x - k))}{k^2}$$

$$\frac{U_{i+1, j} - U_{i, j}}{h} = \frac{U_{i, j+1} - 2U_{i, j} + U_{i, j-1}}{k^2}$$

となります。ここで、 $i = i + 1$ と置換しましょう。

$$\frac{U_{i+1, j} - U_{i, j}}{h} = \frac{U_{i+1, j+1} - 2U_{i+1, j} + U_{i+1, j-1}}{k^2}$$

$$-\frac{h}{k^2}U_{i+1, j+1} + \left(1 + 2\frac{h}{k^2}\right)U_{i+1, j} - \frac{h}{k^2}U_{i+1, j-1} = U_{i, j} \quad (6.9)$$

X を任意として、左辺にある $U_{i+1, X}$ が未知、右辺の $U_{i, j}$ が未知であるとする、これは連立一次方程式を解く必要がありそうです。解を求めるのに連立一次方程式を解く必要がある有限差分法を「陰的有限差分法」と言います。実際にこれを、陽的有限差分法で安定しなかったパラメータ $h = 0.0052, k = 0.1 (h/k^2 = 0.52)$ で解いた結果は図6.3です。また、 $h = k = 0.1 (h/k^2 = 10)$ でも実験し、図6.4に掲載しました。




図 6.3: $h = 0.0052, k = 0.1$




図 6.4: $h = k = 0.1$

6.3.1 フォン・ノイマンの安定性解析

では安定性解析を行いましょう。結論から言えば、拡散方程式の場合はどんな h と k の組み合わせでも解が安定します。

6.2.1節で陽的有限差分法に対して行ったように、解をフーリエ級数展開し、式6.9に代入し、6.2.1節と同様に整理します。

$$-\frac{h}{k^2}C_{l, i+1} \cos(2\pi lk) + \left(1 + 2\frac{h}{k^2}\right)C_{l, i+1} - \frac{h}{k^2}C_{l, i+1} \cos(2\pi lk) = C_{l, i}$$

$$\left(1 + 2\frac{h}{k^2}(1 - \cos(2\pi lk))\right)C_{l, i+1} = C_{l, i}$$

半角の公式を使い、 $C_{l, i+1}$ について整理すると、

$$C_{l\ i+1} = \frac{1}{1 + 4\frac{h}{k^2} \sin^2(\pi lk)} C_{l\ i}$$

となります。ラックスの同等定理から、

$$-1 \leq \frac{1}{1 + 4\frac{h}{k^2} \sin^2(\pi lk)} \leq 1$$

ですが、 $0 \leq \sin^2(\pi lk)$ なので、この式はどんな h と k の組み合わせに対しても成立します。このことを「無条件安定」と言います。

6.4 連立偏微分方程式

連立偏微分方程式も同じように差分方程式を作って解くことができます。例として反応拡散方程式

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= D_u \nabla^2 u - uv^2 + F(1 - u) \\ \frac{\partial v}{\partial t} &= D_v \nabla^2 v + uv^2 - (F + K)v \end{aligned}$$

を考えてみましょう。 u は x, y と時刻 t を変数に持つ関数で、 D_u, D_v, F, K は正の定数とします。 ∇^2 を展開すると、微分方程式は

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D_u \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) - uv^2 + F(1 - u) \quad (6.10)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = D_v \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) + uv^2 - (F + K)v \quad (6.11)$$

と書けます。

では差分方程式を作ってみましょう。式6.10も式6.11も左辺は u や v を t で微分したもの、右辺は u や v を x や y で微分したものになっているので、右辺を差分近似で置き換え、例えば u についてそれを $\Delta u(t, x, y)$ として、

$$u(t + \Delta t, x, y) = u(t, x, y) + \Delta t \Delta u(t, x, y)$$

とすれば良いです。 $\Delta u(t, x, y)$ を求める前に、準備として $\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ を求めておきましょう。簡単のため $\Delta x = \Delta y = l$ としておきます。

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{u(t, x + l, y) - 2u(t, x, y) + u(t, x - l, y)}{l^2} \\ &\quad + \frac{u(t, x, y + l) - 2u(t, x, y) + u(t, x, y - l)}{l^2} \\ &= \frac{u(t, x + l, y) + u(t, x - l, y) + u(t, x, y + l) + u(t, x, y - l) - 4u(t, x, y)}{l^2} \end{aligned}$$

$u(t_i, x_j, y_k)$ を $U_{i\ j\ k}$ と書けば、

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{U_{i\ j+1\ k} + U_{i\ j-1\ k} + U_{i\ j\ k+1} + U_{i\ j\ k-1} - 4U_{i\ j\ k}}{l^2}$$

と書けます。これを使うと、式 6.10 は、

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D_u \frac{U_{i\ j+1\ k} + U_{i\ j-1\ k} + U_{i\ j\ k+1} + U_{i\ j\ k-1} - 4U_{i\ j\ k}}{l^2} - U_{i\ j\ k} V_{i\ j\ k}^2 + F(1 - U_{i\ j\ k})$$

また、式 6.11 は、

$$\frac{\partial v}{\partial t} = D_v \frac{V_{i\ j+1\ k} + V_{i\ j-1\ k} + V_{i\ j\ k+1} + V_{i\ j\ k-1} - 4V_{i\ j\ k}}{l^2} + U_{i\ j\ k} V_{i\ j\ k}^2 - (F + K)V_{i\ j\ k}$$

です。

これを使って実際にコードを書き、実行すると以下のような画像が得られます。




図 6.5: 反応拡散方程式

定数を様々に変化させることで、色々な模様ができあがります。

第7章 解析的に常微分方程式を解く (例題)

本章からはこれまで解説してきた微分方程式の解法を、実際に例題を解いて確認していきます。なるべく「これが公式だ」などということは書かないようにしていますが、第3章を読まずにこの章を読む方には少しわかりにくいところがあると思います。適宜第3章の該当節も参照してください。なお、第3章で具体的な例 (関数 $f(x)$) などを使わず、定数を a, b, c などと置いただけの例) を解説した解法についてはここでは割愛します。

7.1 微分の逆操作

こちらの微分方程式を解くとして。

$$\frac{dy}{dx} = ax + b$$

両辺を x で積分して、

$$\begin{aligned} y &= \int (ax + b) dx \\ &= \frac{1}{2}ax^2 + bx + C \end{aligned}$$

とすることでこの微分方程式が解けました。

7.2 変数分離形

こちらの微分方程式を解いてみましょう。 a は正の定数です。

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -a + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$$

これはもはや線形の微分方程式ですらありません。ですが変数分離形として解くことができます。まずは $dy/dx = v$ と置きます。

$$\frac{dv}{dx} = -a + v^2$$

変数を分離し、部分分数分解します。

$$\begin{aligned}\frac{1}{v^2 - a} dv &= dx \\ \frac{1}{2\sqrt{a}} \left(\frac{1}{v - \sqrt{a}} - \frac{1}{v + \sqrt{a}} \right) dv &= dx\end{aligned}$$

では積分しましょう。

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\sqrt{a}} \int \left(\frac{1}{v - \sqrt{a}} - \frac{1}{v + \sqrt{a}} \right) dv &= \int dx \\ \frac{1}{2\sqrt{a}} (\ln(v - \sqrt{a}) - \ln(v + \sqrt{a})) &= x + C \\ \frac{1}{2\sqrt{a}} \ln \left(\frac{v - \sqrt{a}}{v + \sqrt{a}} \right) &= x + C \\ \frac{v - \sqrt{a}}{v + \sqrt{a}} &= e^{2\sqrt{a}(x+C)}\end{aligned}$$

v について整理しましょう。

$$\begin{aligned}v - \sqrt{a} &= (v + \sqrt{a})e^{2\sqrt{a}(x+C)} \\ (1 - e^{2\sqrt{a}(x+C)})v &= (1 + e^{2\sqrt{a}(x+C)})\sqrt{a} \\ v &= \frac{1 + e^{2\sqrt{a}(x+C)}}{1 - e^{2\sqrt{a}(x+C)}}\sqrt{a} \\ &= \frac{e^{-\sqrt{a}(x+C)} + e^{\sqrt{a}(x+C)}}{e^{-\sqrt{a}(x+C)} - e^{\sqrt{a}(x+C)}}\sqrt{a}\end{aligned}$$

ここで、双曲線関数

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$$

を導入しましょう。すると、

$$\begin{aligned}v &= -\sqrt{a} \tanh(\sqrt{a}(x+C)) \\ &= -\sqrt{a} \tanh(\sqrt{a}x + \theta_0)\end{aligned}$$

となります。任意定数を θ_0 に置き直しました。

では両辺を x で積分し、 y を求めましょう。

$$\begin{aligned}y &= -\sqrt{a} \int \tanh(\sqrt{a}x + \theta_0) dx \\ &= -\sqrt{a} \int \frac{\sinh(\sqrt{a}x + \theta_0)}{\cosh(\sqrt{a}x + \theta_0)} dx \\ &= -\sqrt{a} \int \frac{1}{\cosh(\sqrt{a}x + \theta_0)} \left(\frac{d}{dx} - \cosh(\sqrt{a}x + \theta_0) \right) dx \\ &= -\sqrt{a} \ln(\cosh(\sqrt{a}x + \theta_0)) + C'\end{aligned}$$

これでこの微分方程式が解けました。

7.3 同次形

ここではこちらの微分方程式を考えてみましょう。 a を定数とします。

$$\frac{dy}{dx} = 1 + a \frac{y}{x}$$

$u = y/x$ と置いて微分方程式を書き直すと、

$$\begin{aligned} \frac{du}{dx}x + u &= 1 + au \\ \frac{1}{1 + (a-1)u} du &= \frac{1}{x} dx \end{aligned}$$

両辺積分しましょう。

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1 + (a-1)u} du &= \int \frac{1}{x} dx \\ \frac{1}{a-1} \ln(1 + (a-1)u) &= \ln x + C \end{aligned}$$

\ln を外すと、

$$\begin{aligned} \ln(1 + (a-1)u) &= \ln Ax^{a-1} \\ 1 + (a-1)u &= Ax^{a-1} \end{aligned}$$

$u = y/x$ より、 u を消去して、

$$\begin{aligned} 1 + (a-1)\frac{y}{x} &= Ax^{a-1} \\ y &= \frac{x}{a-1}(Ax^{a-1} - 1) \end{aligned}$$

これでこの微分方程式が解けました。

7.4 一階線形微分方程式

まず斉次の場合です。こちらの微分方程式を考えましょう。

$$\frac{dy}{dx} - xy = 0$$

この微分方程式は変数分離形です。

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= xy \\ \int \frac{1}{y} dy &= \int x dx \\ \ln y &= \frac{1}{2}x^2 \end{aligned}$$

より、

$$y = Ae^{\frac{1}{2}x^2}$$

です。

7.4.1 特殊解を見つける

では非斉次の場合を考えてみましょう。 a を定数とします。

$$\frac{dy}{dx} - xy = ax$$

これを満たす特殊解を探します。 y を定数関数と仮定してしまえば、

$$y_1 = -a$$

が特殊解とわかります。斉次式の解は求めてあるので、この微分方程式の解は

$$y = Ae^{\frac{1}{2}x^2} - a$$

です。このように特殊解がエスパーで求まってしまうと楽に微分方程式が解けます。

7.4.2 定数変化法

では特殊解がすぐには求まらない場合を考えましょう。

$$\frac{dy}{dx} - y = ax^2$$

左辺第二項から x が消え、左辺の x の次数が増えています。まずは斉次式を解きましょう。変数分離形です。

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= y \\ \int \frac{1}{y} dy &= \int dx \\ \ln y &= x + C \\ y &= Ae^x\end{aligned}$$

斉次式が変数分離形として解けました。実は頑張ればエスパーで特殊解が求まっていますが、ここでは定数変化法を使います。特殊解を

$$y_1 = C(x)e^x$$

と置きます。これを式に代入してみましょう。

$$\begin{aligned}\left(\frac{d}{dx}C(x)\right)e^x + C(x)e^x - C(x)e^x &= ax^2 \\ \left(\frac{d}{dx}C(x)\right)e^x &= ax^2 \\ \frac{d}{dx}C(x) &= ax^2e^{-x}\end{aligned}$$

両辺を x で積分しましょう。部分積分を使います。

$$\begin{aligned}C(x) &= a \int x^2 \left(-\frac{d}{dx}e^{-x}\right) dx \\ &= a \left(-x^2e^{-x} + 2 \int xe^{-x} dx\right) \\ &= a \left(-x^2e^{-x} + 2 \int x \left(-\frac{d}{dx}e^{-x}\right) dx\right) \\ &= a \left(-x^2e^{-x} - 2xe^{-x} + 2 \int e^{-x} dx\right) \\ &= -a(x^2 + 2x + 2)e^{-x}\end{aligned}$$

よって、特殊解は

$$y_1 = -a(x^2 + 2x + 2)$$

とわかりました。斉次式の解と合わせて、一般解は

$$y = Ae^x - a(x^2 + 2x + 2)$$

です。

7.4.3 積分因子

こちらの微分方程式を解いてみましょう。

$$\frac{dy}{dx} + y = \sin x$$

これに両辺

$$e^{\int dx} = e^x$$

を掛けます。すると、

$$\begin{aligned}
e^x \frac{dy}{dx} + e^x y &= e^x \sin x \\
\frac{d}{dx}(e^x y) &= e^x \sin x
\end{aligned} \tag{7.1}$$

両辺 x で積分しますが、まずは右辺を積分しましょう。部分積分を2回行います。

$$\begin{aligned}
\int e^x \sin x dx &= \int \left(\frac{d}{dx} e^x \right) \sin x dx \\
&= e^x \sin x - \int e^x \cos x dx \\
&= e^x \sin x - \int \left(\frac{d}{dx} e^x \right) \cos x dx \\
&= e^x \sin x - e^x \cos x - \int e^x \sin x dx
\end{aligned}$$

右辺第三項を移項して、

$$\int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C$$

となります。式7.1より、

$$\begin{aligned}
e^x y &= \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C \\
y &= \frac{1}{2} (\sin x - \cos x) + C e^{-x}
\end{aligned}$$

と、答えが求まりました。

7.5 完全形

こんな微分方程式を考えてみましょう。 a, b を定数とします。

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y^2}{ax^2 + xy}$$

これは完全形ではありません。積分因子を掛けて完全形に帰着しましょう。積分因子は $x^m y^n$ として探します。

$$\frac{\partial}{\partial y}(x^m y^{n+2}) = \frac{\partial}{\partial x}(ax^{m+2}y^n + x^{m+1}y^{n+1})$$

を満たす m, n を探します。実際に微分してみましょう。

$$(n+2)x^m y^{n+1} = a(m+2)x^{m+1}y^n + (m+1)x^m y^{n+1}$$

これが x と y のそれぞれについて恒等式になれば良いです。 x, y の次数が違うため、右辺第一項が 0 になる必要があります。よって $m = -2$ です。また、左辺と右辺第二項の係数を比べて、

$$n + 2 = m + 1 = -1$$

よって $n = -3$ です。これで積分因子が求まりました。実際に積分因子 $x^{-2}y^{-3}$ を分子分母に掛けてみましょう。

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x^{-2}y^{-1}}{ay^{-3} + x^{-1}y^{-2}} \quad (7.2)$$

これについて、

$$\frac{\partial}{\partial y}(x^{-2}y^{-1}) = \frac{\partial}{\partial x}(ay^{-3} + x^{-1}y^{-2})$$

が成立しています。以下を満たす関数 $u(x, y)$ を導入しましょう。

$$\frac{\partial u}{\partial x} = x^{-2}y^{-1} \quad (7.3)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = ay^{-3} + x^{-1}y^{-2} \quad (7.4)$$

式 7.3 を積分して、

$$\begin{aligned} u &= \int (x^{-2}y^{-1})dx + h(y) \\ &= -x^{-1}y^{-1} + h(y) \end{aligned}$$

ここから $h(y)$ を求めます。式 7.4 にここで求めた u を代入しましょう。

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y}(-x^{-1}y^{-1} + h(y)) &= ay^{-3} + x^{-1}y^{-2} \\ x^{-1}y^{-2} + \frac{d}{dy}h(y) &= ay^{-3} + x^{-1}y^{-2} \\ \frac{d}{dy}h(y) &= ay^{-3} \end{aligned}$$

両辺積分して $h(y)$ を求めましょう。

$$\begin{aligned} h(y) &= \int ay^{-3}dy \\ &= -\frac{a}{2}y^{-2} \end{aligned}$$

これで u が求まりました。

$$u = -x^{-1}y^{-1} - \frac{a}{2}y^{-2}$$

この u の全微分 du が 0 なので、解は C を定数として $u = C$ 、つまり、

$$\begin{aligned} -x^{-1}y^{-1} - \frac{a}{2}y^{-2} &= C \\ -\frac{1}{xy} - \frac{a}{2y^2} &= C \end{aligned}$$

です。

7.6 ベルヌーイの微分方程式

ベルヌーイの微分方程式の例として

$$\frac{dy}{dx} + y = x^2y^2$$

を考えてみましょう。 $z = y^{1-2} = y^{-1}$ として、 dy/dx を求めます。

$$\frac{dz}{dx} = -y^{-2} \frac{dy}{dx}$$

より、

$$\frac{dy}{dx} = -y^2 \frac{dz}{dx}$$

これを微分方程式に代入してみましょう。

$$-y^2 \frac{dz}{dx} + y = x^2y^2$$

全体に $(1-2)y^{-2} = -y^{-2}$ を掛けます。

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dx} - \frac{1}{y} &= -x^2 \\ \frac{dz}{dx} - z &= -x^2 \end{aligned}$$

一階非斉次線形微分方程式に帰着できました。実はこの微分方程式の解は 7.4.2 節の微分方程式で $a = -1$ とした場合の解です。よって、

$$z = Ae^x + x^2 + 2x + 2$$

です。 $z = y^{-1}$ なので、結局求めたい関数 y は、

$$y = \frac{1}{Ae^x + x^2 + 2x + 2}$$

です。

7.7 リカッチの微分方程式

a を定数として

$$\frac{dy}{dx} = 2 + x - \left(2 + \frac{1}{x}\right)y + \frac{1}{x}y^2$$

を解いてみましょう。まずこの微分方程式の特殊解を探します。特殊解 y_1 を定数関数として探してみますが、どうもうまくいきません。では y_1 を x の一次関数として探してみましょう。すると、 $y_1 = x$ がこの微分方程式を満たすことに気づきます。

では $y = Y + y_1$ と置換しましょう。

$$\frac{dY}{dx} + \frac{dy_1}{dx} = 2 + x - \left(2 + \frac{1}{x}\right)Y - \left(2 + \frac{1}{x}\right)y_1 + \frac{1}{x}Y^2 + \frac{1}{x}y_1^2 + 2\frac{1}{x}Yy_1$$

ここで、 y_1 は特殊解なので

$$\frac{dy_1}{dx} = 2 + x - \left(2 + \frac{1}{x}\right)y_1 + \frac{1}{x}y_1^2$$

です。これを使うと

$$\begin{aligned}\frac{dY}{dx} &= -\left(2 + \frac{1}{x}\right)Y + \frac{1}{x}Y^2 + 2\frac{1}{x}Yy_1 \\ &= -\frac{1}{x}Y + \frac{1}{x}Y^2\end{aligned}$$

とわかりました。なお、 $y_1 = x$ を代入してあります。これはベルヌーイの微分方程式なので、 $z = Y^{-1}$ として、

$$\frac{dY}{dx} = -Y^2 \frac{dz}{dx}$$

これを微分方程式に代入します。

$$-Y^2 \frac{dz}{dx} = -\left(2 + \frac{1}{x}\right)Y + 2Y + \frac{1}{x}Y^2$$

微分方程式全体に $-Y^2$ を掛けて、

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dx} &= \left(2 + \frac{1}{x}\right)z - 2z - \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{x}z - \frac{1}{x}\end{aligned}$$

これは一階線形微分方程式です。特殊解はまず z_1 を定数関数として考えると、 $z_1 = 1$ が当てはまりそうです。 $z = Z + z_1$ として置換すると、

$$\frac{dZ}{dx} = \frac{1}{x}Z$$

となり、変数分離形として解くと、

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{Z} dZ &= \int \frac{1}{x} dx \\ \ln Z &= \ln(Cx) \\ Z &= Cx\end{aligned}$$

これでようやく解が求まります。これまで行ってきた置換を元に戻しましょう。

$$\begin{aligned}z &= Z + z_1 \\ &= Cx + 1 \\ Y &= z^{-1} \\ &= \frac{1}{Cx + 1} \\ y &= Y + y_1 \\ &= \frac{1}{Cx + 1} + x\end{aligned}$$

これでこの微分方程式が解けました。

7.8 ダランベールの微分方程式

$a \neq 1$ を整数として

$$y = ax \frac{dy}{dx} + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2$$

を解いてみましょう。 $p = dy/dx$ と置いて微分方程式を書き直すと、

$$y = axp + p^2 \tag{7.5}$$

となり、両辺を x で微分しましょう。

$$\begin{aligned}p &= ap + ax \frac{dp}{dx} + 2p \frac{dp}{dx} \\ (1-a)p &= (ax + 2p) \frac{dp}{dx} \\ \frac{dx}{dp} &= \frac{a}{(1-a)p}x + \frac{2}{1-a}\end{aligned}$$

両辺に積分因子 $e^{\int a/((1-a)p)dp} = p^{a/(1-a)}$ を掛けましょう。

$$\begin{aligned}
p^{\frac{a}{1-a}} \frac{dx}{dp} &= \frac{a}{(1-a)p} p^{\frac{a}{1-a}} x + \frac{2}{1-a} p^{\frac{a}{1-a}} \\
\frac{d}{dp} \left(p^{\frac{a}{1-a}} x \right) &= \frac{2}{1-a} p^{\frac{a}{1-a}}
\end{aligned}$$

両辺 p で積分して、

$$\begin{aligned}
p^{\frac{a}{1-a}} x &= \int \frac{2}{1-a} p^{\frac{a}{1-a}} dp \\
&= \frac{2}{1-a} (1-a) p^{\frac{a}{1-a}+1} + C \\
&= 2p^{\frac{a}{1-a}+1} + C
\end{aligned} \tag{7.6}$$

ここから p を x の関数として求めます。式 7.5 を変形すると n を任意の整数として、

$$\begin{aligned}
p^2 &= y - axp \\
p^{n+2} &= yp^n - axp^{n+1}
\end{aligned}$$

これを使って p の次数を下げます。式 7.6 は、

$$\begin{aligned}
p^{\frac{a}{1-a}} x &= 2p^{\frac{a}{1-a}+1} + C \\
&= 2yp^{\frac{a}{1-a}-1} - 2axp^{\frac{a}{1-a}} + C \\
(1+2a)xp^{\frac{a}{1-a}} &= 2yp^{\frac{a}{1-a}-1} + C
\end{aligned}$$

この式と式 7.6 を見比べると、 p の次数を 1 下げるたびに左辺に $1+2a$ が掛かるということがわかります。よって、これを繰り返し用いると

$$(1+2a)^{\frac{a}{1-a}} xp = 2y + C \tag{7.7}$$

この式を 2 乗してみましょう。

$$(1+2a)^{\frac{2a}{1-a}} x^2 p^2 = 4y^2 + C^2 + 2Cy$$

式 7.5 より、 p^2 を書き直して、

$$\begin{aligned}
(1+2a)^{\frac{2a}{1-a}} x^2 (y - axp) &= 4y^2 + C^2 + 2Cy \\
(1+2a)^{\frac{2a}{1-a}} x^2 y - (1+2a)^{\frac{2a}{1-a}} ax^3 p &= 4y^2 + C^2 + 2Cy
\end{aligned}$$

式 7.7 より、 xp を書き直して、

$$\begin{aligned}
(1+2a)^{\frac{2a}{1-a}} x^2 y - (1+2a)^{\frac{2a}{1-a}} ax^2 (2y + C)(1+2a)^{-\frac{a}{1-a}} &= 4y^2 + C^2 + 2Cy \\
(1+2a)^{\frac{2a}{1-a}} x^2 y - ax^2 (2y + C) &= 4y^2 + C^2 + 2Cy
\end{aligned}$$

これでようやくこの微分方程式が解けました。

7.8.1 クレローの微分方程式

クレローの微分方程式を解いてみましょう。

$$y = x \frac{dy}{dx} + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2$$

ダランベールの微分方程式 (7.8 節) で $a = 1$ とした場合です。 $p = dy/dx$ を導入し、

$$y = xp + p^2 \quad (7.8)$$

式全体を x で微分しましょう。

$$\begin{aligned} p &= p + x \frac{dp}{dx} + 2p \frac{dp}{dx} \\ 0 &= (x + 2p) \frac{dp}{dx} \end{aligned}$$

$dp/dx = 0$ のとき、 C を定数として $p = C$ なので、

$$y = Cx + C^2$$

で、これが一般解です。

$x + 2p = 0$ の場合は、式 7.8 と連立します。 $p = -x/2$ と変形して、

$$\begin{aligned} y &= -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x^2 \\ &= -\frac{1}{4}x^2 \end{aligned}$$

これが特異解です。

7.9 定数係数の二階非斉次線形微分方程式

こちらの微分方程式を考えましょう。

$$\frac{d^2y}{dx^2} + a \frac{dy}{dx} + by = e^{cx}$$

なお、 $a^2 - 4b > 0$ とします。

特殊解を求めるのに定数係数変化法を使うので、まずは右辺を 0 とした斉次式を解くのですが、斉次式の解 Y はすでに 3.9.1 節で解いています。 $a^2 - 4b > 0$ という条件から、解は

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

の解

$$\begin{aligned}\lambda_2 &= \frac{1}{2}(-a + \sqrt{a^2 - 4b}) \\ \lambda_3 &= \frac{1}{2}(-a - \sqrt{a^2 - 4b})\end{aligned}$$

を使って、

$$Y = c_2 e^{\lambda_2 x} + c_3 e^{\lambda_3 x}$$

です。

では定数変化法で特殊解を探しましょう。特殊解 y_1 を

$$y_1 = c_2(x) e^{\lambda_2 x} + c_3(x) e^{\lambda_3 x}$$

とし、都合よく以下の条件を満たすことにします。

$$\left(\frac{d}{dx} c_2(x)\right) e^{\lambda_2 x} + \left(\frac{d}{dx} c_3(x)\right) e^{\lambda_3 x} = 0 \quad (7.9)$$

すると、 y_1 を微分することで

$$\begin{aligned}\frac{dy_1}{dx} &= c_2(x) \lambda_2 e^{\lambda_2 x} + c_3(x) \lambda_3 e^{\lambda_3 x} \\ \frac{d^2 y_1}{dx^2} &= \left(\frac{d}{dx} c_2(x)\right) \lambda_2 e^{\lambda_2 x} + c_2(x) \lambda_2^2 e^{\lambda_2 x} + \left(\frac{d}{dx} c_3(x)\right) \lambda_3 e^{\lambda_3 x} + c_3(x) \lambda_3^2 e^{\lambda_3 x}\end{aligned}$$

が導けます。これらを元の微分方程式に代入すると、3.9.2 節と同じ計算を省略して、

$$\left(\frac{d}{dx} c_2(x)\right) \lambda_2 e^{\lambda_2 x} + \left(\frac{d}{dx} c_3(x)\right) \lambda_3 e^{\lambda_3 x} = e^{cx}$$

となります。式 7.9 の条件より、ロンスキー行列を作ると、

$$\begin{pmatrix} \frac{d}{dx} c_2(x) \\ \frac{d}{dx} c_3(x) \end{pmatrix} = \frac{1}{(\lambda_3 - \lambda_2) e^{(\lambda_2 + \lambda_3)x}} \begin{pmatrix} \lambda_3 e^{\lambda_3 x} & -e^{\lambda_3 x} \\ -\lambda_2 e^{\lambda_2 x} & e^{\lambda_2 x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ e^{cx} \end{pmatrix}$$

です。では実際に $c_2(x)$ と $c_3(x)$ を求めましょう。

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} c_2(x) &= -\frac{e^{\lambda_3 x} e^{cx}}{(\lambda_3 - \lambda_2) e^{(\lambda_2 + \lambda_3)x}} \\ &= -\frac{1}{(\lambda_3 - \lambda_2) e^{(\lambda_2 - c)x}} \\ \frac{d}{dx} c_3(x) &= \frac{e^{\lambda_2 x} e^{cx}}{(\lambda_3 - \lambda_2) e^{(\lambda_2 + \lambda_3)x}} \\ &= \frac{1}{(\lambda_3 - \lambda_2) e^{(\lambda_3 - c)x}}\end{aligned}$$

これを x で積分しましょう。

$$\begin{aligned} c_2(x) &= -\frac{1}{\lambda_3 - \lambda_2} \int \frac{1}{e^{(\lambda_2 - c)x}} dx \\ &= \frac{1}{(\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_2 - c)e^{(\lambda_2 - c)x}} \\ c_3(x) &= \frac{1}{\lambda_3 - \lambda_2} \int \frac{1}{e^{(\lambda_3 - c)x}} dx \\ &= -\frac{1}{(\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_3 - c)e^{(\lambda_3 - c)x}} \end{aligned}$$

これで y_1 が求まります。

$$\begin{aligned} y_1 &= c_2(x)e^{\lambda_2 x} + c_3(x)e^{\lambda_3 x} \\ &= \frac{1}{(\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_2 - c)e^{(\lambda_2 - c)x}} e^{\lambda_2 x} - \frac{1}{(\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_3 - c)e^{(\lambda_3 - c)x}} e^{\lambda_3 x} \\ &= \frac{e^{cx}}{(\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_2 - c)} - \frac{e^{cx}}{(\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_3 - c)} \\ &= \frac{1}{\lambda_3 - \lambda_2} \left(\frac{1}{\lambda_2 - c} - \frac{1}{\lambda_3 - c} \right) e^{cx} \end{aligned}$$

よって一般解 y は、

$$y = c_2 e^{\lambda_2 x} + c_3 e^{\lambda_3 x} + \frac{1}{\lambda_3 - \lambda_2} \left(\frac{1}{\lambda_2 - c} - \frac{1}{\lambda_3 - c} \right) e^{cx}$$

です。

7.10 連立微分方程式

ここでは連立微分方程式として

$$\begin{aligned} \frac{dy_1}{dx} &= 8y_1 + y_2 \\ \frac{dy_2}{dx} &= 4y_1 + 5y_2 \end{aligned}$$

を考えましょう。行列 A

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

の固有値 λ_1, λ_2 が

$$\lambda_1 = 4, \lambda_2 = 9$$

であり、固有ベクトル $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2$ が

$$\mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}, \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ですので、解は

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} &= c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix} e^{4x} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{9x} \\ &= \begin{pmatrix} c_1 e^{4x} + c_2 e^{9x} \\ -4c_1 e^{4x} + c_2 e^{9x} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

です。

7.11 級数展開法 (確定特異点)

こちらの微分方程式の $x = 0$ での級数解を考えてみましょう。

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{1}{x} \frac{dy}{dx} + \frac{1}{x} y = 0$$

関数 $P(x) = 1/x$ と $Q(x) = 1/x$ は $x = 0$ でなめらかではありませんが、それぞれに x 、 x^2 を掛けるとなめらかになります。

では $xP(x)$ と $x^2Q(x)$ を展開してみましょう。

$$\begin{aligned} xP(x) &= -1 \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n \quad (p_0 = -1, \text{ otherwise } q_i = 0) \\ x^2Q(x) &= x \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} q_n x^n \quad (q_1 = 1, \text{ otherwise } q_i = 0) \end{aligned}$$

また、解 y を

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+\lambda}$$

と置きます。

$p_0 = -1, q_0 = 0$ より、決定方程式は

$$\begin{aligned} \lambda(\lambda - 1) - \lambda &= 0 \\ \lambda(\lambda - 2) &= 0 \end{aligned}$$

となり、 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2$ です。 $\lambda_1 - \lambda_2 \in \mathbb{Z}$ なので、 λ_2 に対する解が求まります。

このあと元の微分方程式に級数解を代入しますが、その前に y を書き直し、 y を微分したものを求めておきましょう。

$$\begin{aligned} y &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+2} \\ \frac{dy}{dx} &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+2) x^{n+1} \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+2)(n+1) x^n \end{aligned}$$

では代入しましょう。

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+2)(n+1) x^n - \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+2) x^{n+1} + \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+2} &= 0 \\ \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+2)(n+1) x^n - \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+2) x^n + \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+1} &= 0 \\ \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+2)(n+1) x^n - \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+2) x^n + \sum_{n=1}^{\infty} c_{n-1} x^n &= 0 \end{aligned}$$

右辺が0なので、各 n における x^n の係数が0であることを考えます。まず $n = 0$ のときは、

$$2c_0 - 2c_0 = 0$$

となり、 c_0 は任意です。 $n \geq 1$ のときは、

$$\begin{aligned} c_n (n+2)(n+1) - c_n (n+2) + c_{n-1} &= 0 \\ c_n (n+2)n &= -c_{n-1} \\ c_n &= -\frac{1}{(n+2)n} c_{n-1} \end{aligned}$$

です。これを繰り返し適用すると、

$$c_n = (-1)^n \frac{2}{(n+2)!n!} c_0$$

これでこの微分方程式を満たす級数解が求まりました。

第8章 解析的に偏微分方程式を解く (例題)

本章では解析的に偏微分方程式を解くことについて、実際に例題を解いていきます。偏微分方程式は解析的に解けるものが少なく、ラインナップが少なくなっていますがご了承ください。

8.1 変数分離形

変数分離形として取り上げるのはこちらの偏微分方程式です。

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \quad (8.1)$$

これは一般的に「一次元の波動方程式」と言われるものです。これは変数分離形として解けるのですが、4.1節で少し書いたように、この偏微分方程式の場合は変数分離定数 K の値によって場合分けが必要になります。実際にやってみましょう。

$$u = P(t)Q(x)$$

と置きます。すると、

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= Q(x) \frac{d^2}{dt^2} P(t) \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= P(t) \frac{d^2}{dx^2} Q(x) \end{aligned}$$

と微分できます。これらを元の偏微分方程式 8.1 に代入してみましょう。

$$\begin{aligned} Q(x) \frac{d^2}{dt^2} P(t) &= c^2 P(t) \frac{d^2}{dx^2} Q(x) \\ \frac{1}{P(t)} \frac{d^2}{dt^2} P(t) &= \frac{c^2}{Q(x)} \frac{d^2}{dx^2} Q(x) \end{aligned}$$

変数分離定数を K とすると、

$$\frac{d^2 P}{dt^2} = KP \quad (8.2)$$

$$\frac{d^2 Q}{dx^2} = \frac{K}{c^2} Q \quad (8.3)$$

という2つの常微分方程式に帰着できました。まず式 8.2 を解き、同様に式 8.3 を解きます。3.9.1 節で解説した定数係数の二階線形微分方程式の解法に従うと、解として

$$P = e^{\lambda t}$$

を仮定します。すると、特性方程式として

$$\lambda^2 = K$$

が導けます。 K の値によって場合分けが必要そうです。

$K > 0$ の場合

この場合は

$$\lambda = \pm\sqrt{K}$$

なので、 A, B を定数として

$$P(t) = Ae^{\sqrt{K}t} + Be^{-\sqrt{K}t}$$

です。同様にすると C, D を定数として

$$Q(x) = Ce^{\frac{\sqrt{K}}{c}x} + De^{-\frac{\sqrt{K}}{c}x}$$

とわかります。

$K = 0$ の場合

この場合は

$$\lambda = 0$$

となってしまう、この方法では解けません。しかし、元の微分方程式 8.2 を見てみると、

$$\frac{d^2P}{dt^2} = 0$$

ですので、これは 3.1 節の通りに両辺を t で 2 回積分すれば解けます。一般解は

$$P(t) = At + B$$

です。同様にして

$$Q(x) = Cx + D$$

です。

$K < 0$ の場合

この場合は

$$\lambda = \pm i\sqrt{-K}$$

ですので、

$$P(t) = Ae^{i\sqrt{-K}t} + Be^{-i\sqrt{-K}t}$$

です。同様にすると

$$Q(x) = Ce^{i\frac{\sqrt{-K}}{c}x} + De^{-i\frac{\sqrt{-K}}{c}x}$$

として $Q(x)$ が求まりました。

8.2 一階線形偏微分方程式

一階線形偏微分方程式の例として

$$(-x^2 + y^2 + u^2)\frac{\partial u}{\partial x} - 2xy\frac{\partial u}{\partial y} = -2xu$$

を考えてみましょう。特性微分方程式を作ると、

$$\frac{dx}{-x^2 + y^2 + u^2} = -\frac{dy}{2xy} = -\frac{du}{2xu} \quad (8.4)$$

となります。まずこの式の

$$-\frac{dy}{2xy} = -\frac{du}{2xu}$$

を見ると、

$$\frac{du}{u} = \frac{dy}{y}$$

がわかります。これを両辺積分すると、

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{u} du &= \int \frac{1}{y} dy \\ \ln u &= \ln y + C \\ u &= Ay \end{aligned} \quad (8.5)$$

ここで a は定数です。特性曲線の1つ目の式はこれを変形して、

$$\frac{u}{y} = a \quad (8.6)$$

です。

次に

$$\frac{dx}{-x^2 + y^2 + u^2} = -\frac{dy}{2xy}$$

を使います。式 8.5 より、

$$\frac{dx}{-x^2 + (1 + a^2)y^2} = -\frac{dy}{2xy}$$

変形してみましょう。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2 - (1 + a^2)y^2}$$

これは同次形 (3.3 節) です。分子と分母を x^2 で割るとわかりやすくなります。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2\frac{y}{x}}{1 - (1 + a^2)\left(\frac{y}{x}\right)^2}$$

$z = y/x$ を導入すると、

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x} dx &= \int \frac{1}{\frac{2z}{1 - (1 + a^2)z^2} - z} dz \\ \ln x + C &= \int \frac{1 - (1 + a^2)z^2}{z + (1 + a^2)z^3} dz \\ \ln Ax &= \int \left(\frac{1 + 3(1 + a^2)z^2}{z + (1 + a^2)z^3} - \frac{4(1 + a^2)z^2}{z + (1 + a^2)z^3} \right) dz \\ &= \int \frac{1}{z + (1 + a^2)z^3} \frac{d}{dz} (z + (1 + a^2)z^3) dz \\ &\quad - 2 \int \frac{1}{1 + (1 + a^2)z^2} \frac{d}{dz} (1 + (1 + a^2)z^2) dz \\ &= \ln(z + (1 + a^2)z^3) - 2 \ln(1 + (1 + a^2)z^2) \\ &= \ln \left(\frac{z(1 + (1 + a^2)z^2)}{(1 + (1 + a^2)z^2)^2} \right) \\ &= \ln \left(\frac{z}{1 + (1 + a^2)z^2} \right) \\ Ax &= \frac{z}{1 + (1 + a^2)z^2} \end{aligned}$$

では $z = y/x$ より z を消去しましょう。

$$\begin{aligned}
 Ax &= \frac{\frac{y}{x}}{1 + (1 + a^2)\left(\frac{y}{x}\right)^2} \\
 &= \frac{xy}{x^2 + (1 + a^2)y^2} \\
 \frac{y}{x^2 + (1 + a^2)y^2} &= A
 \end{aligned} \tag{8.7}$$

これで特性曲線の2つ目の式が求まりました。式8.6と式8.7と任意の関数 $F(t_1, t_2)$ を使って、この偏微分方程式の解は

$$F\left(\frac{u}{y}, \frac{y}{x^2 + (1 + a^2)y^2}\right) = 0$$

です。

第9章 数値的に常微分方程式を解く (例題)

この章では数値的に常微分方程式を解く方法について、実際に例題を解いていきます。例題への解答はサンプルコードとして示します。なお、言語にはグラフ描画まで一気にできる魅力により Python を使用しました。

9.1 オイラー法

オイラー法で以下の微分方程式を解いてみましょう。

$$\frac{dy}{dx} = 1 + a \frac{y}{x}$$

この微分方程式は 7.3 節で解きました。解は

$$y = \frac{x}{a-1} (Ax^{a-1} - 1)$$

であることがすでにわかっています。ここでは誤差を考えたいため、すでに解けている微分方程式を数値的に解いてみます。なお、 $a = 2$ および $A = 1$ (初期条件 $y(1) = 0$) とします。また、刻み幅 h は 0.01、求める値の範囲は $1 \leq x \leq 2$ とします。

$$y = x(x - 1)$$

では実際にコードを書いてみましょう。

ソースコード 9.1: オイラー法

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 # 関数f(x,y)の定義
4 def f(x, y):
5     return 1 + 2 * y / x
6
7 # 解析解
8 def y_analytical(x):
9     return x * (x - 1)
10
11 # 初期条件
12 x0 = 1
13 Y0 = 0
14
15 # 定数
```

```

16 h = 0.01
17 N = 100 + 1
18
19 # 解となる配列
20 Y = [0 for _ in range(N)]
21 x = [i * h + x0 for i in range(N)]
22 Y[0] = Y0
23
24 # オイラー法
25 for i in range(N - 1):
26     Y[i + 1] = Y[i] + h * f(x[i], Y[i])
27
28 # 解析解
29 y = [y_analytical(i * h + x0) for i in range(N)]
30
31 # 誤差の吟味
32 error = Y[N - 1] - y[N - 1]
33 # 誤差と誤差をhで割ったもの(絶対値が1に近いことが予想される)を出力
34 print(error, error / h)
35
36 # グラフの表示
37 plt.plot(x, y, label="Analytical Solution")
38 plt.plot(x, Y, label="Numerical Solution")
39 plt.legend()
40 plt.show()

```

これを実行すると、

```

1 -0.019801980198018265 -1.9801980198018265

```




図 9.1: オイラー法

となります。出力の1つ目は $x = 2$ での絶対誤差を、2つ目は絶対誤差を h で割ったものです。2つ目の絶対値が1に近いことから、確かに誤差が $O(h)$ だとわかります。

グラフを見てみると少し解析解と数値解がずれています。刻み幅 h を小さくすれば精度は良くなりますが、計算量は増加します。参考までにこのプログラムの計算量は $O(N)$ です。

9.2 改良オイラー法 (中点法)

改良オイラー法ではこちらの微分方程式を解いてみましょう。

$$\frac{dy}{dx} = x^2 y^2 - y$$

これはベルヌーイの微分方程式で、7.6 節で解きました。解は

$$y = \frac{1}{Ae^x + x^2 + 2x + 2}$$

でした。今回は初期条件として $y(0) = 1/3$ を考えると、 $A = 1$ となり、

$$y = \frac{1}{e^x + x^2 + 2x + 2}$$

です。では実際にコードを書いてみましょう。刻み幅 h は 0.1 で、 $0 \leq x \leq 1$ の範囲で計算します。

ソースコード 9.2: 修正オイラー法

```

1 import matplotlib.pyplot as plt
2 from math import exp
3
4 # 関数f(x,y)の定義
5 def f(x, y):
6     return x ** 2 * y ** 2 - y
7
8 # 解析解
9 def y_analytical(x):
10     return 1 / (exp(x) + x ** 2 + 2 * x + 2)
11
12 # 初期条件
13 x0 = 0
14 Y0 = 1 / 3
15
16 # 定数
17 h = 0.1
18 N = 10 + 1
19
20 # 解となる配列
21 Y = [0 for _ in range(N)]
22 x = [i * h + x0 for i in range(N)]
23 Y[0] = Y0
24
25 # 修正オイラー法
26 for i in range(N - 1):
27     x_half = x[i] + h / 2
28     Y_half = Y[i] + h / 2 * f(x[i], Y[i])
29     Y[i + 1] = Y[i] + h * f(x_half, Y_half)
30
31 # 解析解
32 y = [y_analytical(i * h + x0) for i in range(N)]

```

```

33
34 # グラフの表示
35 plt.plot(x, y, label="Analytical Solution")
36 plt.plot(x, Y, label="Numerical Solution")
37 plt.legend()
38 plt.show()

```

結果です。

```

1 0.00022984284020965973 0.02298428402096597

```




図 9.2: 修正オイラー法

偶然誤差が小さくなっていますが、理論上の誤差は $O(h^2)$ です。

9.3 ルンゲ・クッタ法

ルンゲ・クッタ法では解析的には解けない微分方程式を解いてみましょう。

$$\frac{dy}{dx} = \sin(xy) \cos(y) \ln x$$

初期条件は $y(1) = 1$) として $1 \leq x \leq 10$ まで解きます。刻み幅 h は 0.001 です。

ソースコード 9.3: ルンゲ・クッタ法

```

1 import matplotlib.pyplot as plt
2 from math import sin, cos, log
3
4 # 関数f(x,y)の定義
5 def f(x, y):
6     return sin(x * y) * cos(y) * log(x)
7
8 # 初期条件
9 x0 = 1
10 Y0 = 1
11

```

```

12 # 定数
13 h = 0.001
14 N = 9000 + 1
15
16 # 解となる配列
17 Y = [0 for _ in range(N)]
18 x = [i * h + x0 for i in range(N)]
19 Y[0] = Y0
20
21 # ルンゲ・クッタ法
22 for i in range(N - 1):
23     k1 = f(x[i], Y[i])
24     k2 = f(x[i] + h / 2, Y[i] + k1 / 2)
25     k3 = f(x[i] + h / 2, Y[i] + k2 / 2)
26     k4 = f(x[i] + h, Y[i] + h * k3)
27     Y[i + 1] = Y[i] + h / 6 * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4)
28
29 # グラフの表示
30 plt.plot(x, Y, label="Numerical Solution")
31 plt.legend()
32 plt.show()

```

結果はこの通りです。




図 9.3: ルンゲ・クッタ法

9.4 連立微分方程式

ここでは連立微分方程式として

$$\begin{aligned}\frac{dy_1}{dx} &= 8y_1 + y_2 \\ \frac{dy_2}{dx} &= 4y_1 + 5y_2\end{aligned}$$

を考えましょう。これは、

$$\frac{d}{dx} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8y_1 + y_2 \\ 4y_1 + 5y_2 \end{pmatrix}$$

$$\frac{d\mathbf{y}}{dx} = \mathbf{f}(x, y_1, y_2)$$

と書き換えられます。

解析解は7.10節で求めた通り、

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^{4x} + c_2 e^{9x} \\ -4c_1 e^{4x} + c_2 e^{9x} \end{pmatrix}$$

です。

ここでは初期条件として $y_1(0) = 2, y_2(0) = -3$ としましょう。すると、 $c_1 = c_2 = 1$ がわかり、解析解は

$$y_1 = e^{4x} + e^{9x}, y_2 = -4e^{4x} + e^{9x}$$

となります。解析解がわかったところで、では本題のコードを示しましょう。刻み幅 h は0.001で $0 \leq x \leq 0.2$ の範囲を考えます。

ソースコード 9.4: 連立微分方程式

```

1 import matplotlib.pyplot as plt
2 from math import exp
3
4 # 関数f(x,y)の定義
5 def f(idx, x, y1, y2):
6     if idx == 0:
7         return 8 * y1 + y2
8     else:
9         return 4 * y1 + 5 * y2
10
11 # 解析解
12 def y_analytical(idx, x):
13     if idx == 0:
14         return exp(4 * x) + exp(9 * x)
15     else:
16         return -4 * exp(4 * x) + exp(9 * x)
17
18 # 初期条件
19 x0 = 0
20 Y00 = 2
21 Y10 = -3
22
23 # 定数
24 h = 0.001
25 N = 200 + 1
26
27 # 解となる配列

```

```

28 Y = [[0 for _ in range(N)] for _ in range(2)]
29 x = [i * h + x0 for i in range(N)]
30 Y[0][0] = Y00
31 Y[1][0] = Y10
32
33 # オイラー法
34 for i in range(N - 1):
35     for j in range(2):
36         Y[j][i + 1] = Y[j][i] + h * f(j, x[i], Y[0][i], Y[1][i])
37
38 # 解析解
39 y = [[y_analytical(j, i * h + x0) for i in range(N)] for j in range(2)]
40
41 # 誤差の吟味
42 for i in range(2):
43     error = Y[i][N - 1] - y[i][N - 1]
44     # 誤差と誤差をhで割ったもの(絶対値が1に近いことが予想される)を出力
45     print(error, error / h)
46
47 # グラフの表示
48 plt.plot(x, y[0], label="Analytical Solution of y1")
49 plt.plot(x, Y[0], label="Numerical Solution of y1")
50 plt.plot(x, y[1], label="Analytical Solution of y2")
51 plt.plot(x, Y[1], label="Numerical Solution of y2")
52 plt.legend()
53 plt.show()

```

結果です。 $x = 0.2$ における y_1 および y_2 の誤差を出力しました。

```

1 -0.05206309324824865 -52.06309324824865
2 -0.034320262338022545 -34.320262338022545

```




図 9.4: 連立微分方程式

少し誤差が大きくなっていますが、グラフを見ると概ね数値解は解析解に一致しています。

9.5 予測子修正子法

予測子修正子法を使ってこちらの微分方程式を解いてみましょう。

$$\frac{dy}{dx} = 2 + x - \left(2 + \frac{1}{x}\right)y + \frac{1}{x}y^2$$

これはリカッチの微分方程式で、解析的に解くことができます。7.7 節の結果を使うと、解析解は

$$y = \frac{1}{Cx + 1} + x$$

です。初期条件 $y(1) = 3/2$ とすると、 $C = 1$ で、

$$y = \frac{1}{x + 1} + x$$

が具体的な解です。では実際にコードを書きましょう。刻み幅 h は 0.1、while 文の繰り返し条件に使う閾値は 10^{-10} としました。

ソースコード 9.5: 予測子修正子法

```

1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 # 関数f(x,y)の定義
4 def f(x, y):
5     return 2 + x - (2 + 1 / x) * y + 1 / x * y ** 2
6
7 # 解析解
8 def y_analytical(x):
9     return 1 / (x + 1) + x
10
11 # 初期条件
12 x0 = 1
13 Y0 = 3 / 2
14
15 # 定数
16 h = 0.1
17 N = 1000 + 1
18
19 # 解となる配列
20 Y = [0 for _ in range(N)]
21 x = [i * h + x0 for i in range(N)]
22 Y[0] = Y0
23
24 # 予測子修正子法
25 inf = 2e9
26 threshold = 1e-10
27 for i in range(N - 1):
28     pre_Y = Y[i] + h * f(x[i], Y[i])
29     while abs(pre_Y - Y[i + 1]) > threshold:
```

```

30     Y[i + 1] = Y[i] + h / 2 * (f(x[i], Y[i]) + f(x[i + 1], pre_Y))
31     pre_Y = Y[i + 1]
32
33 # 解析解
34 y = [y_analytical(i * h + x0) for i in range(N)]
35
36 # 誤差の吟味
37 error = Y[N - 1] - y[N - 1]
38 # 誤差を出力
39 print(error)
40
41 # グラフの表示
42 plt.plot(x, y, label="Analytical Solution")
43 plt.plot(x, Y, label="Numerical Solution")
44 plt.legend()
45 plt.show()

```

結果です。 $x = 100$ における誤差を出力してあります。

```

1 -5.341559543126095e-06

```




図 9.5: 予測子修正子法

参考までに同じ刻み幅を使ったオイラー法でこの微分方程式を解いた結果 (誤差) は以下です。

```

1 -0.0006586314145806682

```

オイラー法と比べて精度が良いことがわかると思います。

9.6 有限差分法

ここでは有限差分法の例として

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + 4 \frac{dy}{dx} + 3y = e^{-2x}$$

を考えましょう。これは7.9節で解いた微分方程式です。誤差の確認のために解析解を求めておきましょう。解析解は

$$\lambda_2 = -1, \lambda_3 = -3$$

を使って、

$$\begin{aligned} y &= c_2 e^{\lambda_2 x} + c_3 e^{\lambda_3 x} + \frac{1}{\lambda_3 - \lambda_2} \left(\frac{1}{\lambda_2 - c} - \frac{1}{\lambda_3 - c} \right) e^{cx} \\ &= c_2 e^{-x} + c_3 e^{-3x} - e^{-2x} \end{aligned}$$

です。境界条件として $y(0) = 0$ および $y(1) = 0$ とすると、

$$c_2 + c_3 - 1 = 0, \quad c_2 e^2 + c_3 - e = 0$$

より、

$$c_2 = \frac{1}{e+1}, \quad c_3 = \frac{e}{e+1}$$

です。解析解がわかったところで実際に数値解を求めましょう。まずはこの微分方程式について差分方程式を作ります。5.7節の差分近似を使うと、

$$\frac{Y_{i+1} - 2Y_i + Y_{i-1}}{h^2} + 4 \frac{Y_{i+1} - Y_{i-1}}{2h} + 3Y_i = e^{-2x_i}$$

と書け、これを Y_i について整理すると、

$$Y_i = \frac{1}{3h^2 - 2} (h^2 e^{-2x_i} - (2h + 1)Y_{i+1} + (2h - 1)Y_{i-1})$$

となります。この差分方程式を使ってプログラムを書くと以下になります。なお、刻み幅 h は0.1とし連立方程式の解法にはガウス・ザイデル法を使いました。閾値は 10^{-4} です。

ソースコード 9.6: 有限差分法

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 from math import e, exp
3
4 # 解析解
5 c2 = 1 / (e + 1)
6 c3 = e / (e + 1)
7 def y_analytical(x):
8     return c2 * exp(-x) + c3 * exp(-3 * x) - exp(-2 * x)
9
10 # 境界条件
11 Y0 = 0
12 Y1 = 0
13
```

```

14 # 定数
15 h = 0.1
16 N = 10 + 1
17
18 # 解となる配列
19 Y = [0 for _ in range(N)]
20 x = [i * h for i in range(N)]
21 Y[0] = Y0
22 Y[N - 1] = Y1
23
24 # 有限差分法 (ガウス・ザイデル法を使用)
25 flag = True
26 threshold = 1e-4
27 k = 1 / (3 * h ** 2 - 2)
28 while flag:
29     flag = False
30     for i in range(1, N - 1):
31         pY = Y[i]
32         Y[i] = k * (h ** 2 * exp(-2 * x[i])) - (2 * h + 1) * Y[i + 1] + (2 *
33             h - 1) * Y[i - 1])
34         if abs(pY - Y[i]) > threshold:
35             flag = True
36
37 # 解析解
38 y = [y_analytical(i * h) for i in range(N)]
39
40 # グラフの表示
41 plt.plot(x, y, label="Analytical Solution")
42 plt.plot(x, Y, label="Numerical Solution")
43 plt.legend()
44 plt.show()

```

結果はこちらです。




図 9.6: 有限差分法

解析解によく近似していることがわかります。

第10章 数値的に偏微分方程式を解く (例題)

この章では数値的に偏微分方程式を解く方法について、実際に例題を解いていきます。常微分方程式と同様、例題への解答はPythonのサンプルコードとして示します。

10.1 陽的有限差分法

6.2節で拡散方程式を解く例を示しました。ここでは具体的に拡散方程式を解くプログラムを紹介します。拡散方程式はこちらです。

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

また、この差分方程式は式6.6の通り、

$$U_{i+1,j} = \frac{h}{k^2} U_{i,j+1} + \left(1 - 2\frac{h}{k^2}\right) U_{i,j} + \frac{h}{k^2} U_{i,j-1}$$

です。また、フォン・ノイマンの安定性解析から

$$\frac{h}{k^2} \leq \frac{1}{2}$$

が条件として必要です。実際に $h = 0.004, k = 0.1$ で、

$$u(0, x) = \phi(x) = -x(x - 1)$$

としてプログラムを書くと以下になります。

ソースコード 10.1: 陽的有限差分法

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
3 import numpy as np
4
5 # 初期条件に使う関数
6 def phi(x):
7     return -x * (x - 1)
8
9 # 定数
10 h = 0.004
11 k = 0.1
12 tn = int(1 / h) + 1
```

```

13 xn = int(1 / k) + 1
14
15 # 解に使う配列
16 U = np.zeros((tn, xn))
17 for j in range(xn):
18     U[0][j] = phi(j * k)
19
20 # 陽的有限差分法
21 r = h / k ** 2
22 for i in range(tn - 1):
23     for j in range(1, xn - 1):
24         U[i + 1][j] = r * U[i][j + 1] + (1 - 2 * r) * U[i][j] + r * U[i][j -
25             1]
26
27 # グラフの表示
28 t = np.linspace(0, 1, xn)
29 x = np.linspace(0, 1, tn)
30 taxis, xaxis = np.meshgrid(t, x)
31 uaxis = U.reshape(taxis.shape)
32 fig = plt.figure()
33 ax = Axes3D(fig)
34 ax.set_xlabel("t")
35 ax.set_ylabel("x")
36 ax.set_zlabel("u")
37 ax.plot_wireframe(xaxis, taxis, uaxis, color='black')
38 plt.show()

```

結果はグラフとして表示され、図 6.1 になります。

10.2 陰的有限差分法

陰的有限差分法の場合、差分方程式は式 6.9 の通りで、

$$-\frac{h}{k^2}U_{i+1\ j+1} + \left(1 + 2\frac{h}{k^2}\right)U_{i+1\ j} - \frac{h}{k^2}U_{i+1\ j-1} = U_{i\ j}$$

です。パラメータ $h = k = 0.1$ とし、連立方程式の解法にガウス・ザイデル法 (閾値は 10^{-4}) を使
うと、プログラムは以下のように書けます。

ソースコード 10.2: 陰的有限差分法

```

1 import matplotlib.pyplot as plt
2 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
3 import numpy as np
4
5 # 初期条件に使う関数
6 def phi(x):
7     return -x * (x - 1)
8
9 # 定数
10 h = 0.1
11 k = 0.1

```

```

12 tn = int(1 / h) + 1
13 xn = int(1 / k) + 1
14
15 # 解となる配列
16 U = np.zeros((tn, xn))
17 for j in range(xn):
18     #for i in range(tn):
19     U[0][j] = phi(j * k)
20
21 # 陰的有限差分法 (ガウス・ザイデル法を使用)
22 r = h / k ** 2
23 threshold = 1e-4
24 for i in range(tn - 1):
25     flag = True
26     while flag:
27         flag = False
28         pU = [j for j in U[i + 1]]
29         for j in range(1, xn - 1):
30             U[i + 1][j] = 1 / (1 + 2 * r) * (U[i][j] + r * U[i + 1][j - 1] +
31                 r * U[i + 1][j + 1])
32             if abs(U[i + 1][j] - pU[j]) > threshold:
33                 flag = True
34
35 # グラフの表示
36 t = np.linspace(0, 1, xn)
37 x = np.linspace(0, 1, tn)
38 taxis, xaxis = np.meshgrid(t, x)
39 uaxis = U.reshape(taxis.shape)
40 fig = plt.figure()
41 ax = Axes3D(fig)
42 ax.set_xlabel("t")
43 ax.set_ylabel("x")
44 ax.set_zlabel("u")
45 ax.plot_wireframe(xaxis, taxis, uaxis, color='black')
46 plt.show()

```

結果はグラフとして表示され、図 6.4 になります。

10.3 連立偏微分方程式

6.4 節で反応拡散方程式を紹介しました。実際にこの差分方程式を使ってコードを書くと以下になります。

ソースコード 10.3: 連立偏微分方程式の解法

```

1 import cv2
2 import numpy as np
3 from random import random
4 from numba import jit
5
6 height = 100
7 width = 100

```

```

8 Du = 0.1
9 Dv = 0.05
10 F = 0.03
11 K = 0.063
12 U = [[1 for _ in range(width)] for _ in range(height)]
13 V = [[0 for _ in range(width)] for _ in range(height)]
14 new_U = [[0 for _ in range(width)] for _ in range(height)]
15 new_V = [[0 for _ in range(width)] for _ in range(height)]
16 img = np.zeros((height, width, 3))
17
18 radius = 5
19 for y in range(height):
20     for x in range(width):
21         y_shift = y - height // 2
22         x_shift = x - width // 2
23         if y_shift ** 2 + x_shift ** 2 <= radius ** 2:
24             U[y][x] = 0.5
25             V[y][x] = 0.5
26
27 def img_write(num):
28     for y in range(height):
29         for x in range(width):
30             for i in range(3):
31                 img[y][x][i] = max(0, min(255, U[y][x] * 255))
32     cv2.imwrite('img' + format(num, '0=4') + '.png',img)
33     print('image', num, 'written')
34
35 loop = 10000
36 for i in range(loop):
37     for y in range(height):
38         for x in range(width):
39             yu = (y - 1) % height
40             yd = (y + 1) % height
41             xl = (x - 1) % width
42             xr = (x + 1) % width
43             lu = U[yu][x] + U[yd][x] + U[y][xl] + U[y][xr] - 4 * U[y][x]
44             lv = V[yu][x] + V[yd][x] + V[y][xl] + V[y][xr] - 4 * V[y][x]
45             uv2 = V[y][x] ** 2 * U[y][x]
46             du = Du * lu - uv2 + F * (1 - U[y][x])
47             dv = Dv * lv + uv2 - (F + K) * V[y][x]
48             #print(lu, lv, uv2, du, dv)
49             new_U[y][x] = U[y][x] + du
50             new_V[y][x] = V[y][x] + dv
51     U = [[i for i in j] for j in new_U]
52     V = [[i for i in j] for j in new_V]
53     if i % 100 == 0:
54         img_write(i // 100)

```

結果は多数出力される図 6.5 のような画像で得られます。ただ、このプログラムはわかりやすさ重視のため高速化をしていません。かなり遅いです。

著者紹介

にゃにゃん

筑波大学理工学群工学システム学類1年

コデザインメイカー、プログラマー、スピードキューバー

Twitter: https://twitter.com/Nyanyan_Cube

GitHub: <https://github.com/Nyanyan>

Web サイト: <https://nyanyan.github.io>

微分方程式総まとめ

2020 年 11 月 23 日	初版発行
2020 年 11 月 27 日	第 2 版発行
2020 年 12 月 1 日	第 3 版発行
2020 年 12 月 8 日	第 4 版発行
2020 年 12 月 9 日	第 5 版発行
2020 年 12 月 10 日	第 6 版発行

著者： にゃにゃん
