

INFORME TECNICO

Producto: Valcote 500 ER mg

Composición: Cada comprimido con recubrimiento entérico de liberación prolongada contiene: Divalproato de Sodio en cantidad equivalente para: Ácido Valproico 500 mg.

Indicaciones:

Mania: Se utiliza en el tratamiento de episodios maníacos agudos o mixtos asociados con trastorno bipolar, con o sin características psicóticas.

Epilepsia: Como monoterapia y terapia adyuvante en el tratamiento de adultos y niños de 10 años o mayores con convulsiones parciales complejas que ocurren ya sea en forma aislada o en asociación con otros tipos de convulsiones. Como terapia única y adyuvante en el tratamiento de las crisis de ausencia, simples y complejas en adultos y niños de 10 años o mayores. Como terapia adyuvante en pacientes adultos y niños de 10 años o mayores con múltiples tipos de trastornos convulsivos que incluyen ausencia.

Migraña: Se utiliza como profilaxis en dolores de cabeza tipo migraña en adultos.

Presentación: Envase conteniendo 50 comprimidos recubiertos de liberación prolongada.

Posología: La dosis usual recomendada es de 1 comprimido al día, o cada 12 horas, dependiendo de la prescripción del médico tratante.

Por indicación médica, se solicita el fármaco Valcote ER del laboratorio Abbott para pacientes refractarios a otros tratamientos con el mismo principio activo, por motivos de eficacia terapéutica.

Ácido Valpróico está adscrito al plan de prestaciones N°13 para bonificación para el tratamiento del trastorno Bipolar.

Cantidad requerida: 2.400 comprimidos.


Solange M. Marchant Ramos
Rut: 10.755.223-4
Químico Farmacéutico

Solange Marchant Ramos
Químico Farmacéutico
Farmacia Programas Especiales

24 de junio 2026