Ilustre Municipalidad
SAN CLEMENTE
Departamento
de Salud

Modelo de Atención Integral de Salud

GUÍA ANTICIPATORIA

Cuidados de salud para el menor de 1 año

Elaborada por el Programa de Salud de la Infancia,
Especialidad de Medicina Familiar Niños y Estamentos
Profesionales del Departamento de Salud de San Clemente




Ilustre Municipalidad
SAN CLEMENTE
Departamento
de Salud

CUIDADOS GENERALES

Cuidados piel

- **Usar** cremas para mantener hidratada la piel. **Deben ser** de pH neutro, sin aditivos (fragancias). **Aplicar** una capa fina y **evitar** que se concentre en los pliegues cutáneos.
- La ropa idealmente que **sea lavada** con jabón hipoalergénico, **no usar** suavizante
- **No es necesario** plancharla, basta con que sea bien enjuagada
- **Se recomienda** la primera capa de tela de algodón.
- **No es necesario** sobreabrigar al niño; debe usar una prenda más que la madre según la temperatura ambiental.

Protección solar

- Los menores de 6 meses **no deben** exponerse al sol.
- **Utilizar** protectores físicos con protección UV como sombreros, ropa manga larga, lentes de sol, etc.
- A contar de los 6 meses **pueden utilizar** fotoprotectores.
- **Utilizar** FPS sobre 50.
- **Evite exponer** a su hijo al sol entre las 11am y 16pm.

Uñas

- El corte de uñas **debe ser** sólo si están muy largas o puntiagudas.
- **Debe realizarse** con lima fina, tijera punta roma o cortaúñas para RN

Cuidados durante el Baño y Aseo

- **Lo ideal** es que el baño sea diario, en un tiempo corto (5 a 10 minutos), con agua tibia entre 35° a 37°c
- **Para comprobar** la temperatura, un adulto debe sumergir el codo en el agua de la tina o bañera.
- **No debe** llenarse en exceso
- **No se recomienda** el uso de talco, así como tampoco el uso de mentolato.
- Limpiar orejas solo por fuera**, sin introducir ningún elemento (cotonito)**




Cuidados de la Zona del pañal

- La piel **debe mantenerse** seca y limpia, **realizar cambio** de pañal frecuente
- **Evitar** el cambio de marca de pañal
- **Lavar** solo con agua.
- **Uso** de toallas húmedas sin fragancias, alcohol u detergente, solo cuando sea necesario, siempre que la piel se encuentre sana.

Cuidados de la Salud bucal

¿Cuándo aparecen los dientes?

Los primeros dientes comienzan a aparecer a partir de los 6 meses de vida hasta cerca de los 3 años aproximadamente. Los dientes temporales son 20, 10 superiores y 10 inferiores.



¿Cómo sé que le están saliendo los dientes?

- **Aumenta la producción** de saliva, le gusta morder objetos duros
- **Puede haber** inflamación y enrojecimientos de encías
- A veces **puede haber** pérdida de apetito, intranquilidad y/o sueño más liviano.



¿Cómo realizar el aseo de la boca?

	Su bebé está con Lactancia Materna Exclusiva	Su bebé está con Lactancia Mixta
Su bebé no tiene dientes erupcionados	Aseo bucal regular 1 vez al día, con dedal , gasa o pañal bambino solo con agua	Realizar aseo bucal con dedal de silicona o gasa limpia humedecida.
Su bebé tiene dientes erupcionados	Realizar aseo bucal con cepillo dental de bebé y pasta dental con 1000 a 1100 ppm de flúor.	Realizar aseo bucal con cepillo dental de bebé y pasta dental con 1000 a 1100 ppm de flúor.

- **Elije un cepillo de dientes pequeño y suave**
- **El cambio de cepillo debería realizarse cada 2 o 3 meses, según el desgaste que tenga.**
- **No mojar cepillo previo al lavado.**
- **No enjuagar posterior al cepillado dental.**

Desde los 6 meses de vida debe visitar a su dentista para comenzar vigilancia temprana a través del programa Cero Dental.

Elementos de higiene bucal para niños:

1. Cepillo dental de bebé
2. Pastal dental 1100 ppm de flúor
3. Dedal de silicona.



- **Cantidad de pasta dental recomendada hasta los 2 años del tamaño de 1 grano de arroz, mayores 2 años tamaño de 1 arveja**



Recomendaciones para la erupción de los dientes:

- Se pueden ofrecer helados de leche materna, mordedores fríos no congelados.
- No usar geles anestésicos, contienen compuestos que pueden generar toxicidad al lactante. Tampoco se recomienda el collar de ámbar, tiene alto riesgo de asfixia y/o estrangulamiento.

Consuelo del llanto



- Acoger y calmar oportunamente el llanto les ayuda a **confiar en quienes lo rodean** y aprender a manejar mejor sus emociones cuando sean más grandes
- Les proporciona mejor desarrollo cerebral, menos problemas de alimentación y sueño.



El llanto se puede presentar por múltiples causas:

- Dolor
- Cólicos
- Sensación de hambre
- Necesidad de cercanía y contacto físico
- Por sueño, cansancio o incomodidad.
- Frío o calor
- Por tener el pañal sucio, ropa muy apretada que no le permite moverse libremente
- Por aparición de dientes.
- Si hay muchos estímulos alrededor
- Si se siente solo o aburrido

¿Qué puedes hacer para ayudar a calmarlo?

- Acércate y mírale atentamente a unos 25cm cara a cara.
- Háblale con un tono paciente y tranquilo, dile lo que crees que siente.
- Tócalo y acariciarlo. Por ejemplo, pon tu mano sobre su pecho, hazle masaje.
- Contenlo flexionando sus brazos y piernas hacia su cuerpo y sostenlas con tu mano, a veces resulta envolverle con una manta.
- Tómalo en brazos.
- Mécelo suave y rítmicamente.
- Ofrécele de mamar.

Señales de hambre en un bebe

Señales tempranas: “Tengo hambre”		
Mueve sus piernas y brazos levemente	Abre la boca	Gira la cabeza de un lado hacia otro
		
Señales medias: “Tengo mucha hambre”		
Estira sus extremidades	Aumenta sus movimientos	Manos a la boca
		
Señales tardías: “Estoy muy frustrado y hambriento”		
Llanto	Movimientos agitados	Cara roja
		

Antes de darles de comer, cálmelo con contacto físico, palabras suaves y abrazos apretados


¿Cómo relajar a mi bebe con un masaje?

- Antes de comenzar lava tus manos y relájalas, caliéntalas, muévelas y ponte cómodo/a, en una superficie firme
- Intenta que el masaje sea parte de la rutina diaria de tu guagua (después del baño, antes de dormir, al mudarla, etc).


Beneficios de los masajes

- Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico
- Facilita los vínculos afectivos y la comunicación
- Estimula el sistema nervioso
- Relaja y disminuye el estrés, controla el dolor y produce placer
- Ayuda a evitar y calmar cólicos
- Estimula la producción de melatonina, hormona que ayuda a dormir con mayor facilidad y tener un buen descanso.
- Aumenta el apetito y la absorción de nutrientes, favoreciendo con ello un mejor aumento de peso.


Masaje de estómago



Masaje de piernas



Masaje de espalda



ALIMENTACIÓN

Lactancia materna (LM)



- La Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, complementaria con alimentación hasta los 2 años y luegos hasta que la madre y el bebé lo decidan.

¡Si tienes dificultades al amamantar acércate a tu centro de salud y solicita una hora de clínica de lactancia!

El inicio de la alimentación es una etapa importante para tu hijo: ¡Acude al control del 5° mes con el profesional de nutrición de tu sector!

Conservación de la leche materna	
Duración	Medio
6-8 hrs.	A temperatura ambiente según las condiciones climáticas de la zona. En lo posible usar cooler o bolso térmico con gel refrigerante.
3 días	Refrigerador en el fondo de las bandejas (nunca en la puerta).
14 días	Congelada en el refrigerador de 1 puerta.
De 3 a 6 meses	Congelada en el refrigerador de 2 puertas.
24 hrs.	En el refrigerador si ha sido descongelada.
1 hr.	A temperatura ambiente si ha sido descongelada.

La leche materna ya sea en mamadera o por otros métodos también se da a libre demanda, es decir cuándo y cuanto la guagua quiera.

Alimentación complementaria

- De los 6 a los 12 meses la lactancia materna sigue siendo la alimentación láctea óptima
- El objetivo a esta edad es ir incorporando adecuadamente la alimentación sólida complementaria para entregarle los nutrientes que necesita a esta edad.

Durante los primeros meses de vida se hace entrega de Vitamina D y de Hierro (si es necesario) en el control de salud.

Recomendaciones:

- El inicio de la alimentación complementaria es un proceso gradual, puede generar ansiedad en los padres por el rechazo inicial del niño al alimento.
- Se debe comenzar con cantidades pequeñas y se podrá ir aumentando conforme el niño avanza y acepta de buena forma la alimentación.
- La temperatura ideal de la comida debe ser 37°c o menos (tibia).
- No se recomienda soplar ni probar la cuchara por el riesgo de transmisión de enfermedad del adulto al niño (ej, caries)
- De postre se recomienda frutas crudas o cocidas molidas y luego en trozos.
- No se recomienda agregar sal ni azúcar a las preparaciones.
- Alimentar en un ambiente tranquilo, sin distractores (ej: uso de pantallas)

¡El profesional de nutrición de tu establecimiento te entregará más información sobre la primera comida (control 5° mes) y como ir incorporando diversos alimentos, en la medida que tu hijo crece y se desarrolla!

Alimentación	Edad de incorporación y duración aproximada			
	0-6 meses	6-12 meses	12-24 meses	≥3 años
Leche materna				
Leche artificial (en niños que no toman leche materna)				
Cereales: pan, arroz, pastas, ect (con o sin gluten), frutas, hortalizas, legumbres, huevos, carne, aceite de oliva. Se pueden ofrecer pequeñas cantidades de yogurt natural y queso tierno a partir de los 9-10 meses				
Leche entera, yogurt y queso tierno (en más cantidad) *en caso de que el niño no tome leche materna.				
Sólidos con riesgo de atragantamiento (frutos secos enteros, palomitas, granos de uva enteros, manzanas o zanahorias crudas)				
Alimentos superfluos (azúcares, miel, mermeladas, cacao y chocolate, flanes, postres lácteos, galletas, bollería, embutidos)	**Cuanto más tarde y en menos cantidad mejor (siempre a partir de los 12 meses)**			

EL SUEÑO

- Dormir es un proceso normal y evolutivo, es decir, que cambia en la medida que los niños(as) van creciendo y se desarrollan.
- En los primeros meses de vida los niños se despiertan muchas veces (microdespertares) porque necesitan comer, ver si está su cuidador(a) cerca y porque necesitan estimulación.
- Es habitual y normal que los niños(as) no quieran ir a dormirse solos.
- Durante los primeros días, los bebés no distinguen entre el día y la noche, por lo tanto, es natural que se demoren un tiempo en acomodar sus períodos de sueño. Por eso, aprovecha de descansar mientras tu bebé duerme.
- Alrededor de los tres meses de vida se empiezan a regular las horas de sueño.
- Amamántalo, la leche materna tiene una sustancia que ayuda a conciliar el sueño.
- Tenlo en tus brazos o acuéstate a su lado, escuchará tu corazón y sentirá tu olor.
- Prepara su siesta: realízale masajes, mécelo, léele un cuento, ponle música suave o cántale.
- Reduce la luz y la estimulación ambiental (ruidos, celulares, televisión, etc).
- Báñalo antes de dormir.



Recomendaciones para la hora de dormir

- Asegurarse de mantener el pañal limpio y seco.
- Transmitir seguridad y tranquilidad, intenta que mantenga un horario para irse a dormir o rutina (uso de música, peluche, tuto, etc).
- El bebé debe dormir en una superficie plana, sin elevaciones, despejada, libre de elementos como peluches, niditos u otros similares.
- El bebé no debe usar almohadas para dormir porque existe riesgo de asfixia

Colecho seguro (si duermes con tu bebé):

- Para practicar colecho seguro, el bebé debe tener más de 3 meses, no ser prematuro ni de bajo peso, dormir boca arriba, en una superficie firme y despejada, sin almohadas ni objetos. Los padres no deben fumar ni consumir alcohol/drogas, evitar cansancio extremo, mantener la habitación a 20–22 °C, y no compartir la cama con otros niños o mascotas.



DESARROLLO INTEGRAL

El apego es un tipo especial de vínculo afectivo (es un proceso), tiene que ver con la manera en que lo puedas acoger, contener y calmar cada vez que sienta malestar.

Estos vínculos de apego iniciales serán una guía para las relaciones que el niño o niña establezca en el futuro y tendrán importantes implicancias en los sentimientos de seguridad, autoestima y capacidad para enfrentarse al mundo que desarrolle tu hijo(a).

Desarrollo del apego

- Es importante considerar que los bebés no manipulan a través del llanto, si no que este es su medio para comunicar lo que necesitan.
- Acoger y calmar oportunamente su llanto, le ayudará a confiar y aprender cómo manejar sus emociones.
- Todos los momentos en que puedes demostrarle que puede contar contigo cuando lo necesita son importantes.
- Para un apego seguro se necesita una relación estable con una figura que entregue protección y seguridad en momentos de estrés o malestar.
- Cambios frecuentes de cuidador pueden ser perjudiciales para un niño.



¿Cómo estimular a tu hijo?

- Permitele explorar el mundo que lo rodea (personas, objetos, espacios de movimiento, etc.), de acuerdo a su propio ritmo de desarrollo y sus características individuales. No es necesario hacer cosas complicadas o utilizar juguetes caros o especiales
- Durante sus primeros meses, el mejor juguete para estimularle es tu cara.
- Tus gestos, miradas y sonidos son el estímulo ideal para su desarrollo en este período.
- Motívalo a jugar con distintas sensaciones, olores, colores, formas, texturas o sabores.
- Utiliza juguetes seguros, con superficies de distintos colores y texturas
- Utiliza juguetes musicales, estimulando al bebé para que busque de dónde provienen los sonidos.
- Jueguen frente a espejos para que tu bebé pueda verse, descubrir, experimentar y disfrutar con su reflejo.
- Es importante que le hables y cantes, mencionando las cosas a su alrededor, las partes de su cuerpo, las acciones que realizas, etc.



Recuerda: Los momentos óptimos para estimular a tu hijo(a), especialmente durante su primer año son en sus períodos de "alerta tranquila".



SEGURIDAD

Andador

No se aconseja el uso de andador ni saltarinas

- Porque la estructura musculoesquelética y neurológica del niño(a) aún no está preparada para enfrentarse al ambiente al que lo exponen estos elementos.
- Su uso puede llevar a un retraso en el cumplimiento de las etapas del desarrollo motor, especialmente de la marcha normal, además que aumenta la accidentabilidad a esta edad. (caídas, quemaduras, contusiones, etc)
- El niño en el andador aprende a impulsarse con la punta de los pies, provocando un acortamiento del tendón de Aquiles y contribuyendo a dificultar el inicio de la marcha sin apoyo.





Recomendación

Prefiera usar un corral con sus juguetes preferidos antes que usar un andador o saltarina. El corral permitirá un espacio donde el niño desarrolle su motricidad en un ambiente seguro.

Niño pasajero

- Usar una silla de auto que cumpla las normas de seguridad de los vehículos, instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y el tipo de auto que tenga.



Recomendaciones:

- Nunca lleve a un bebé, ni a un niño(a), en brazos en el asiento delantero.
- No instale a un bebé en el asiento del copiloto de un auto equipado con una bolsa de aire (o airbag).
- La mayoría de los accidentes ocurren cerca de la casa. Pónganse los cinturones de seguridad siempre, aún durante un viaje corto.
- Nunca deje a niños ni niñas encerrados dentro del auto, ni mucho menos al sol y con las ventanas cerradas.

Prevención de accidentes en el hogar



- Es normal que ellos se muevan y exploren, con el fin de aprender y desarrollarse.
- Es muy difícil saber exactamente lo que un niño es capaz de hacer. ¡Crecen y cambian con tanta rapidez!
- Los niños(as) no comprenden la diferencia entre lo divertido y lo peligroso. Necesitan que alguien los vigile todo el tiempo.

En el baño:

- Usar antideslizantes, mantener tapa de WC cerrada.
- Los muebles con medicamentos, productos de limpieza u otros con llave
- Dejar el secador de pelo u otro fuera del alcance de los niños.



Pasillos y escaleras:

- No deje ninguna alfombra pequeña cerca de las escaleras
- Utilice barreras al pie de la escalera con cerrojo.

Otros cuidados

- Usar protectores para enchufes, alejar los cables y herramientas del alcance del niño.
- Utilizar protección-rejas o mallas en ventanas, protector delante del sistema de afección (estufa, brasero).
- No dejar al alcance pulseras, anillos, collares, monedas etc.
- Guardar las bolsas de plástico en lugares seguros.
- Evite utilizar manteles en la mesa, ya que los niños y niñas pueden tirar de ellos y provocar la caída de objetos o líquidos calientes, generando riesgo de accidentes.

PROBLEMAS DE SALUD FRECUENTES



Recuerda que los niños son muy delicados, por lo que ante alguna de las siguientes situaciones consulta en tu centro asistencial.

Nunca mediques a tu hijo sin consultar previamente al médico. Recuerda que algunos de los medicamentos que frecuentemente utilizamos los adultos pueden ser muy peligrosos en niños/as tan pequeños.

Para evitar los problemas de salud es muy importante que lleves al niño/a a todos los controles de salud que le corresponden y cumpla con el calendario de vacunas.

Cólicos:

- Son dolores de guatita ocasionados por múltiples factores.
- Son episodios de llanto prolongado que se repiten a diario en un bebe de pocos meses (no es una enfermedad, no se conoce la causa).
- Asegúrate que no tenga gases, hazle masajes suavemente sobre su abdomen.





Cólicos del lactante		
¿Cómo actuar en casa?		Acude al médico
-Mantén la calma, se trata de un proceso benigno. -Intenta consolar al bebé o averiguar si quiere algo (Hambre, sed, frío...) -No administres ningún medicamento al bebé	-Procura un ambiente tranquilo, no transmitas ansiedad -Los paseos en carrito, música o masajes en el abdomen pueden ayudarlo	-Si se acompaña de palidez, decaimiento o sudoración -Rechazo del pecho o alimento -Fiebre, vómitos o deposiciones con sangre
		

Coceduras (Dermatitis de pañal)



- Son frecuentes debido a que su piel es sensible.
- Cámbiale frecuentemente el pañal
- Realiza lavado sólo con agua
- Evita el uso de jabón con olor o alcohol.
- Evita usar toallas húmedas; utilízalas sólo en caso de emergencia, de preferencia en base a agua.

Vómitos



- Es común que boten un poco de leche después de amamantarse, pero no que vomite después de más de 1 ó 2 horas de haber comido o en forma reiterada.
- Consulta en caso que el vómito se asocie con diarrea, fiebre, decaimiento, piel seca, pérdida de peso, menor cantidad de orina o de color amarillo oscuro.

Diarrea



- Generalmente es por virus y es un signo de que el cuerpo se está defendiendo tratando de expulsarlo.
- Poner atención en la consistencia, color y frecuencia de las deposiciones.
- Puedes tomarle fotos si no estás segura de lo que ves y consultar con su médico.
- Da agua a beber para evitar que se deshidrate y lactancia en niños menores de 6 meses

Estreñimiento

- Deposiciones menos de 3 veces a la semana, con esfuerzo y dolor
- Asegúrate que la técnica de lactancia sea adecuada y que se esté alimentando bien.
- Has ejercicios con sus piernas (Estirar y recoger las piernas, masaje circular alrededor del ombligo).
- Consulta en un centro de salud si lleva más de 5 días sin deposiciones o presenta deposiciones con sangre.

Escala de Heces de Bristol		
	Trozos duros separados, que pasan con dificultad	**Estreñimiento importante**
	Como una salchicha compuesta de fragmentos	**Ligero estreñimiento**
	Con forma de morcilla con grietas en la superficie	**Normal**
	Como una salchicha o serpiente, lisa y blanda	**Normal**
	Trozos de masa pastosa con borden definidos	**Falta de fibra**
	Fragmentos pastosos, con bordes irregulares	**Ligera diarrea**
	Acuosa, sin pedazos sólidos, totalmente liquida	**Diarrea importante**

Infecciones respiratorias

- Son infecciones producidas generalmente por virus.
- Los síntomas principales son: Tos, fiebre, disfonía (voz ronca), respiración rápida, quejidos, ruido o hundimiento de las costillas al respirar, dificultad para alimentarse o para dormir y respiración agitada.
- Nunca utilices remedios sin la indicación de un profesional.
- Realiza aseo nasal frecuente.
- Mantenlos en un ambiente tranquilo en reposo, ofrécele el pecho con mayor frecuencia o dale líquidos (mayores a 6 meses).



Fiebre:

- La temperatura se mide en la axila y no debe superar los 37.5°C.
- La fiebre es el medio que tiene el cuerpo para luchar contra la enfermedad.
- Consulta si:
- Tu hijo es menor de 6 meses
- Si mantiene temperatura sobre 38°C más de 48hrs
- Cuando no puedas bajar la fiebre por debajo de 39°C
- Cuando a pesar de bajar la fiebre persiste el decaimiento del niño
- Cuando la fiebre se asocia con otro problema de salud (vómitos, diarrea, dolor de oídos, erupción cutánea, etc).

¿Cómo puedes bajar la fiebre en la casa?

- Descúbrelo, sácale la ropa para ayudar a que el calor se disipe
- Usa paños tibios en su abdomen, cuello y frente, cámbialos cada vez que se enfríen. Dale un baño de agua tibia.
- Mantenlo hidratado, ofrece pecho o agua.

VACUNAS

- Las vacunas son medicamentos biológicos que generan defensas (anticuerpos), que actúan protegiendo de infección o enfermedad.
- Son la manera más efectiva de mantener a tu hijo (a) sano, también protege a toda la familia y al resto de niños con los que interactúa
- Las reacciones, más comunes son:
- Fiebre con temperatura mayor a 37.5°C
- Inflamación, enrojecimiento y dolor o aumento de volumen en la zona de la inyección
- Decaimiento
- Pueden durar desde las primeras 24 horas hasta 3 días. Si presenta otra manifestación o estas se prolongan por muchos días, consulte.



Enfermedades que se previene con las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones:

- Tuberculosis
- Hepatitis A - B
- Difteria, Tétanos, Tos convulsiva
- Enfermedades por Haemophilus influenza b
- Poliomielitis
- Enfermedades por Neumococo
- Sarampión, Rubeola, Paperas
- Influenza
- Enfermedades por Meningococo
- Varicela
- Fiebre amarilla
- Infección por Virus Papiloma Humano
- Rabia



CUADRO RESUMEN CONTROLES DE SALUD

Edad	Control
RN	Control diada (<10 días)
	Control del 1° mes
Consulta de Lactancia	Consulta de Alerta o Consulta de Seguimiento
Lactante Menor	Control del 2° mes
	Control del 3° mes
	Control del 4° mes
	Consulta nutricional del 5° mes
Lactante Medio	Control del 6° mes
	Control dental (CERO) de los 6 meses
	Control 8vo mes + evaluación del DSM

Lactante Mayor	Control de los 12 meses
	Control dental (CERO) de los 12 meses
Preescolar	Control de los 2 años
	Control dental (CERO) de los 2 años
	Control de los 3 años + evaluación del DSM
	Control dental (CERO) de los 3 años
	Consulta nutricional de los 3 años 6 meses
	Control de los 4 años
	Control dental (CERO) de los 4 años
	Control de los 5 años
	Control dental (CERO) de los 5 años
Escolar	Control de los 6 años
	CControl dental (CERO) de los 6 años + GES 6 años
	Control de los 7 años
	Control dental (CERO) de los 7 años
	Control de los 8 años
	Control dental (CERO) de los 8 años
	Control de los 9 años
	Control dental (CERO) de los 9 años


Ilustre Municipalidad
SAN CLEMENTE
Departamento
de Salud

Guía anticipatoria
Cuidados de Salud para el menor de 1 año

Ilustre Municipalidad
SAN CLEMENTE
Departamento
de Salud

NUESTRAS REDES SOCIALES

- Departamento Salud San Clemente
- Salud San Clemente Informa
- APS San Clemente
- APS San Clemente
- www.saludsanclementeinforma.cl
- "Prevenir es Salud" Radio Amiga 1020 AM
- Teléfonos OIRS: 712-621628
- Correo OIRS: oirs@saludsanclemente.cl

TeleSalud
Hacia una Atención Primaria Universal

SU HORA DE ATENCIÓN A UN CLIC

ESCANEE ESTE CÓDIGO QR

NÚMEROS DE TELEFÓNICOS DE UTILIDAD

AMBULANCIA **131**

BOMBEROS **132**

CARABINEROS **133**

CENTRAL DE EMERGENCIAS **1489**
(Atención 24/7)

FONOINFANCIA
Apoyo psicológico gratuito para la crianza
800 200 818

Más información en **minsal.cl** o
LLAMA A SALUD RESPONDE
600·360·7777
Profesionales de la salud atendiendo sus dudas las 24 horas, los 7 días de la semana

+56 22 6353800
CITUC
Información Toxicológica