

SEUIL FRANCHI — DÉCLENCHEUR ATTEINT

Fenêtre 3 (biomasse): 54,6 % de la tendance — la saison la plus basse depuis 1999

À confirmer avec le gouvernement. Le flux opérationnel n'a publié aucune décade 2026: valeurs issues de la couche de substitution WA_BIO_ADM1_v4 (±1 à 2 points). L'écart au seuil est tel qu'aucune révision plausible ne change la conclusion.

ANOMALIE FIN DE SAISON (DÉCADE 24)

54,6%

soit 30 points sous le seuil de 84,5 %

RANG HISTORIQUE

1^{re} plus basse

sur 28 saisons — 2015 suit à 68,4 %

PROVINCES SOUS LE SEUIL

7/7


Kanem la plus basse, à 26,2 %

BIOMASSE CUMULÉE, ZONE D'INTÉRÊT

5 121

kg/ha, contre 9 372 attendus selon la tendance

Anomalie en fin de saison (décade 24), 1999–2026



Biomasse cumulée du 1^{er} avril au 31 août (décades 10–24), sommée sur les 7 provinces de la zone d'intérêt, exprimée en % de la tendance linéaire 1999–2024. 2026 est la 7^e saison sous le seuil et la plus basse de l'histoire.

Une saison partie au-dessus de la tendance, puis effondrée à partir de la mi-juin

DÉMARRAGE (DÉCADE 12, 21–30 AVRIL)

170%

2^e plus haute à cette date — mais sur de **très faibles volumes** de saison sèche

PASSAGE SOUS LE SEUIL

décade 18

21–30 juin, puis **7 décades consécutives** sous 84,5 %

CHUTE DE MI-SAISON

134% → 55%


entre la décade 16 (début juin) et la décade 24 — **–79 points** en huit décades

LES 5 SAISONS AYANT DÉCLENCHÉ

sous le seuil dès la déc. 21

au plus tard, et **jamais remontées** ensuite — le même profil de fin de saison qu’en 2026

Anomalie de biomasse cumulée à chaque décade, en % de la tendance de cette décade — 28 saisons, 1999–2026



À chaque décade, la biomasse cumulée depuis le 1^{er} avril est comparée à sa propre tendance linéaire 1999–2024, comme le fait le déclencheur à la décade 24. Les anomalies d’avril–mai portent sur quelques centaines de kg/ha et sont très volatiles; la saison se joue de juin à août.

Aucune reprise en août, et aucune province épargnée

TRAJECTOIRE 2026

63,1 → 54,6

l'anomalie a **baissé** à chaque décade depuis la 21^e

À TITRE DE COMPARAISON, 2015

51,6 → 68,4

partie plus bas, mais **redressée** de 17 points en août

ÉCART À LA TENDANCE


-45,4 %

de biomasse manquante sur l'ensemble de la zone

PROVINCE LA PLUS TOUCHÉE

Kanem

26,2 % de sa tendance — près de trois quarts en moins



Lecture: les pluies d’août n’ont pas compensé le déficit. Les deux seules saisons historiquement rétablies en fin de saison (2002, 2013) n’étaient que légèrement sous le seuil; 2026 en est à 30 points. Ce résultat est cohérent avec les Fenêtres 1 et 2, déjà activées fin avril–début mai sur les prévisions SEAS5.