



Guadeloupe : comment El Niño influence-t-il généralement les pluies saisonnières ?

Corrélation partielle, pixel par pixel, des précipitations avec Niño3.4 (ENSO), autres modes climatiques maintenus constants — grille ERA5 0,25°, 1981–2025

Signal propre à l'ENSO — trimestre significatif le plus fort par pixel

Corrélation partielle avec Niño3.4



Brun = les années El Niño tendent à être plus sèches que la normale pour cette saison ;
bleu = plus humides.

Méthode (passe partielle de la page téléconnexions) :

- Moyennes trimestrielles par pixel, les 12 fenêtres glissantes de 3 mois, 1981–2025
- r partiel pluie vs Niño3.4, DMI (IOD), TNA, TSA et AMM maintenus constants
- Chaque mode à son meilleur décalage par pixel (0–3 mois)
- $p < 0,05$ bilatéral, ddl ajustés
- Toutes les saisons conservées (pas de filtre de saison des pluies)

JFM



AMJ



JAS




OND



Données : précip. mensuelles ERA5 (0,25°), Niño3.4 NOAA PSL. Rangée du bas : les quatre trimestres.

Guadeloupe : quelles pluies saisonnières sont prévues cette année (prévision émise en août) ?

SEAS5 (émise en août 2026) intègre El Niño et tous les autres facteurs · périodes de retour vs rétroprévisions 1981-2025 · ombrage selon l'exactitude · ADM1




Prévision (exactitude élevée) :

- Sécheresse — période de retour ≥ 10 ans
- Sécheresse — période de retour 3-10 ans
- Proche de la normale
- Inondation — période de retour 3-10 ans
- Inondation — période de retour ≥ 10 ans

Autres :

- Exactitude mod.
- Exactitude faible
- Hors saison des pluies

Précipitations moyennes du pays (mm/jour)
noir = normale · couleur = prévision



Saison	Normal (mm/jour)	Prévision (mm/jour)	Prévision mod. (mm/jour)
JJA	2.9	1.8	1.8
JAS	3.6	2.0	2.0
ASO	4.0	2.2	2.2
SON	4.2	2.3	2.3
OND	3.5	1.8	1.8
NDJ	2.6	1.2	1.2
DJF	1.8	1.0	1.0

Hachures blanches sur couleur = exactitude modérée.
Sous-titres des cartes : période de retour et centile nationaux de l'application d'alertes.
Saison la plus sèche : SON 2026 (1-sur-46 sec).
En saison = mois observés + prévision.
Niño3.4 : +1,7 °C en juillet 2026.

Données : ECMWF SEAS5 · Limites : GLP ADM1 (COD)