
Complete IVW fit
After SNP omission
95% CI
OR = 1 reference
A | NAFLD (8,434 cases)
All SNPs (IVW)
Omit rs17763463
Omit rs76114856
Omit rs116734066
Omit rs145582435
Omit rs144561756
Omit rs2551346
1.00 (0.94-1.06) P=0.947
0.98 (0.93-1.04) P=0.546
0.99 (0.94-1.05) P=0.850
1.00 (0.94-1.06) P=0.988
1.00 (0.94-1.06) P=0.979
1.00 (0.95-1.06) P=0.942
1.04 (0.93-1.18) P=0.473
0.5 0.75 1 1.5 2
OR (log scale)
B | Cirrhosis (15,225 cases)
All SNPs (IVW)
Omit rs17763463
Omit rs116734066
Omit rs144561756
Omit rs182898561
Omit rs188348361
Omit rs76114856
Omit rs145582435
Omit rs2551346
1.02 (0.97-1.08) P=0.372
1.00 (0.96-1.05) P=0.871
1.02 (0.97-1.07) P=0.448
1.02 (0.97-1.08) P=0.442
1.02 (0.97-1.08) P=0.420
1.02 (0.97-1.08) P=0.402
1.02 (0.97-1.08) P=0.366
1.03 (0.98-1.08) P=0.253
1.09 (0.99-1.20) P=0.074
0.5 0.75 1 1.5 2
OR (log scale)
C | MASLD MTAG (N = 122,644)
All SNPs (IVW)
Omit rs2551346
Omit rs145582435
Omit rs76114856
Omit rs116734066
Omit rs144561756
Omit rs17763463
1.00 (0.98-1.03) P=0.835
0.99 (0.94-1.05) P=0.797
1.00 (0.98-1.02) P=0.943
1.00 (0.98-1.03) P=0.899
1.00 (0.98-1.03) P=0.861
1.00 (0.98-1.02) P=0.699
1.01 (0.98-1.03) P=0.632
0.5 0.75 1 1.5 2
OR (log scale)