

Séance 9.1: Regression linéaire multiple

Interprétation

Visseho Adjivanou, PhD.

06 November 2022

Plan de présentation

- Rappel
- Interprétation des résultats
- Test d'hypothèses

Rappel

Spécification

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + \epsilon_i$$

Où ϵ_i suit une loi normale de moyenne 0 et de variance σ^2 . - On a k indépendantes variables pour n observations $\{(Y_1, X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1k}), \dots, (Y_n, X_{n1}, X_{n2}, \dots, X_{nk})\}$.

Exemple: - Y peut être le poids à la naissance - X_1 l'âge de la mère à la naissance de l'enfant - X_2 le sexe de l'enfant

Spécification

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix}; \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & X_{11} & X_{21} & \cdots & X_{k1} \\ 1 & X_{12} & X_{22} & \cdots & X_{k2} \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ 1 & X_{1n} & X_{2n} & \cdots & X_{kn} \end{bmatrix}; \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{bmatrix}; \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

Estimation des paramètres

Hypothèses

		Expression mathématique		
	Hypothèses	Linéaire simple	Linéaire multiple	Violations
H1	Variable dépendante fonction linéaire d'un ensemble spécifique de variables indépendantes, plus une perturbation	$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$, $i = 1 \text{ à } N$	$Y = X\beta + \varepsilon$	Mauvaises variables indépendantes, Non linéarité, Paramètres changeant
H2	L'espérance mathématique de l'erreur est nulle	$E(\varepsilon_i) = 0$, pour tout i	$E\varepsilon = 0$	Intercept biaisé
H3	La variance de l'erreur est constante quel que soit i (homoscédasticité)	$\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2$	$E\varepsilon\varepsilon' = \sigma^2 I$	Hétéroscédasticité
	Les erreurs sont non corrélées (ou encore indépendantes)	$E(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0$ pour $i \neq j$		Erreurs autocorrélées
H4	Les variables indépendantes sont observées sans erreur	X_i fixé	X fixé	Erreurs dans les variables X , Auto-régression, Équations simultanées
H5	Absence de colinéarité entre les variables indépendantes	$\sum (X_i - \bar{X})^2 \neq 0$	Rang de $X = K \leq N$	Colinéarité parfaites
	Le nombre d'observations est supérieur au nombre des séries explicatives	$N \geq K$		

Estimation des paramètres

- Les paramètres inconnus:
 - k (beta) + 1 (alpha) paramètres
 - σ^2
- On démontre que :

$$\beta^* = (X'X)^{-1}(X'Y)$$

Variance-covariance de $\text{Varcov}(\beta^*) = \sigma^2(X'X)^{-1}$

Mais encore une fois, σ^2 n'est pas connu. Il est remplacé par:

$$s^2 = e'e/(T - k)$$

avec ($e = Y - Y'$)

Interprétation

Exemple : déterminant du salaire aux USA en 1978

$$\text{Log}_e(\text{wage}/\text{hour}) = \beta_0 + \beta_1 \text{education} + \beta_2 \text{experience} + \beta_3 \text{femme}$$

- femme est une variable dichotomique (ou dummy)
- scolarité et expérience sont continues et reflètent les années

Résultat de l'estimation

$$\text{Log}(\text{salaire}/\text{heure}) = 0.5779 + 0.0780 * \text{scolarite} + 0.0134 * \text{experience} - 0.3356 * \text{femme}$$

- $\beta_0 = \text{Cste} = 0.5779$
- $\beta_1 = 0.0780$
- $\beta_2 = 0.0134$
- $\beta_3 = 0.3356$

Exemple : déterminant du salaire aux USA en 1978

- $\beta_0 = \text{Cste} = 0,5779$, donc $e^{0.5779} = 1,78$ est le salaire moyen pour un homme ($\text{fem} == 0$) avec 0 année d'expérience ($\text{exp} == 0$) et 0 année d'études ($\text{école} == 0$)
- Un homme avec 6 ans d'éducation et 2 ans d'expérience gagnera combien?
- Un homme avec 6 ans d'éducation et 2 ans d'expérience gagnera en moyenne: $\text{Log}(\text{salaire} / \text{heure}) = 0,5779 + 0,0780 * 6 + 0,0134 * 2 - 0,3356 * 0 = 1,0727$ Le salaire horaire moyen pour cette personne est de 2,92 \$

Exemple : déterminant du salaire aux USA en 1978

- $\beta_0 = \text{Cste} = 0,5779$, donc $e^{0.5779} = 1,78$ est le salaire moyen pour un homme (fem == 0) avec 0 année d'expérience (exp == 0) et 0 année d'études (école == 0)
- Un homme avec 6 ans d'éducation et 2 ans d'expérience gagnera combien?
- Un homme avec 6 ans d'éducation et 2 ans d'expérience gagnera en moyenne: $\text{Log}(\text{salaire} / \text{heure}) = 0,5779 + 0,0780 * 6 + 0,0134 * 2 - 0,3356 * 0 = 1,0727$ Le salaire horaire moyen pour cette personne est de 2,92 \$
- Pour une femme ayant les mêmes caractéristiques, salaire moyen/heure = 2,09 \$

Exemple : déterminant du salaire aux USA en 1978

- $\beta_0 = \text{Cste} = 0,5779$, donc $e^{0.5779} = 1,78$ est le salaire moyen pour un homme (fem == 0) avec 0 année d'expérience (exp == 0) et 0 année d'études (école == 0)
- Un homme avec 6 ans d'éducation et 2 ans d'expérience gagnera combien?
- Un homme avec 6 ans d'éducation et 2 ans d'expérience gagnera en moyenne: $\text{Log}(\text{salaire} / \text{heure}) = 0,5779 + 0,0780 * 6 + 0,0134 * 2 - 0,3356 * 0 = 1,0727$ Le salaire horaire moyen pour cette personne est de 2,92 \$
- Pour une femme ayant les mêmes caractéristiques, salaire moyen/heure = 2,09 \$
- La différence vaut $2.92\$ - 2.09\$ = 0,0780\$$

Exemple : déterminant du salaire aux USA en 1978

$$\text{Log}(\text{salaire} / \text{heure}) = 0.5779 + 0.0780 * \text{scolarite} + 0.0134 * \text{exp} - 0.3356 * \text{fem}$$

- La question générale est la suivante: quel est l'effet d'une année d'études supplémentaire sur le log (salaire) en tenant compte du sexe et de l'expérience?
- En dérivant $\log(\text{salaire}/\text{heure})$ par la scolarité, on trouve 0,0780.

Exemple : déterminant du salaire aux USA en 1978

$$\text{Log}(\text{salaire} / \text{heure}) = 0.5779 + 0.0780 * \text{scolarite} + 0.0134 * \text{exp} - 0.3356 * \text{fem}$$

- La question générale est la suivante: quel est l'effet d'une année d'études supplémentaire sur le log (salaire) en tenant compte du sexe et de l'expérience?
- En dérivant $\log(\text{salaire}/\text{heure})$ par la scolarité, on trouve 0,0780.
- Parce que nous utilisons $\log(\text{salaire})$, nous dirons qu'une année supplémentaire d'études, **les autres facteurs maintenus constants** entraîne une augmentation du salaire de 7,8%

Une régression multiple est différente de plusieurs régressions simple

$\text{Log}_e(\text{wage}/\text{hour}) = \beta_0 + \beta_1 \text{education} + \beta_2 \text{experience} + \beta_3 \text{femme}$
femme est différent de:

- $\text{Log}_e(\text{wage}/\text{hour}) = \beta_0 + \beta_1 * \text{education}$
- $\text{Log}_e(\text{wage}/\text{hour}) = \beta_0 + \beta_2 * \text{experience}$
- $\text{Log}_e(\text{wage}/\text{hour}) = \beta_0 + \beta_3 * \text{femme}$

Résultats importants et interprétation

- Même si on ne reporte pas l'ensemble des résultats d'une régression, voici les principaux résultats et leur interprétation.

Source	SS	df	MS	Number of obs = 5358
Model	6.8604e+09	2	3.4302e+09	F(2, 5355) = 335.52
Residual	5.4747e+10	5355	10223566.4	Prob > F = 0.0000
Total	6.1608e+10	5357	11500396.2	R-squared = 0.1114
				Adj R-squared = 0.1110
				Root MSE = 3197.4

m19	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
v190	-803.7117	31.8308	-25.25	0.000	-866.113	-741.3104
v013	131.7199	29.0377	4.54	0.000	74.79422	188.6456
_cons	8138.445	149.8926	54.30	0.000	7844.595	8432.296

Résultats importants et interprétation

1 Qualité du modèle

- Model SS (SSM): Somme des carrés du modèle = $\sum(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$
- Residual SS (SSR) : Somme des carrés résiduelles = $\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2 = \sum[Y_i - (\alpha + \beta * X_i)]^2$

Résultats importants et interprétation

1 Qualité du modèle

- Model SS (SSM): Somme des carrés du modèle = $\sum(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$
- Residual SS (SSR) : Somme des carrés résiduelles = $\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2 = \sum[Y_i - (\alpha + \beta * X_i)]^2$
- Total SS (SST) : Somme des carrées totale = $\sum(Y_i - \bar{Y})^2$

Résultats importants et interprétation

1 Qualité du modèle

- Model SS (SSM): Somme des carrés du modèle = $\sum(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$
- Residual SS (SSR) : Somme des carrés résiduelles = $\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2 = \sum[Y_i - (\alpha + \beta * X_i)]^2$
- Total SS (SST) : Somme des carrées totale = $\sum(Y_i - \bar{Y})^2$
- Un modèle sera bon si la somme des carrés du modèle se rapproche de la somme des carrés total

Résultats importants et interprétation

- Les df sont les degrés de liberté. Ils permettent de corriger les modèles selon le nombre de variables dépendantes
- $\text{model df} = \text{nombre de variables indépendantes (sauf la constante)}$

Résultats importants et interprétation

- Les df sont les degrés de liberté. Ils permettent de corriger les modèles selon le nombre de variables dépendantes
- $\text{model df} = \text{nombre de variables indépendantes (sauf la constante)}$
- $\text{residual df} = \text{taille de l'échantillon} - \text{nombre de variables dépendantes y compris le terme constant}$

Résultats importants et interprétation

- Les df sont les degrés de liberté. Ils permettent de corriger les modèles selon le nombre de variables dépendantes
- $\text{model df} = \text{nombre de variables indépendantes (sauf la constante)}$
- $\text{residual df} = \text{taille de l'échantillon} - \text{nombre de variables dépendantes y compris le terme constant}$
- $\text{total df} = \text{model df} + \text{residual df}$

Résultats importants et interprétation

- Variances expliquées: en divisant les sommes des carrés par les df, on obtient les variances:
 - Model MS (mean square): Variance expliquée par le modèle
 - Residual Ms : variance résiduelle
 - Total MS: Variance totale

R carré: coefficient de détermination

A partir de ces variances, on calcule le R carré qui vaut:

$$R^2 = SSM/SST = 1 - SSR/SST$$

- Évalue la qualité de la relation linéaire entre Y et les variables indépendantes

R carré: coefficient de détermination

A partir de ces variances, on calcule le R carré qui vaut:

$$R^2 = SSM/SST = 1 - SSR/SST$$

- Évalue la qualité de la relation linéaire entre Y et les variables indépendantes
- Exprime la partie de la variance totale de Y expliquée par le modèle

R carré: coefficient de détermination

- Varie entre 0 et 1 mais est interprété en termes de pourcentage
- Si R^2 est proche de 1, nous avons un bon modèle

R carré: coefficient de détermination

- Varie entre 0 et 1 mais est interprété en termes de pourcentage
- Si R^2 est proche de 1, nous avons un bon modèle
- Si R^2 est proche de 0, le modèle explique mal la variable dépendante

R carré: coefficient de détermination

- Varie entre 0 et 1 mais est interprété en termes de pourcentage
- Si R^2 est proche de 1, nous avons un bon modèle
- Si R^2 est proche de 0, le modèle explique mal la variable dépendante
- Utile pour la régression linéaire simple et la régression linéaire multiple

R carré: coefficient de détermination

- R^2 est affecté par l'ajout d'une nouvelle variable indépendante dans le modèle même si l'effet de cette variable n'est pas significatif
- R^2 ajusté corrige pour cela:

$$\text{Adjusted } R^2 = \frac{[(n-1)R^2 - k]}{[n - (k+1)]}$$

- $\text{Adjusted } R^2 \leq R^2$

Les autres éléments du tableau

Les autres parties du tableau permettent de tester quelques hypothèses dont:

- Est-ce que le modèle dans sa globalité est significatif?
- Est-ce qu'une variable est significative
- Et bien plus. . .

Test d'hypothèses en régression linéaire classique

Introduction

- Passons maintenant au problème de l'utilisation du modèle de régression pour tester des hypothèses.
- Le type d'hypothèse le plus couramment testé avec l'aide du modèle de régression est qu'il n'y a pas de relation entre la variable explicative X et la variable dépendante Y .

Test pour une variable explicative: test de Student

En supposant que toutes les hypothèses des modèles de régression linéaire sont valides:

- L'équation de regression

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + \epsilon_i$$

- Ou: $E(Y_i|X) = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki}$
- Tester que $\beta_i = 0$ signifie que

- Il n'y a pas de relation entre X_i et Y
- La valeur moyenne de Y_i ne dépend pas linéairement de X_i
- La droite de régression de population est horizontale (en régression linéaire simple)

Test pour une variable explicative: test de Student

- Ce test est basé sur la variance de β_i
- En cas de régression multiple, le calcul de cette variance est compliqué et n'est pas présenté ici.
- En cas de MRLS, nous avons vu que:
- Variance de la pente :
$$Var(\beta^*) = \frac{\sigma_\epsilon^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2}$$

Test pour une variable explicative: test de Student

- Ce test est basé sur la variance de β_i
- En cas de régression multiple, le calcul de cette variance est compliqué et n'est pas présenté ici.
- En cas de MRLS, nous avons vu que:
- Variance de la pente :
$$Var(\beta^*) = \frac{\sigma_\epsilon^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2}$$
- Variance de l'intercept:
$$Var(\alpha^*) = \sigma_\epsilon^2 \left[\frac{1}{n} + \frac{\bar{X}^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2} \right]$$

Test pour une variable explicative: test de Student

- Mais comme σ^2 est inconnu, il est remplacé par son estimateur (s).
- Finalement, on a:
- Estimateur de la variance de la pente:

$$s_{\beta^*}^2 = \text{Var}(\hat{\beta}^*) = \frac{s^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2}$$

Test pour une variable explicative: test de Student

- Mais comme σ^2 est inconnu, il est remplacé par son estimateur (s).
- Finalement, on a:
- Estimateur de la variance de la pente:
$$s_{\beta^*}^2 = \text{Var}(\hat{\beta}^*) = \frac{s^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2}$$
- Estimateur de la variance de l'intercept:
$$s_{\alpha^*}^2 = s^2 \left[\frac{1}{n} + \frac{\bar{X}^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2} \right]$$

Test pour une variable explicative: test de Student

Comment faire le test?

- 1 Énoncez l'hypothèse nulle ($\beta_1 = \mu_1$)
- 2 Choisissez le niveau de signification (α , 0.1%, 1%, 5%)
 - 3 Comparer β_1^* à μ_1
 - Si $\beta_1^* = \mu_1$, pas besoin de tester, sinon testez
 - 4 Type de test: test bilatéral ou test unilatéral
 - Toujours privilégier le test bilatéral
 - Hypothèse forte derrière le test unilatéral
 - 5 Calculer les statistiques sous l'hypothèse nulle
 - t of Student (z normal dans l'exemple précédent)

Test pour une variable explicative: test de Student

Comment faire le test?

- 1 Énoncez l'hypothèse nulle ($\beta_1 = \mu_1$)
- 2 Choisissez le niveau de signification (α , 0.1%, 1%, 5%)
 - 3 Comparer β_1^* à μ_1
 - Si $\beta_1^* = \mu_1$, pas besoin de tester, sinon testez
 - 4 Type de test: test bilatéral ou test unilatéral
 - Toujours privilégier le test bilatéral
 - Hypothèse forte derrière le test unilatéral
 - 5 Calculer les statistiques sous l'hypothèse nulle
 - *t of Student* (*z normal* dans l'exemple précédent)
- 6 Décision: Comparez le *t* calculé au *t* qui vous est donné par la

Test pour une variable explicative: test de Student

- Sous l'hypothèse nulle:

$$t^* = \frac{\beta_1^* - \mu_1}{s_{\beta_1^*}} \sim \text{une loi de Student avec } n - (k+1) \text{ degrés de liberté}$$

- n est la taille de l'échantillon

- k est le nombre de variables indépendantes (excluant l'intercept)
- Décision:
 - Si $|t^*| > t(lu)$, rejeter l'hypothèse nulle
 - Si $|t^*| < t(lu)$, ne rejeter pas l'hypothèse nulle

Exemple: Déterminant du nombre d'enfants

On estime le modèle:

$$Parite_i = \alpha + \beta_1 Urbain_i + \beta_2 Sans\text{--}education_i + \beta_3 College_i + \beta_4 Catholique_i +$$

$$\beta_5 Protestant_i + \beta_6 Animiste_i + \beta_7 Sans\text{--}religion_i + \beta_8 Age_i + \epsilon_i$$

- Où $Parite_i$ est le nombre d'enfants vivants de la femme i .

Exemple: Déterminant du nombre d'enfants

Le tableau suivant présente les résultats de cette régression:

Variables	Coefficients	Erreur standard
Constant	-3.855	0.092
Urbain	-0.634	0.057
Sans-education	0.137	0.074
College	-0.738	0.097
Catholique	-0.095	0.051
Protestant	0.074	0.086
Animiste	0.040	0.067
Sans-religion	0.138	0.111
Age	0.261	0.002

■ Référence?

■ $N = 6444$

Test d'une variable continue

- Testez que $\beta_{age} = 0$
- Valeur de beta estimé: $\beta_{age}^* = 0,261 \neq 0$, test possible pour voir si l'âge n'est pas lié à la parité

Test d'une variable continue

- Testez que $\beta_{age} = 0$
- Valeur de beta estimé: $\beta_{age}^* = 0,261 \neq 0$, test possible pour voir si l'âge n'est pas lié à la parité
- t calculé: $t^* = \frac{(\beta_{age}^* - 0)}{s_{\beta_{age}^*}} = (0.261 - 0) / 0.002 = 130.5$

Test d'une variable continue

- Testez que $\beta_{age} = 0$
- Valeur de beta estimé: $\beta_{age}^* = 0,261 \neq 0$, test possible pour voir si l'âge n'est pas lié à la parité
- t calculé: $t^* = \frac{(\beta_{age}^* - 0)}{s_{\beta_{age}^*}} = (0.261 - 0) / 0.002 = 130.5$
- le t calculé: t^* suit une loi de Student avec $(6444 - (8 + 1)) = 6435$ degrés de liberté

Test d'une variable continue

- Testez que $\beta_{age} = 0$
- Valeur de beta estimé: $\beta_{age}^* = 0,261 \neq 0$, test possible pour voir si l'âge n'est pas lié à la parité
- t calculé: $t^* = \frac{(\beta_{age}^* - 0)}{s_{\beta_{age}^*}} = (0.261 - 0) / 0.002 = 130.5$
- le t calculé: t^* suit une loi de Student avec $(6444 - (8 + 1)) = 6435$ degrés de liberté
- Considérons le seuil de significativité $\alpha = 1\%$

Test d'une variable continue

- Testez que $\beta_{age} = 0$
- Valeur de beta estimé: $\beta_{age}^* = 0,261 \neq 0$, test possible pour voir si l'âge n'est pas lié à la parité
- t calculé: $t^* = \frac{(\beta_{age}^* - 0)}{s_{\beta_{age}^*}} = (0.261 - 0) / 0.002 = 130.5$
- le t calculé: t^* suit une loi de Student avec $(6444 - (8 + 1)) = 6435$ degrés de liberté
- Considérons le seuil de significativité $\alpha = 1\%$
- $t(lu) = 2,58$

Test d'une variable continue

- Testez que $\beta_{age} = 0$
- Valeur de beta estimé: $\beta_{age}^* = 0,261 \neq 0$, test possible pour voir si l'âge n'est pas lié à la parité
- t calculé: $t^* = \frac{(\beta_{age}^* - 0)}{s_{\beta_{age}}^*} = (0.261 - 0) / 0.002 = 130.5$
- le t calculé: t^* suit une loi de Student avec $(6444 - (8 + 1)) = 6435$ degrés de liberté
- Considérons le seuil de significativité $\alpha = 1\%$
- $t(lu) = 2,58$
- Décision : le t calculé $t^* > t(lu)$, on rejette l'hypothèse nulle

Test d'une variable continue

- Testez que $\beta_{age} = 0$
- Valeur de beta estimé: $\beta_{age}^* = 0,261 \neq 0$, test possible pour voir si l'âge n'est pas lié à la parité
- t calculé: $t^* = \frac{(\beta_{age}^* - 0)}{s_{\beta_{age}}^*} = (0.261 - 0) / 0.002 = 130.5$
- le t calculé: t^* suit une loi de Student avec $(6444 - (8 + 1)) = 6435$ degrés de liberté
- Considérons le seuil de significativité $\alpha = 1\%$
- $t(lu) = 2,58$
- Décision : le t calculé $t^* > t(lu)$, on rejette l'hypothèse nulle
- Conclusion: l'âge a un effet significatif sur la parité

Test d'une variable dichotomique

- Comparer deux groupes distincts
- Test que $\beta_{catholique} = 0$

Test d'une variable dichotomique

- Comparer deux groupes distincts
- Test que $\beta_{catholique} = 0$
- Dans ce cas précis, vérifiez si les femmes catholiques ont une parité sensiblement différente de celle des femmes musulmanes.

Test d'une variable dichotomique

- Comparer deux groupes distincts
- Test que $\beta_{catholique} = 0$
- Dans ce cas précis, vérifiez si les femmes catholiques ont une parité sensiblement différente de celle des femmes musulmanes.
- Le test est identique à celui effectué précédemment

Test d'une variable dichotomique

- Comparer deux groupes distincts
- Test que $\beta_{catholique} = 0$
- Dans ce cas précis, vérifiez si les femmes catholiques ont une parité sensiblement différente de celle des femmes musulmanes.
- Le test est identique à celui effectué précédemment
- Hypothèse nulle: $H_0 : \beta_{catholique} = 0$

Test d'une variable dichotomique

- Comparer deux groupes distincts
- Test que $\beta_{catholique} = 0$
- Dans ce cas précis, vérifiez si les femmes catholiques ont une parité sensiblement différente de celle des femmes musulmanes.
- Le test est identique à celui effectué précédemment
- Hypothèse nulle: $H_0 : \beta_{catholique} = 0$
- t calculé : $t^* = \frac{(\beta_{catholique}^* - 0)}{s_{\beta_{catholique}^*}} = (-0,095 - 0)/0,051 = -1.863$

Test d'une variable dichotomique

- Comparer deux groupes distincts
- Test que $\beta_{catholique} = 0$
- Dans ce cas précis, vérifiez si les femmes catholiques ont une parité sensiblement différente de celle des femmes musulmanes.
- Le test est identique à celui effectué précédemment
- Hypothèse nulle: $H_0 : \beta_{catholique} = 0$
- t calculé : $t^* = \frac{(\beta_{catholique}^* - 0)}{s_{\beta_{catholique}^*}} = (-0,095 - 0)/0,051 = -1.863$
- Décision: Seuil $\alpha = 1\% \implies t(lu) = 2,58$, conclusion?

Test d'une variable dichotomique

- Comparer deux groupes distincts
- Test que $\beta_{catholique} = 0$
- Dans ce cas précis, vérifiez si les femmes catholiques ont une parité sensiblement différente de celle des femmes musulmanes.
- Le test est identique à celui effectué précédemment
- Hypothèse nulle: $H_0 : \beta_{catholique} = 0$
- t calculé : $t^* = \frac{(\beta_{catholique}^* - 0)}{s_{\beta_{catholique}^*}} = (-0,095 - 0)/0,051 = -1.863$
- Décision: Seuil $\alpha = 1\% \implies t(lu) = 2,58$, conclusion?
- Seuil $\alpha = 5\% \implies t(lu) = 1,96$, conclusion?

Test d'une variable dichotomique

- Comparer deux groupes distincts
- Test que $\beta_{catholique} = 0$
- Dans ce cas précis, vérifiez si les femmes catholiques ont une parité sensiblement différente de celle des femmes musulmanes.
- Le test est identique à celui effectué précédemment
- Hypothèse nulle: $H_0 : \beta_{catholique} = 0$
- t calculé : $t^* = \frac{(\beta_{catholique}^* - 0)}{s_{\beta_{catholique}^*}} = (-0,095 - 0)/0,051 = -1.863$
- Décision: Seuil $\alpha = 1\% \implies t(lu) = 2,58$, conclusion?
- Seuil $\alpha = 5\% \implies t(lu) = 1,96$, conclusion?
- Seuil $\alpha = 10\% \implies t(lu) = 1,64$, conclusion?

Intervalle de confiance

- On parle d'intervalle de confiance en cas de test bilatéral
- Cet intervalle est donné par défaut à 95%, le complément à 1 de α
- L'intervalle de confiance peut également être utilisé pour le test d'hypothèse
 - Les valeurs en dehors de l'intervalle sont significativement différentes de β^*
 - Les valeurs à l'intérieur de l'intervalle ne sont pas significativement différentes de β^*

Conclusion: Une variable a un effet significatif si l'intervalle de confiance de ses estimations ne contient pas 0.

Intervalle de confiance

- La formule de l'intervalle de confiance est:

$$IC = \beta_s^* \pm t_\alpha * s_{\beta^*}$$
$$[\beta_s^* - t_\alpha * s_{\beta^*}, \beta_s^* + t_\alpha * s_{\beta^*}]$$

- Exemple: intervalle de confiance de β_{age}^*

- $[0.261 - 1.96(0.002), 0.261 + 1.96(0.002)]$
- $[0.257, 0.265]$

Test pour plus d'une variable explicative

Introduction

- Utilisé pour tester plusieurs hypothèses à la fois, à la différence du test t, qui ne portait que sur une hypothèse.

Considérons:

- L'équation de regression

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + \epsilon_i$$

- L'un des tests les plus simples est l'égalité entre deux paramètres:
 - Hypothèse nulle: $H_0 : \beta_1 = \beta_2$;
 - Hypothèse alternative: $H_A : \beta_1 \neq \beta_2$

Introduction

- Ou pour tester:
 - Hypothèse nulle: $H_0 : \beta_1 = 1$ et $\beta_2 = 2$
 - Hypothèse alternative: $H_A : H_0$ n'est pas vrai).
 - Ce qui est différent de deux tests t -t test 1: $H_0 : \beta_1 = 1$ et $H_A : \beta_1 \neq 1$ -t test 2: $H_0 : \beta_2 = 2$ et $H_A : \beta_2 \neq 2$

F test: formulation

- Le test de ces hypothèses utilise le test F (Fischer) basé sur deux modèles:
- 1 Le modèle sans restriction ou sans contrainte

F test: formulation

- Le test de ces hypothèses utilise le test F (Fischer) basé sur deux modèles:
- 1 Le modèle sans restriction ou sans contrainte
- Contient tous les $(K + 1)$ paramètres à estimer

F test: formulation

- Le test de ces hypothèses utilise le test F (Fischer) basé sur deux modèles:
- 1 Le modèle sans restriction ou sans contrainte
 - Contient tous les $(K + 1)$ paramètres à estimer
- 2 Le modèle restreint ou contraint

F test: formulation

- Le test de ces hypothèses utilise le test F (Fischer) basé sur deux modèles:
 - 1 Le modèle sans restriction ou sans contrainte
 - Contient tous les $(K + 1)$ paramètres à estimer
 - 2 Le modèle restreint ou contraint
 - Prendre en compte les contraintes imposées au modèle:

F test: formulation

- Le test de ces hypothèses utilise le test F (Fischer) basé sur deux modèles:
 - 1 Le modèle sans restriction ou sans contrainte
 - Contient tous les $(K + 1)$ paramètres à estimer
 - 2 Le modèle restreint ou contraint
 - Prendre en compte les contraintes imposées au modèle:
 - Contraintes: $(\beta_1 = \beta_2)$ ou $(\beta_1 = 1, \beta_2 = 2)$

F test: formulation

- Le test de ces hypothèses utilise le test F (Fischer) basé sur deux modèles:
- 1 Le modèle sans restriction ou sans contrainte
 - Contient tous les $(K + 1)$ paramètres à estimer
- 2 Le modèle restreint ou contraint
 - Prendre en compte les contraintes imposées au modèle:
 - Contraintes: $(\beta_1 = \beta_2)$ ou $(\beta_1 = 1, \beta_2 = 2)$
 - Si c est le nombre de contraintes le modèle restreint aura $K + 1 - c$ paramètres

Exemples

Cas 1: $H_0 : \beta_1 = \beta_2$

- $c = 1$

- Modèle non contraint

- UM: $Y_i = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + \epsilon_i$

- Modèle contraint

- RM: $Y_i = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \beta_1 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + \epsilon_i$

- RM: $Y_i = \alpha + \beta_1 (X_{1i} + X_{2i}) + \dots + \beta_k X_{ki} + \epsilon_i$

- RM: $Y_i = \alpha + \beta_1 Z_i + \dots + \beta_k X_{ki} + \epsilon_i$

- Avec $Z_i = (X_{1i} + X_{2i})$

Exemples

Cas 2: $H_0 : \beta_1 = 1$ et $\beta_2 = 2$

- $c = 2$

- Modèle non contraint

- UM: $Y_i = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + \epsilon_i$

- Modèle contraint

- RM: $Y_i = \alpha + 1X_{1i} + 2X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + \epsilon_i$

- RM: $Y_i - 1X_{1i} - 2X_{2i} = \alpha + \dots + \beta_k X_{ki} + \epsilon_i$

- RM: $T_i = \alpha + \beta_3 X_{3i} + \dots + \beta_k X_{ki} + \epsilon_i$

- Avec $T_i = Y_i - 1X_{1i} - 2X_{2i}$

F test

- Calculer la somme des carrés des résidus (SSR) de chaque modèle
- Calculer la statistique F

$$F^* = \frac{[SSR(RM) - SSR(UM)]/c}{SSR(UM)/(n - (k + 1))} \sim Fischer_{c, n-(k+1)}$$

- Accéder à la valeur critique de F à partir de la table Fischer
- Règle de décision
 - Si $F^* > F(lu)$, rejeter l'hypothèse nulle
 - Si $F^* < F(lu)$, ne pas rejeter l'hypothèse nulle

Exemple

Source	SS	df	MS
Model	6.8604e+09	2	3.4302e+09
Residual	5.4747e+10	5355	10223566.4
Total	6.1608e+10	5357	11500396.2

Number of obs = 5358

F(2, 5355) = 335.52

Prob > F = 0.0000

R-squared = 0.1114

Adj R-squared = 0.1110

Root MSE = 3197.4

m19	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
v190	-803.7117	31.8308	-25.25	0.000	-866.113	-741.3104
v013	131.7199	29.0377	4.54	0.000	74.79422	188.6456
_cons	8138.445	149.8926	54.30	0.000	7844.595	8432.296

Exemple 1

$$Parite_i = \alpha + \beta_1 Urbain_i + \beta_2 Sans\text{-}education_i + \beta_3 College_i + \beta_4 Catholique_i +$$

$$\beta_5 Protestant_i + \beta_6 Animiste_i + \beta_7 Sans\text{-}religion_i + \beta_8 Age_i + \epsilon_i$$

■ Hypothèse nulle:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = \beta_8 = 0$$

Exemple 1

$$Parite_i = \alpha + \beta_1 Urbain_i + \beta_2 Sans\text{-}education_i + \beta_3 College_i + \beta_4 Catholique_i +$$

$$\beta_5 Protestant_i + \beta_6 Animiste_i + \beta_7 Sans\text{-}religion_i + \beta_8 Age_i + \epsilon_i$$

- Hypothèse nulle:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = \beta_8 = 0$$

- Hypothèse alternative: H_A ?

Exemple 1

$$Parite_i = \alpha + \beta_1 Urbain_i + \beta_2 Sans\text{-}education_i + \beta_3 College_i + \beta_4 Catholique_i +$$

$$\beta_5 Protestant_i + \beta_6 Animiste_i + \beta_7 Sans\text{-}religion_i + \beta_8 Age_i + \epsilon_i$$

- Hypothèse nulle:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = \beta_8 = 0$$

- Hypothèse alternative: H_A ?

- Résultat:

Exemple 1

$$Parite_i = \alpha + \beta_1 Urban_i + \beta_2 Sans\text{-}education_i + \beta_3 College_i + \beta_4 Catholique_i +$$

$$\beta_5 Protestant_i + \beta_6 Animiste_i + \beta_7 Sans\text{-}religion_i + \beta_8 Age_i + \epsilon_i$$

- Hypothèse nulle:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = \beta_8 = 0$$

- Hypothèse alternative: H_A ?

- Résultat:

- $SSR(UM) = 59968.90$

Exemple 1

$$Parite_i = \alpha + \beta_1 Urban_i + \beta_2 Sans\text{-}education_i + \beta_3 College_i + \beta_4 Catholique_i +$$

$$\beta_5 Protestant_i + \beta_6 Animiste_i + \beta_7 Sans\text{-}religion_i + \beta_8 Age_i + \epsilon_i$$

- Hypothèse nulle:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = \beta_8 = 0$$

- Hypothèse alternative: H_A ?

- Résultat:

- $SSR(UM) = 59968.90$

- $SSR(RM) = 61414.84$ (RM: $Parite_i = \alpha$)

Exemple 1

$$Parite_i = \alpha + \beta_1 Urban_i + \beta_2 Sans\text{-}education_i + \beta_3 College_i + \beta_4 Catholique_i +$$

$$\beta_5 Protestant_i + \beta_6 Animiste_i + \beta_7 Sans\text{-}religion_i + \beta_8 Age_i + \epsilon_i$$

- Hypothèse nulle:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = \beta_8 = 0$$

- Hypothèse alternative: H_A ?

- Résultat:

- $SSR(UM) = 59968.90$

- $SSR(RM) = 61414.84$ (RM: $Parite_i = \alpha$

- $C=?$

Exemple 1

$$F^* = \frac{[61414.84 - 59968.90)]/8}{59968.90/(6444 - 9)} = 19.39$$

- $F(lu) = F_{8,6435} = 1.94$ pour $\alpha = 0.05$
- Décision:
 - Comme $F^* > F(lu)$, on rejette l'hypothèse nulle
- Conclusion: Les 8 variables indépendantes ont toutes un effet significatif sur la parité.

Exemple 2

$$Parite_i = \alpha + \beta_1 Urbain_i + \beta_2 Primaire_i + \beta_3 College_i + \beta_4 Catholique_i + \dots + \beta_8 A_i$$

- Hypothèse nulle: $H_0 : \beta_2 = \beta_3$
- Il n'existe pas de différence entre l'effet de niveau d'enseignement primaire et l'effet de niveau d'enseignement secondaire

Exemple 2

$$Parite_i = \alpha + \beta_1 Urbain_i + \beta_2 Primaire_i + \beta_3 College_i + \beta_4 Catholique_i + \dots + \beta_8 A_i$$

- Hypothèse nulle: $H_0 : \beta_2 = \beta_3$
- Il n'existe pas de différence entre l'effet de niveau d'enseignement primaire et l'effet de niveau d'enseignement secondaire
- Hypothèse alternative: $H_A : \beta_2 \neq \beta_3$

Exemple 2

$$Parite_i = \alpha + \beta_1 Urbain_i + \beta_2 Primaire_i + \beta_3 College_i + \beta_4 Catholique_i + \dots + \beta_8 A_i$$

- Hypothèse nulle: $H_0 : \beta_2 = \beta_3$
- Il n'existe pas de différence entre l'effet de niveau d'enseignement primaire et l'effet de niveau d'enseignement secondaire
- Hypothèse alternative: $H_A : \beta_2 \neq \beta_3$
- RM: $Parite_i = \alpha + \beta_1 * urbain_i + \beta_2(primaire_i + college_i) + \beta_4 * catholique_i + \dots + \beta_8 * age_i + \epsilon_i$

Exemple 2

$$Parite_i = \alpha + \beta_1 Urbain_i + \beta_2 Primaire_i + \beta_3 College_i + \beta_4 Catholique_i + \dots + \beta_8 A_i$$

- Hypothèse nulle: $H_0 : \beta_2 = \beta_3$
- Il n'existe pas de différence entre l'effet de niveau d'enseignement primaire et l'effet de niveau d'enseignement secondaire
- Hypothèse alternative: $H_A : \beta_2 \neq \beta_3$
- RM: $Parite_i = \alpha + \beta_1 * urbain_i + \beta_2(primaire_i + college_i) + \beta_4 * catholique_i + \dots + \beta_8 * age_i + \epsilon_i$
- Calculer la nouvelle variable $educ = primaire_i + college_i$

Exemple 2

$$Parite_i = \alpha + \beta_1 Urbain_i + \beta_2 Primaire_i + \beta_3 College_i + \beta_4 Catholique_i + \dots + \beta_8 A_i$$

- Hypothèse nulle: $H_0 : \beta_2 = \beta_3$
- Il n'existe pas de différence entre l'effet de niveau d'enseignement primaire et l'effet de niveau d'enseignement secondaire
- Hypothèse alternative: $H_A : \beta_2 \neq \beta_3$
- RM: $Parite_i = \alpha + \beta_1 * urbain_i + \beta_2(primaire_i + college_i) + \beta_4 * catholique_i + \dots + \beta_8 * age_i + \epsilon_i$
- Calculer la nouvelle variable $educ = primaire_i + college_i$
- Estimer le modèle RM: $Parite_i = \alpha + \beta_1 * urbain_i + \beta_2(educ_i) + \beta_4 * catholique_i + \dots + \beta_8 * age_i + \epsilon_i$

Exemple 2

■ Résultat

$$F^* = \frac{[56164.15 - 55968.90)]/1}{55968.90/(6435)} = 22.45$$

■ $F(lu) : F_{1,6435} = 3.84$ pour $\alpha = 0.05$

■ $F(lu) : F_{1,6435} = 6.63$ pour $\alpha = 0.01$

■ Conclusion:

- Rejet de l'hypothèse nulle: la différence est significative dans les deux cas

Exemple 3

$$Parite_i = \alpha + \beta_1 Urbain_i + \beta_2 Primaire_i + \beta_3 College_i + \beta_4 Catholique_i + \dots + \beta_8 A_i$$

- Hypothèse nulle : $H_0 = \beta_2 = 2, \beta_3 = -5$
- RM: $Parite_i = \alpha + \beta_1 * urbain_i + 2 * primaire_i - 5 * college_i + \beta_4 * catholique_i + \dots + \beta_8 * age_i + \epsilon_i$
- Calculer une nouvelle variable dépendante:
 $Paritenew_i = Parite_i - 2 * primaire_i + 5 * college_i$

Exemple 3

$$Parite_i = \alpha + \beta_1 Urbain_i + \beta_2 Primaire_i + \beta_3 College_i + \beta_4 Catholique_i + \dots + \beta_8 A_i$$

- Hypothèse nulle : $H_0 = \beta_2 = 2, \beta_3 = -5$
- RM: $Parite_i = \alpha + \beta_1 * urbain_i + 2 * primaire_i - 5 * college_i + \beta_4 * catholique_i + \dots + \beta_8 * age_i + \epsilon_i$
- Calculer une nouvelle variable dépendante:
 $Paritenew_i = Parite_i - 2 * primaire_i + 5 * college_i$
- Estimer le nouvel modele:

Exemple 3

$$Parite_i = \alpha + \beta_1 Urbain_i + \beta_2 Primaire_i + \beta_3 College_i + \beta_4 Catholique_i + \dots + \beta_8 A_i$$

- Hypothèse nulle : $H_0 = \beta_2 = 2, \beta_3 = -5$
- RM: $Parite_i = \alpha + \beta_1 * urbain_i + 2 * primaire_i - 5 * college_i + \beta_4 * catholique_i + \dots + \beta_8 * age_i + \epsilon_i$
- Calculer une nouvelle variable dépendante:
 $Paritenew_i = Parite_i - 2 * primaire_i + 5 * college_i$
- Estimer le nouvel modele:
- RM:
 $Paritenew_i = \alpha + \beta_1 * urbain_i + \beta_4 * catholique_i + \dots + \beta_8 * age_i + \epsilon_i$

Exemple 3

$$Parite_i = \alpha + \beta_1 Urbain_i + \beta_2 Primaire_i + \beta_3 College_i + \beta_4 Catholique_i + \dots + \beta_8 A_i$$

- Hypothèse nulle : $H_0 = \beta_2 = 2, \beta_3 = -5$
- RM: $Parite_i = \alpha + \beta_1 * urbain_i + 2 * primaire_i - 5 * college_i + \beta_4 * catholique_i + \dots + \beta_8 * age_i + \epsilon_i$
- Calculer une nouvelle variable dépendante:
 $Paritenew_i = Parite_i - 2 * primaire_i + 5 * college_i$
- Estimer le nouvel modele:
- RM:
 $Paritenew_i = \alpha + \beta_1 * urbain_i + \beta_4 * catholique_i + \dots + \beta_8 * age_i + \epsilon_i$
- Calculer la statistique de F et tester l'hypothèse nulle

Remarque sur F et t test

- Le test t et le test F sont similaires pour le test d'hypothèse sur 1 paramètre >- Deux tests t sont différents d'un test F car les hypothèses nulles sont différentes >- Par exemple: β_1 et β_2 peuvent ne pas être significatifs à partir du test t, mais être conjointement significatifs avec le F test >- $SSR(RM) > SSR(UM)$ >- Le modèle restreint et le modèle sans restriction doivent être basés sur le même échantillon avec le **même nombre d'observations**.

Degré de liberté

- Les degrés de liberté d'une statistique sont le nombre de grandeurs entrant dans le calcul de la statistique moins le nombre de contraintes reliant ces grandeurs.
- Par exemple, la formule utilisée pour calculer la variance de l'échantillon implique la statistique moyenne de l'échantillon.
- Cela impose une contrainte sur les données - étant donné la moyenne de l'échantillon, n'importe quel point de données peut être déterminé par les autres $(N-1)$ points de données. - Par conséquent, seules des observations non contraintes $(N-1)$ sont disponibles pour estimer la variance de l'échantillon; le degré de liberté de la statistique de variance de l'échantillon est $(N-1)$.