

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет комп'ютерних наук і кібернетики

Звіт

з лабораторної роботи №1

«Розв'язування нелінійних рівнянь»

Виконав:

Студент групи ІПС-32

Гончаренко Ілля Сергійович

Київ

2024

Завдання:

Знайти найменший по модулю від'ємний корінь нелінійного рівняння $x^3 - 10x^2 + 44x + 29 = 0$ методом простої ітерації та методом Ньютона з точністю $\varepsilon = 10^{-4}$. Знайти апіорну та апостеріорну оцінку кількості кроків. Початковий проміжок та початкове наближення обрати однакове для обох методів (якщо це можливо), порівняти результати роботи методів між собою.

Теорія:

Якщо розглянути задачу знаходження коренів рівняння $f(x) = 0$

де $f(x)$ - задана функція дійсного змінного.

І вирішення даної задачі виконати за допомогою таких кроків як:

1. Дослідження розташування коренів (в загальному випадку на комплексній площині) та їх кратність.
2. Відділення коренів, тобто виділення областей, що містять тільки один корінь.
3. Обчислення кореня з заданою точністю за допомогою одного з ітераційних алгоритмів

Далі ми розглянемо ті ітераційні алгоритми що стосуються нашої задачі

Метод простої ітерації - застосовується для розв'язування нелінійного рівняння вигляду

$$x = \varphi(x)$$

Для переходу до рівняння можна багатьма способами, одним з прикладів буде

$$\varphi(x) = x + \psi(x)f(x)$$

де $\psi(x)$ - довільна знакостала неперервна функція.

І після цього ми обравши нульове наближення x_0 можемо обраховувати наступні(наближення) за допомогою формули

$$x_{n+1} = \varphi(x_n), n = 0, 1, 2, \dots$$

Теорема 1.

Нехай для вибраного початкового наближення x_0 на проміжку

$$S = \{x : |x - x_0| \leq \delta\}$$

функція $\varphi(x)$ задовільняє умові Ліпшиця

$$|\varphi(x') - \varphi(x'')| \leq q|x' - x''|, x', x'' \in S$$

де $0 < q < 1$, і виконується нерівність

$$|\varphi(x_0) - x_0| \leq (1 - q)\delta$$

Тоді рівняння $x = \varphi(x)$ має на проміжку S єдиний корінь x_* , до якого збігається послідовність $x_{n+1} = \varphi(x_n)$, $n = 0, 1, 2, \dots$, причому швидкість збіжності визначається нерівністю

$$|x_n - x_*| \leq \frac{q^n}{1 - q} |\varphi(x_0) - x_0|$$

Зауваження: якщо функція $\varphi(x)$ має на проміжку S неперервну похідну $\varphi'(x)$, яка задовільняє умові

$$|\varphi'(x)| \leq q < 1,$$

то функція $\varphi(x)$ буде задовольняти умові

$$|\varphi(x') - \varphi(x'')| \leq q|x' - x''|, x', x'' \in S, \text{ теореми 1.}$$

$$\text{З } |x_n - x_*| \leq \frac{q^n}{1 - q} |\varphi(x_0) - x_0| \text{ можна отримати оцінку кількості}$$

ітерацій які потрібно провеств для знаходження розв'язку задачі $x = \varphi(x)$ з наперед заданою точністю ε :

$$n \geq \left[\frac{\ln \frac{|\varphi(x_0) - x_0|}{(1 - q) * \varepsilon}}{\ln(1/q)} \right] + 1$$

Наведемо ще одну оцінку. що характеризує збіжність методу простої ітерації:

$$|x_n - x_*| \leq \frac{q}{1 - q} |x_n - x_{n-1}|$$

Метод Ньютона застосовується до розв'язування задачі $f(x) = 0$, де $f(x)$ є неперервно- диференційованою функцією. На початку обчислень вибирається початкове наближення x_0 . Наступні наближення обчислюються за формулою

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, n = 0, 1, 2, \dots, f'(x) \neq 0$$

З геометричної точки зору x_{n+1} є значенням абсциси точки перетину дотичної до кривої $y=f(x)$ в точці $(x_n, f(x_n))$ з віссю абсцис. Тому метод Ньютона називають також методом дотичних.

Теорема 2. Якщо $f(x) \in C^2[a, b]$, $f(a)f(b) < 0$, а $f''(x)$ не змінює знака на

$[a, b]$, то виходячи з початкового наближення $x_0 \in [a, b]$, що задовольняє умові

$f(x_0)f'(x_0) > 0$, можна обчислити методом Ньютона єдиний корінь x_* рівняння (1) з будь-якою степінною точністю.

Теорема 3. Нехай x_* – простий дійсний корінь рівняння $f(x) = 0$ і $f(x) \in C^2(S)$, де $S = \{x : |x - x_*| \leq \delta\}$,

$$0 < m_1 = \min_{x \in S} |f'(x)|, M = \max_{x \in S} |f''(x)|,$$

причому

$$q = \frac{M_2 |x_0 - x_*|}{2m_1} < 1$$

Тоді для $x_0 \in S$ метод Ньютона збігається, причому для похибки справедлива оцінка

$$|x_n - x_*| \leq q^{2^n - 1} |x_0 - x_*|$$

З оцінки $|x_n - x_*| \leq q^{2^n - 1} |x_0 - x_*|$ видно, що метод Ньютона має квадратичну збіжність, тобто похибка на $(n+1)$ -й ітерації пропорційна квадрату похибки на n -й ітерації.


Кількість ітерацій, які потрібно провести для знаходження розв'язку задачі з заданою точністю ε задовільняє нерівності

$$n \geq \left[\log_2 \left(\frac{\ln(|x_0 - x_*|/\varepsilon)}{\ln(1/q)} \right) + 1 \right] + 1$$

Хід роботи:

(Демонстрація відбувається при базових параметрах)

Графіки функцій :



На графіках вище зображені функції перша похідна $f'(x)$ і друга похідна $f''(x)$ на інтервалі $[-1, -0.5]$. Ці графіки дозволяють нам побачити:

1. Функція $f(x)$ має нулі, які і є коренями рівняння, що ми шукаємо.
2. Перша похідна $f'(x)$ показує, де функція зростає або спадає, що допомагає аналізувати методи збіжності.
3. Друга похідна $f''(x)$ вказує на кривизну функції, що є ключовим фактором для методу Ньютона.
4. Графік $\varphi(x)$ дозволяє нам визначити q (фактор збіжності, точніше $|\varphi'(x_{min})|$) для методу простої ітерації

Тепер можемо графічно знайти m_1, M_1, M_2

- $m_1 = 54.75$ - мінімальна абсолютна перша похідна
- $M_1 = 67$ - максимальна абсолютна перша похідна
- $M_2 = 26$ - максимальна абсолютна друга похідна
- $q = 0.2443$ - фактор збіжності, точніше $|\varphi'(x_{min})|$

Індекс	Значення x	Точність	f(x)
0	-0.9000000000000000	-0.9000000000000000	-19.4290000000000020
1	-0.5984479279838585	0.3015520720161415	-1.1274361509248223
2	-0.5786833876640718	0.0197645403197867	-0.0045999775854959
3	-0.5786020847916699	0.0000813028724019	-0.0000000775765905

m1 (мін. абсолютна похідна): 54.75
M1 (макс. абсолютна похідна): 67.0
M2 (макс. абсолютна 2-га похідна): 26.0
q (фактор збіжності): 0.0950
Очікувана кількість ітерацій: 3

Індекс	Значення x	Точність	f(x)
0	-0.6000000000000000	-0.6000000000000000	-1.2159999999999975
1	-0.5723636363636364	0.0276363636363636	0.3524922747287746
2	-0.5803748244256540	0.0080111880620176	-0.1003321603213223
3	-0.5780945480547148	0.0022802763709392	0.0287114922081102
4	-0.5787470819685355	0.0006525339138207	-0.0082037401005763
5	-0.578560633298861	0.0001864486386495	0.0023450760287957
6	-0.5786139305123587	0.0000532971824726	-0.0006702672517633

q (фактор збіжності): 0.2443
delta (максимальна відстань між x0 та межами інтервалу): 0.4000
Очікувана кількість ітерацій: 5

Порівняння двох методів:

(Взято базові параметри, див. Мал. 0)

Метод простої ітерації виконав обчислення гірше (6 ітерацій проти 3 у Ньютона), проте дійшовши до такого ж результату як і метод Ньютона. Хоча цей метод є більш стабільним, через не таку високу залежність від початкового наближення.

Метод Ньютона показав високий фактор збіжності $q = 0.0831$, що підтверджує швидку збіжність методу.

Висновок:

Метод Ньютона краще підходить для задач, де потрібна швидка збіжність і точне початкове наближення є доступним. Однак його застосування складніше через необхідність обчислення похідних.

Метод простої ітерації є більш універсальним і простим у застосуванні, але збігається повільніше і зазвичай потребує більшої кількості ітерацій для досягнення бажаної точності.